



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

298

VALPERGA DI MASINO E DI CALUSO.

VIII.

298.

L



QA

35

.B742

1757

into

8 all.

BOSKOVIC, RUDJER JOSIP

ELEMENTORUM

UNIVERSÆ MATHESIOS

AUCTORE

ROGERIO JOSEPHO

BOSCOVICH

SOCIETATIS JESU

PUBLICO MATHESIOS PROFESSORE

TOMUS I.

CONTINENS { GEOMETRIAM PLANAM:
ARITHMETICAM VULGAREM:
GEOMETRIAM SOLIDORUM:
TRIGONOMETRIAM PLANAM, & SPHERICAM:

EDITIO PRIMA VENETA,

*Summa labore ac diligentia ab erroribus
expurgata.*



VENETIIS, MDCCLVII.

APUD ANTONIUM PERLINI:

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.

W. W. Raman
5th 25-1923
3 vols.

AUCTORIS PRÆFATIO.



Rediit jam superiore anno hoc ipse liber sub titulo partis primæ Tomi primi Elementorum Mathematicos sine meo nomine, & alter itidem sine meo nomine continens Algebra Elementa sub titulo partis secundæ Tomi primi. At nunc accedunt Sectionum Conicarum Elementa, cum Locorum Geometricorum transformationibus. Primis iis Tomi primi partibus, quamquam hoc anno distractis jam magna ex parte, non quidem iterum recufis, sed iisdem illis, mutatur titulus: accedit meum nomen, & quæ fuerant binæ partes Tomi primi, evadunt Tomus primus, & secundus, ut jam novus, qui nunc additur, fiat tertius. Cur superiore anno meum defuerit nomen, facile intelliget, qui fusiores præfationem legerit adjectam Tomo tertio, quam ut percurrat, Lectorem rogo. Id ut nunc accederet, impressa simul præfatione illa, facile a me impetravit is, cujus sumptibus tertius nunc prodit Tomus.

Idem autem priores illos non Tomi partes, sed Tomos appellari maluit, cum nominis mei addendi gratia mutari deberet titulus, crescente nimirum universo opere, in quo jam integra pestulor totius Mathematicos Elementa.

Porro prima illa Geometria, & Arithmetica Elementa, quæ solent sub Præceptoris disciplina addisci contra-ctiore methode exposita sunt in hoc primo Tomo ita, ut præcipua quedam tantummodo capita percurrantur, & Præceptoris ipsius ductum omnino requirant, qui appendicem legat in fine adiectam. Ejus appendicis ope, confido, fore, ut Tyro rite institutus brevius, & maximo cum fructu Geometriam addiscat, & se abunde in inventione exerceat. A fine Arithmetica usque ad primi Tomi finem omnia, quæ occurrunt, & uberius explicata sunt, & fusius pertractata. Mendæ nonnulla Typographi, vel librarii exscribentis per sese facile deteguntur. In Tri-

gonometria plana vel mihi scribenti praeferere, vel Editori, qui plura in hoc Tomo quandoque contraxit, effugit quintus casus triangulorum rectangulorum, qui addendas fuisset post num. 10, quo nimirum dato altero angulo, quaerantur reliqua. Facile autem salviatur, cum angulus alter inveniatur per canonem 1, basis per 2, latus alterum per 3.

In tertia Tomo omnia sunt abunde explicata, nec ductorem, ut arbitror requirent. In reliquis itidem curabo, ne qui Typo in Geometria, & primis calculi rudimentis versatus requirat. Eorum autem, quae consequentur, & quorum materia omnis in promptu est, hic erit ordo. Quarto Tomo persequar Elementa infinitorum, & infinitesimorum pure geometrica, ubi etiam de generalibus atque curvarum proprietatibus, & earum, quae omnium maxime, vel utiles vel notae sunt Elementa tradam. Alius deinde aget de applicatione Algebrae ad Geometriam, & de seriebus infinitis, alius praecipua calculi differentialis, & integralis fundamenta aperiet, & usum demonstrabit. Hinc absolutis, quae ad puram Mathesin pertinent, aggrediar mixtam. Prima quidem ea, quae ad motum pertinent, tum quae ad Lucem, exponam, deinde Sphaeram, & ex ea pendentem Gnomonicam, tum Astronomiam precedentibus omnibus indigentem evolvam, quibus adjiciam demum illa, quae ex Mathesi requiruntur ad Geographiam, Chronologiam, utramque Architecturam, & Musicam, si nimirum vita, & otium supererit.

In iis omnibus erunt pleraque, ut in his ipsis, quae jam edidi sunt sane multa, mihi quidem nova, & deductionis ordinem habebq in primis ob oculos, cujus deductionis specimen in primo potissimum, ac tertio tomo, & vero etiam in secundo me abunde dedisse arbitror.

EDITORIS MONITUM AD LECTOREM



MATHESEOS Elementa edenda curavimus Adolescentium rationibus accommodata, qui publicis in Scholis huic facultati dant operam: eorum scilicet, quibus plerumque ex huiusmodi disciplinis ea tantum delibare est animus, quæ & captu faciliora sint, & cum cæteris facultatibus arctius connexa. Si qui sunt igitur, quos paulo major & exquisior harum rerum scientia delectet, ubi satis fuerint in his Elementis exercitati, privato studio a probatissimis Scriptoribus haurire poterunt, quæ communem discipulorum captum excedunt. Brevitati consulendum in primis esse duximus, ut liber evaderet qui & facile parari posset, & commodè circumferri. Licet autem perspicuitatis etiam ratio sit habita, tamen si cui quædam videbuntur aliquanto pressius dicta, & obscurius, Magistri voce aliquid præstandum esse meminerit. Arithmeticæ locum inter planam, & solidorum geometriam medium dedimus Eucli-

Euclidis exemplum magis sequuti, quam
quod id rerum natura postularet. Cæte-
rum satius censemus eodem tempore in
utroque genere quantitatis, continuæ
nempe, & discretæ, tyronem exerceri
ob eamque rem nihil veriti sumus in
Geometriæ planæ decursu ad contrahen-
das, aut clarius exponendas demonstra-
tiones arithmeticam adhibere. Reliquo-
rum ratio satis legentibus constabit. Vale



DOMINICUS FRANCHINI

SOCIETATIS JESU

*In Provincia Romana Præpositus
Provincialis.*

CUM Librum, cui titulus: *Elementorum Mathematicæ*
etc. a nostræ Societatis Sacerdote conscriptum,
aliquot ejusdem Societatis Theologi recognove-
rint, & in lucem edi posse probaverint, potestate no-
bis a R. P. Nostro Ignatio Vicecomite Præposito Ge-
nerali ad id tradita, facultatem concedimus, ut Typis
mandetur, si ita iis, ad quos pertinet, videbitur. In
quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas, &
sigillo nostro munitas dedimus. Roma 11. Decembris 1751.

Dominicus Franchini.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella, Inquisitor Generale del Santo Ufficio di Venezia, nel Libro intitolato *Elementorum Universe Mathematicae auctore P. Rogerio Josepho Boscovich Soc. Jesu*. Non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza ad *Antonio Pertini Stampator di Venezia* che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Das li 18. Agosto 1756

(Barbon Morosini K. P. Ref.
(Alvise Mocenigo 4. K. P. Ref.

Registrato in Libro a Carte 46. al Num. 469:

Giuseppe Zuccherato Seg.

Adi 20. Agosto 1756:

Registrato nel Mag. Eccellentiss. degli Esecutori contro la Bestemmia.

Franco Bianchi Seg.

ELE-



ELEMENTA GEOMETRIÆ.

Axiomata.

1. QUÆ eidem sunt æqualia, inter se sunt æqualia: Et quod uno æqualium majus est vel minus, altero quoque majus vel minus erit.

2. Si æqualibus æqualia demas vel addas, residua in primo aggregata in secundo casu sunt æqualia. Et si æqualibus inæqualia demas, vel addas, ea quæ remanent sunt inæqualia.

3. Quantitates quæ certam aliquam quantitatem tantundem continent, vel ab ea tantundem continentur, sunt æquales; unde quantitates æquales in eandem quantitatem ductæ, vel per eandem divisæ sunt æquales.

4. Si ex duabus quantitativibus prima sit dupla, tripla, vel utcumque multiplex alterius, & a prima aufertur pars dupla, tripla, vel æquè multiplex ejus, quæ aufertur a secunda; erit residuum primæ duplum, tripulum, vel æquè multiplex residui alterius.

5. Quæ sibi mutuo superimposita perfectè congruunt sunt æqualia.

6 Totum qualibet sui parte majus est: est autem omnibus sui partibus simul sumptis æquale.

Definitiones.

1. Punctum est, cujus nulla pars est.

2. Linea est longitudo latitudinis expers.

A

3. Sæ.

3. Superficies est longitudo, & latitudo profunditatis expers.

4. Solidum est extensio in longum, latum, & profundum.

Scholion.



D tres priores definitiones probè intelligendas, finge tibi tabulam KL affabrè expolitam (Fig. 1.), cujus pars A alba sit, B nigra, D rubra, C carulea, EI limes album colorem a nigro dirimens, nullam certè latitudinem habet; utcumque enim in alterutram partem inclines, vel in albo, vel in nigro consistes; limitem tamen hunc in longum partiri licet. Idem dic de limitibus IG, IH, IF. Et hæc est notio lineæ.

Concursus autem harum linearum I neque latitudinem, neque longitudinem habet, adeoque nec partes. Et hæc est notio puncti Mathematici, ex qua oritur axioma illud; lineam a linea secari in unico tantum puncto.

Quod si tabula KL aliquam habeat licet minimam profunditatem, limes interius dirimens partem albam A, a nigra B habebit longitudinem EI, tantamque latitudinem, quanta est tabulæ profunditas, ipse vero profunditatis expers erit. Et hæc est notio superficiæ.

Si jam omnes colores uno obducantur, qui sit omnibus partibus communis, limes EF videri desinet; adhuc tamen erit in tabula, quandoquidem locus manet ubi & albus defierat color, & niger coeperat. Quare sublati coloribus manet adhuc puncti, lineæ, & superficiæ notio.

Duo hinc eruuntur, i. hoc punctum, & hæc linea Physica non sunt; uti esset e.g. ferri filum tam tenue, quod neque latitudinem habeat, neque profunditatem, hoc enim fieri posse plerique negant.

2. Eiusmodi puncta, lineæ, superficiæ, posita corporum continuitate, non sunt res imaginariæ, quas sibi intellectus a rebus abstrahens coningat, sed verè existunt independentè ab ingenii nostri commentis. Corpora quidem non sunt, sed corporum affectiones, quæ

G E O M E T R I Æ.

3

ab invicem distrahi non possunt. Hinc punctum est terminus lineæ, lineæ superficiæ, superficies corporis.

Def. 5. Circulus est figura plana, unica curvæ lineæ comprehensa, quæ peripheria dicitur, sive circumferentia, ad quam omnes rectæ lineæ a puncto medio, quod centrum dicitur, ductæ, æquales sunt inter se.

6. Linea recta per centrum ducta, & utrinque in peripheria terminata diameter dicitur, quod circum bisectionem dividat.

Scholion.

In fig. 2. circulus est ADEB, sive FGLK; diameter est AB, sive FL, unde æquales sunt rectæ CA, CD, CE, CB, quæ semidiametri dicuntur, sive radii. Circulus dividi solet in partes æquales 360. quæ gradus dicuntur; singulos gradus partitur in 60. minuta prima, quodlibet minutum primum in 60 secunda, & sic in infinitum. Solent autem hæc designari quibusdam lineis numeris superimpositis, cum gradus per 0 designentur. Ita si forte occurrant 35° , $25'$, $36''$, $42'''$, lege 35 gradus, 25 minuta prima, 36 secunda, 42 tertia.

Si duo circuli idem habeant centrum, ac rectæ lineæ CD, CE comprehendunt in interiori circulo 30, aut 40 gradus, manifestum est, quod totidem gradus in exteriori comprehendunt; quod probe notandum est ad angulorum notionem rite concipiendam.

Sed antequam de angulis dicere aggrediar, subjiciam hic postulata, quæ nomine Geometriæ operationes designant, quas Geometria ex Mechanicis mutuatur. Constat autem has perfici posse, & per circinum, & regulam facile perficiuntur.

Postulata.

1. A puncto ad punctum rectam lineam ducere.
2. Rectam terminatam producere, ita ut recta maneat.
3. Ex dato puncto tanquam centro, dato intervallo, tanquam radio, circulum describere.
4. Ex recta majori partem auferre minori æqualem.

Scholion.

Quidquid geometricè fit, per hæc postulata perficitur; aliter non diceretur geometricè factum.

Def. 7. Angulus est unius rectæ lineæ ad alteram inclinatio.

Scholion.

Anguli notio est omnino necessaria, & ope circuli facillime concipitur. Duæ rectæ lineæ HK , FL , quæ concurrunt in C , efficiunt angulos LCH , HCF , FCK , KCL , qui non ex eo majores fieri intelliguntur, quod producantur ipsorum latera; sed ex eo profecto quod latera ipsa, sive crura divaricentur: quandoquidem anguli naturam in majori, aut minori inclinatione unius lineæ ad aliam consistit. Hinc angulorum mensura sunt gradus, quos ipsorum latera comprehendunt in peripheria circuli ex anguli vertice tamquam centro descripti. Si arcus EB 60 gradus continet, angulus LCH erit graduum 60. Et quia eundem numerum graduum continebit arcus HL , ad hunc angulum definiendum idoneus est quilibet circulus centro C descriptus.

Corollarium.

Hinc si ad punctum M . (Fig. 3.) rectæ datæ ON fieri debeat angulus æqualis angulo dato LCH , centro facto in C , & M , & quolibet intervallo, dummodo sit utrobique æquale, describatur arcus BE occurrens lateribus CL , CH , in B , & E ; itemque arcus QP indefinitè: tum facto centro in P intervallo BE ducatur arcus alterius circuli, qui ex priori abscindet arcum PQ æqualem arcui BE , & ducatur recta MQR ; patet angulum NMR æqualem fore dato angulo LCH .

Def. 8. Linea dicitur alteri lineæ perpendicularis, quando in ipsam incidens facit angulos hinc & inde æquales, cujusmodi sunt anguli GCL , GCF . Anguli hujusmodi dicuntur recti.

9. Angulus obtusus dicitur, qui est recto major, ut FCH .

10. Acutus, qui recto minor, ut HCL .

GEOMETRIÆ.

Coroll. 1.

Patet illum esse angulum rectum, qui quartam circuli partem, sive 90 gradus comprehendit; illum esse acutum, qui pauciores, illum obtusum, qui plures continet gradus.

Coroll. 2.

Manifestum est quoque, quod recta HC incidens in rectam FL vel duos angulos rectos facit (si videlicet cum perpendiculari coincidat) vel duobus rectis æquales: etenim anguli FCH, HCL simul sumpti totam semicircumferentiam, sive 180 gradus comprehendunt, totidem scilicet, quot duo recti.

Coroll. 3.

Hinc quocumque sint lineæ rectæ, quæ concurrant ad punctum C, omnes, quos faciunt, anguli KCL, LCK, KCF &c. totam peripheriam, sive 360 gradus comprehendunt, adeoque 4 rectis æquales sunt.

Coroll. 4.

Si rectæ HC, LC producantur, manifestum est, quod in unam lineam coalescere non possunt, sed efficiunt angulos FCK, LCH, qui dicuntur ad verticem oppositi, æquales inter se: cum sit enim dimidia peripheria FKL æqualis dimidiæ peripheriæ HLK, sublata communi parte KL, etunt arcus reliqui FK, HL æquales inter se.

Def. 11. Triangulum æquilaterum illud est, quod habet omnia latera æqualia, ut ABC. (Fig. 4.)

12. Isoscele dicitur, quod duo tantum habet æqualia latera, uti sunt AB, BC. (Fig. 5.)

13. Scalenum est, quod omnia habet latera inæqualia, ut ABC. (Fig. 6.)

14 Triangulum rectangulum est quod unum habet angulum rectum, ut BAC. (Fig. 6.)

15. Quadratum est figura quatuor lateribus constans, quæ & æqualia sint inter se, & ad angulos rectos iunctas. (Fig. 1.)

16. Si autem angulos quidem habeat rectos, sed duo latera opposita reliquis duobus majora, dicitur simpliciter rectangulum. (Fig. 7.)

17. Parallelae dicuntur rectae lineae, quae in infinitum productae nusquam sibi occurrunt, nec magis invicem accedunt,

Scholion,

Ex ipso parallelismi conceptu, affectiones quae parallelarum descendunt, quibus in demonstrandis gnopere laborant Geometrae vel ex hoc ipso, quod ne ullo magisterio natura ipsa de illarum veritate edocet. Sunt autem haec. Lineae rectae in eodem plano existentes vel convergunt, uti (Fig. 8.) GI , divergentes ex parte opposita GH , FC ; vel eodem ter se ubique distant intervallo nusquam invicem occurrentes, uti sunt AB , CD . Si aequae ubique distent invicem, ducta qualibet recta EO , quae parallelas secet in G , & F ; ipso naturae lumine notum est, eadem fore parallelas utriusque inclinationem ad rectam EO , adeoque erit 1.^o angulus OFD aequalis angulo OGB , quorum primus dicitur externus, secundus item internus & oppositus. 2.^o cum angulus GFC quetur angulo DFD ad verticem opposito (per Coroll. 4. Def. 10.) erunt etiam aequales anguli BGF , GF qui dicuntur alterni. 3.^o tandem anguli OFD , GF cum aequentur duobus rectis (per Coroll. 2. def. 1.) aequales item erunt duobus rectis anguli interni, & eandem partem positi DFG , FGB .

Pariter: quoties angulus OFD aequalis erit interno & opposito FGB , erit eadem inclinatio rectarum CI AB ad rectam EO , ac proinde rectae illae neque convergunt, neque divergunt, sed parallelae sunt inter se. Rursus quoties aequales erunt anguli alterni BGF , GF vel duobus rectis erunt simul aequales interni ad eandem partem positi BGF , GFD ; semper angulus externus DFO aequalis erit angulo interno & opposito BG & rectae AB , CD erunt parallelae,

Coroll. 1.

En igitur tres parallelarum necessarias affectiones quarum ex una qualibet inferre licet rectas illas esse parallelas. 1.^o Angulus externus aequalis est interno & opposito,

opposito . 2.^o Anguli alterni æquales sunt inter se ;
3.^o Interni & ad eandem partem duobus rectis æquan-
tur.

Coroll. 2.

Si duæ rectæ AB, HK (Fig. 9.) parallelæ sint eidem
rectæ CD, erunt etiam inter se parallelæ. Etenim du-
cta recta EO illis occurrente in G, F, I, inclinatio
rectarum KH, BA ad rectam EO, eadem erit atque
inclinatio rectæ CD ad eandem.

Coroll. 3.

Si per datum punctum F ducere oporteat rectam CD
parallelam datæ rectæ AB ; ex quolibet hujus puncto
G ducatur recta GFO, & fiat (per Coroll. def. 7.) an-
gulus OFD æqualis angulo OGB, eritque recta FD pa-
rallela ipsi AB.

Scholion.

His parallelarum affectionibus nititur methodus ,
qua Eratosthenes telluris ambitum mensus est , Urbis
Siene puteos norat ille solstitii æstivi tempore solis
rayos in imo excipere , cum illis sol ad perpendicu-
lum immineret . Porro Siensem , & Alexandriam in eo-
dem meridiano sitas existimavit , ut eodem temporis
momento meridies utrobique esset ; ac præterea Siensem
Alexandria abesse stadiis 5000. His positis en metho-
dum , qua usus est . Sit T (Fig. 10.) telluris centrum
PAF meridiani circulus utrique Civitati communis . Sie-
ne , cui sol imminet ad perpendiculum , sita sit in P ;
& quidem si radius SP produci intelligatur , per cen-
trum terræ transibit . Sit demum A Alexandria . In hac
ita collocavit hemisphærium cavum CAD. ut acies stillæ
AE in centro esset hemisphærii , stilus vero ipse perpen-
dicularis esset horizonti , adeoque per terræ centrum
transiret si produci intelligeretur . Exinde in ipsa sol-
stitii meridie aciem umbræ a stilo projectæ AB diligen-
ter notavit , reperitque eam comprehendere in hemisphæ-
rio quinquagesimam partem totius peripheriæ , seu 7^o ,
12'. Cum radii Solis SPT, SEB ob immanem solis di-
stantiam sint ad sensum paralleli ; æquales erunt anguli

alterni BET, ETP; quare erit etiam angulus ATP; adeoque arcus AP, quinquagesima totius circuli pars. Igitur cum hæc ex hypothefi contineat stadia 5000, totus telluris ambitus continebit stadia 250000, sive passuum millia 31250, siquidem 8 stadia singulis passuum millibus tribuantur. Et hæc quidem methodus de causis minus est idonea ad exactam telluris dimensionem, ac perperam ab Eratosthene assumi censent, quod Sienes & Alexandria sub eodem jaceant meridiano, quod locorum intervallum stadiorum fuerit 5000, & quod radii SP, SE pro parallelis haberi possint. Nihil tamen minus libuit hujus Astronomi artificium exponere, ut vel hinc agnoscant Tyrones quantam & utilitatem, & voluptatem ex hoc studio sibi debeant polliceri, quantoque laboris in fructu Geometræ ex his levibus initiis, quæ nullius fere momenti videntur, gradum sibi fecerint ad ea cognoscenda, quæ longe ab oculis nostris natura seposuit.

Def. 18. Parallelogrammum est figura quadrilatera, cujus latera opposita parallela sunt. (Fig. 11.)

PROPOSITIO I.

IN omni triangulo si latus unum producat, angulus externus æqualis est duobus internis & oppositis: Et uniuscujusque trianguli tres anguli duobus rectis æquantur.

In Triangulo ABC (Fig. 12.) producto latere AC in D, angulus BCD externus dicitur. Dico igitur primò hunc angulum æquari duobus A & B internis & oppositis.

Demonstr. Ducatur CE parallela lateri AB (per Coroll. 3. def. 17.) Erit angulus externus ECD æqualis interno & opposito BAC (Coroll. 1. def. 17.): & angulus ECB æquatur alterno ABC: ergo totus angulus BCD æquatur duobus A, B: Q. E. D.

2. Tres anguli simul sumpti trianguli ABC, hoc est A, B, BCA æquantur duobus rectis. Nam (Coroll. 2. def. 10.)

G E O M E T R I Æ.

def. 10.) anguli BCD, BCA æquantur duobus rectis : sed BCD æquatur angulis B, & A: ergo anguli B, A, BCA æquantur duobus rectis. Q.E.D.

Coroll.

Hinc cujusvis trianguli tres anguli simul sumpti æquantur tribus angulis cujusvis alterius simul sumptis : quare si in duobus triangulis duo anguli inveniantur æquales, etiam tertius unius alterius tertio æqualis erit: & si unius trianguli duo anguli innotescant, etiam tertius notus erit.

Scholion.

Hujus propositionis usus incredibilis dictu est: Ex ea Keplerus ambitum telluris metiri docuit sine ullo ad solem, & stellas recurſu. Sint T & M (Fig. 13.) duorum montium vertices satis diffiti inter se: sitque AB arcus interceptus inter utriusque montis radices, quem diligenter metiri oportet. Præterea quam fieri poterit accuratissime notentur anguli CTM, CMT quos pendulum efficiet per rectas TC, MC ad centrum telluris constanter vergens, & linea visualis TM. Horum angulorum summam ex 180. gradibus aufer, differentia dabit Angulum ACB; ex quo cognosces quota portio totius circuli sit arcus AB, cumque hujus dimensio per notas mensuras deprehensa fuerit, ad easdem licebit totius ambitus dimensionem revocare.

Ricciolius hanc methodum adhibuit, ut ipse refert Geogr. Ref. lib. 5, cap. 33, in Turri campanaria Mutinensi in vertice montis Paterni, qui Bononia non longe abest. Invenit angulum CTM $90^{\circ}, 15', 7''$; angulum verò CMT $89^{\circ}, 26', 13'', 27'''$, his ex 180° , subductis reliquus fuit angulus C $18', 39', 33'''$. Cumque locorum intervallum AB repertum ab eo esset passuum Bononiensium $20016 \frac{1}{5} \frac{0}{4}$ facile intulit gradum telluris passus continere 64363. ac totum proinde ambitum passus 23 179680.

Accuratius multo quæsitæ sunt a recentioribus Telluris dimensiones, ex quibus constat imminui gradus a Polaris

Polis ad *Æquatorem*, & contra . Ad usum tamen præfentes, ubi Tellurem pro sphaera habere possumus, retinebimus cum Cassino Picardi mensuram, ut singuli gradus exapedas habeant 57060; hoc est, Milliaria Parisiensia 68, ac præterea passus 472 . Unde totus telluris ambitus continebit milliaria 24649, passus 920 . Minor proinde quam qui a Ricciolio inventus fuerat, ut patet si pes Parisiensis ad Bononiensem revocetur, qui ad illum est ut 1682 $\frac{2}{5}$ ad 1440.

PROPOSITIO II.

SI duo triacula duo latera habuerint æqualia, & angulos ab his lateribus interceptos æquales; & basim æqualem habebunt, & aream, & angulos æqualibus lateribus oppositos æquales.

In triangulis ABC, DEF (Fig. 14. 15.) sint AB, & BC unius latera æqualia alterius lateribus DE, EF, & angulus B æqualis angulo E; dico basim AC æqualem esse basi DF, Angulos A & C angulis D & F, & totum triangulum ABC toti triangulo DEF. Etenim si latus AB ejus æquali lateri DE superimponi intelligatur cum illo congruet, & ob angulum B æqualem angulo E etiam latus BC cadet super sibi æquale EF, & punctum C in F. Ergo basis AC congruet cum basi DF, angulus A cum D, C cum F, & totum triangulum cum toto, Ergo æqualia erunt (Ax.4.) Q.E.D.

Coroll. 1.

Rectæ igitur, quæ rectas lineas parallelas, & æquales jungunt, ipsæ quoque parallelæ sunt, & æquales. Nam si BC (Fig. 16.) parallela est, & æqualis rectæ AD, ducta AC erunt (Coroll. 1. def. 7.) anguli alterni BCA, CAD æquales. Quare in duobus triangulis BCA, DAC erunt latera BC, AC æqualia lateribus AD, AC, & anguli ab his lateribus intercepti æquales. Ergo & bases æquales erunt, & anguli alterni DCA, CAB; adeoque rectæ AB, CD parallelæ sunt, & æquales.

Cor.

Coroll. 2.

Si triangulum ABC (Fig. 17. 18.) sit isoscele , habens nempe duo latera AB, BC æqualia, eodem pacto ostenditur angulos A , C ab eadem æquales habere. Intelligatur enim ejusmodi triangulum bis positum , & triangulum BAC superimponi triangulo *b a c* situ inverso . Ob æqualitatem laterum inter se , latus AB superimpositum lateri *bc* cum illo congruet , & ob æquales angulos B & *b* jacebit BC super sibi æquale latus *cb*, quare punctis A & C abeuntibus in *c* & abas cum basi congruet , angulus A cum angulo *c*, & C cum *a*. Æquantur igitur hi anguli inter se , adeoque angulus A angulo C.

Coroll. 3.

Cum sit triangulum æquilaterum quaquaversus isoscele , omnes ejus anguli sunt æquales inter se , ac proinde erunt singuli 60 graduum . Si vero triangulum isoscele duobus æqualibus lateribus rectum angulum comprehendat , erunt duo reliqui semirecti , graduum singuli 45. (per Prop. 1.)

Coroll. 4.

Si AC (Fig. 19.) sit diameter circuli ADF , cujus centrum in C, & centro B intervallo BC describatur alter circulus priorem secans in D, & F, ducanturque rectæ CD, DB erunt hæ (def. 5.) æquales semidiametro CB, ac proinde æquales inter se . Ergo triangulum BCD erit æquilaterum , & angulus DCB itemque arcus DB graduum 60, sive sexta pars peripheriæ ADF. Quare si iterum centro facto in A intervallo AC abscendantur arcus AE, AG , constabit ratio , qua hexagonum regulare (hoc est figura sex æqualibus lateribus & angulis constans) in dato circulo inscribi possit. Illud quoque manifestum est , quomodo per gemini circuli descriptionem super data recta CB triangulum æquilaterum describi possit.

ELEMENTA

PROPOSITIO III.

SI duo triangula habuerint duos angulos æquales, & latus his angulis interjectum æquale, habebunt & reliqua latera, & aream æqualem.

Sint anguli A, C (Fig. 14. 15.) æquales anguli D, F , & latus AC lateri DF , dico fore latera AB, BC æqualia lateribus DE, EF , & totum ABC , totum DEF . Nam si latus AC lateri æquali DF superimponi intelligatur, anguli A & C congruent cum æqualibus D & F , ac proinde latera AB, BC cum lateribus DE, EF positione congruent. Quod autem etiam terminatione congruant patet ex eo, quod si punctum B lateris AB non caderet in punctum E , sed supra, vel infra, tunc latus BC necessario caderet vel extra, vel intra latus EF , adeoque angulus C major, vel minor foret angulo F contra hypothesim. Ergo punctum B cadit in E , & latera lateribus perfecte congruunt, & angulus B angulo E , & totum triangulum ABC cum toto DEF . Q. E. D.

Coroll. 1.

Si præter latera AC, DF æquantur anguli A, B angulis D, E ; etiam C æquatur F (per Coroll. pr. 1.) ac proinde & reliqua latera, & tota triangula æqualia. Quoties igitur in duobus triangulis æquantur ita duo anguli, & unum latus: tota sunt æqualia.

Coroll. 2.

Si triangulum ABC (Fig. 17. 18.) habet angulos ad basim A, C æquales, æqualia etiam habet latera his opposita. Nam si triangulum ejusmodi bis positum intelligatur, & ABC situ inverso superimponi triangulo abc ; ob æqualitatem angulorum inter se angulus A superimpositus angulo c cum illo congruet, & ob AC æqualem ac puncto C abeunte in a , angulus C congruet cum a , ac proinde AB cum bc , CB cum ab . Unde AB æquatur ipsi BC .

Coroll. 3.

Si in triangulo rectangulo acutorum unus fuerit femi-

mire.

GEOMETRIÆ.

13

irectus, alter quoque semirectus erit (Coroll. 1. pr. 1.) & triangulum proinde erit isoscele.

Scholion.

Hinc eruitur ratio omnium expeditissima ad turrum, aliorumve ædificiorum altitudines investigandas. Pareatur ex aliqua materia satis spissa triangulum MCN (Fig. 20.) rectangulum in C, & isoscele. Ita oculo applicetur in M, ut alterum latus NC situm verticalem constanter obtineat (id quod ope penduli ex N suspensi facile perficitur) ac tamdiu ad turrum accedas, vel ab eadem recedas, donec radius visualis secundum latus MN directus in turris TR vertice T terminetur. Notetur punctum Q, in quem desinit radius MC, eritque altitudo QT æqualis intervallo MQ. Cum enim parallelæ sint lineæ NC, TQ, ac proinde angulus TQC æqualis externo NCM (Coroll. 1. def. 17.) erit TQM rectus. Quare cum sit angulus M semirectus (Coroll. 3. pr. 2.) etiam T semirectus erit, & triangulum MQT isoscele; & latus TQ æquale lateri MQ, & tota turris altitudo TR æqualis rectis MQ, QR, quas metiri licet.

Coroll. 4.

Ex eadem propositione tertia eruitur, quod in omni parallelogrammo latera, & anguli oppositi sunt æquales, & totum parallelogrammum bifariam dividitur a diametro, sive diagonali AC. (Fig. 16.) Nam in triangulis ABC, ACD, præter basim AC communem, æquantur anguli alterni DCA, CAB, & DAC, ACB (Coroll. 1. def. 17.) ac proinde & reliquus angulus, & latera, & tota triangula æqualia sunt.

PROPOSITIO IV.

Si in duobus triangulis tria latera æqualia sint; & anguli æqualibus lateribus oppositi, & tota triangula erunt æqualia.

In triangulis ABC, DEF (Fig. 21. 22.) æqualia sint latera AB, BC, CA lateribus DE, EF, FD; dico etiam an-

angulos A, B, C æquales fore angulis D, E, F . Nam si latus DF concipiatur superimponi lateri æquali AC , vertex E cadet in B . Cadat enim, si fieri potest, extra verticem B in aliquod punctum G . Quoniam ex hypothesi AB æquatur lateri AG , & BC ipsi GC ; ducta BG , erunt isoscelia triangula BAG , BCG , ac proinde angulus ABG æqualis erit angulo AGB , (Coroll. 2, prop. 2.) qui cum sit minor angulo CGB , pars toto, etiam ABG minor erit eodem angulo BGC . Jam verò cum sit etiam triangulum BCG isoscele, erit idem angulus CGB æqualis angulo CBG : ergo prior ille ABG minor esset etiam hoc ultimo GBC , totum parte, quod est absurdum. Igitur non possunt esse latera AB , BC æqualia lateribus AG , GC , quin punctum G cadat in B . Quare [si triangulum DEF triangulo ABC superimponatur, uti dictum est, perfecte congruent, angulique, & areæ æquales erunt. Q.E.D.

Coroll.

Duo igitur circuli nonnisi in duobus punctis se mutuo intersecant. Nam si recta AC (Fig. 23.) centra jungat duorum circulorum se mutuo secantium in B & H ; ductis rectis lineis AB , BC , sequitur ex modo demonstratis inveniri non posse ex parte ipsius B punctum aliud G , ad quod ductæ lineæ AG , GC æquentur duabus AB , BC : quod tamen necesse esset, si punctum G in utriusque circuli peripheria situm esset; adeoque si in eo puncto iterum se circuli intersecarent.

PROPOSITIO V.

Datum angulum rectilineum bifariam dividere. Oporteat bifariam dividere angulum rectilineum HCI . (Fig. 24.) Centro factò in C , quolibet intervallo CA describatur circulus EAL secans alterum latus in B , ac deinde centris A & B , eodemque intervallo nentur arcus circulorum sibi mutuo occurrentium in K , & ducta KC , dico quod hæc datum angulum bifariam scabit, Etenim in triangulis ACK , BCK ex constructio-

tis

GEOMETRIÆ.

15

ne latera AC, AK æquantur lateribus CB, BK, & basi CK utrique communis est: ergo (prop. 4.) anguli æqualibus lateribus oppositi æquales sunt, adeoque angulus ACK æquatur angulo KCI: Q.E.F.

Scholion.

Anguli trisectio, sive methodus, qua quivis angulus in tres partes æquales dividi possit, frustra a Geometris quæsitæ est per circinum & regulam. Franciscus Vieta solutionem hujus problematis mechanicam dedit, sed elegantem, & expeditam. Sit angulus HCI (Fig. 25.) quem oporteat in tres partes dividere. Centro facto in C quovis intervallo CA describatur circulus ABD secans latus CI in B, & latus HC indefinite productum versus F in A & D. Regula BF circa punctum B moveatur, donec ita occurrat rectæ AD in F, ut segmentum EF inter hoc punctum, & peripheriam interceptum circino inveniantur æquale rectæ CA (id autem est, quod geometricè fieri nequit): tum sumptis arcibus AG, GK æqualibus arcui DE, ducantur rectæ CG, CK; eritque angulus HCI in tres æquales partes divisus. Etenim ducta CE, erit hæc æqualis radio CA, cui per constructionem æqualis est recta EF; erit ergo isoscele triangulum CEF, ac propterea æquales anguli ECF, EFC (Coroll. 2. prop. 2.). Quare cum angulus externus CEB horum quolibet duplus sit (Prop. 1.) cumque sit etiam triangulum BCE isoscele, erit etiam angulus CBE duplus angulo F. Ergo angulus externus BCH æqualis duobus internis oppositis B & F, triplus erit angulo F, sive ECD, qui est illi æqualis; ac propterea triplus erit tam angulo ACG, quam angulo GCK. Unde etiam KCB tertia pars est totius HCB, & HCB in tres æquales partes divisus est: Q.E.F.

Coroll. 1.

Si puncta AB, (Fig. 24.) jungantur recta AB, quæ occurrerit rectæ CK in D, in triangulis ACD, BCD, præter latera AC, CB æqualia, & latus CD commune, anguli ACD, BCD ab æqualibus lateribus intercepti æqua-

les

les sunt : ergo etiam basis AD basi DB æqualis erit (Prop. 2.). Quare si rectam terminatam AB bifariam dividere oporteat, vides quid facto opus sit. Nempe centro facto in A, & B quolibet intervallo, dummodo utrobique idem sit, satis erit notare arcus circulorum sibi mutuo occurrentium in punctis C & K, & hæc puncta jungere recta CK, quæ datam lineam bifariam secabit in D.

Coroll. 2.

Ex eadem prop. 2. constat æquari angulos CDA, CDB: ac propterea CD perpendicularis est rectæ AB. Ergo si ex puncto C demittere oporteat perpendicularem lineam in rectam indefinitam FG, satis erit centro C, & quolibet intervallo CA notare arcum circuli AB, & invento, uti supra dictum est, puncto K, rectam ducere CK, quæ ad perpendicularum insisteret rectæ datæ in puncto D.

Coroll. 3.

Quod si in ipsa recta FG detur punctum D, ex quo perpendicularum oporteat excitare, sumptis ad arbitrium AD, BD hinc & inde æqualibus; centro facto in A & B, eodem intervallo notentur arcus circulorum, qui se mutuo interfecant in C, ducaturque CD, quæ erit perpendicularum quæsitum. Nam in triangulis CDB, CDA latera omnia æqualia erunt, ac propterea anguli CDB, CDA æquales (per Pr. 4.)

Coroll. 4.

Ex iisdem demonstrationibus patet, quòd in circulo EABL recta CD per centrum transiens, si bifariam secat chordam AB, secat etiam ad angulos rectos: & si secat ad angulos rectos bifariam secat.

Schol. 2.

Ex perpendicularium doctrina, ac præcipuè ex prop. 3. ratio pender ictus reflexi in ludo tridiculari, sive unica reflexione opus sit, sive duplici.

Præmittere tamen oportet tamquam experientia notum, globum perfecte elasticum A (Fig. 26.) cujusmodi ferè sunt eburnei, obliquè occurrentem plano
immo-

immobili CD in B ita resilire versus F, ut fiat angulus reflexionis DBE æqualis angulo incidentiæ CBA: quam legem in luminis reflexione natura constanter servat.

Sit igitur M C D F (Fig. 27.) mensuræ lusoriæ portio, in qua spheram eburneam A trajicere oporteat per anulum ferreum E ex parte ipsius, quæ respicit punctum N. Producat EN ad CD perpendicularis in I, donec fuerit IN æqualis ipsi NE. Sphæra impellatur versus punctum I, quæ occurrens repagulo immobili in B resiliet per BE, anulumque trajiciet. Etenim in triangulis EBN, IBN æquantur latera EN, NI, & BN utrique commune; quare cum æquantur anguli recti BNE, BNI ab his comprehensi, tota æqualia sunt (Prop. 2.), & anguli EBN, IBN æquales. Sed angulus IBN æquatur angulo CBA ad verticem opposito (Coroll. 4. def. 10.); ergo etiam angulus NBE æquatur angulo CBA, & sphæra impulsæ per rectam BA resiliet per rectam BE.

Si in linea AB alia sphæra jaceat quæ motum per AB impediatur, id ipsum duplici reflexione poterit hoc pacto obtineri. Ex A ducatur in repagulum CM perpendicularum AM, quod producat in L, donec fuerit LM æqualis ipsi AM. Ex L inspiciatur idem, de quo supra, punctum I, & notentur puncta K, H, quibus in utroque repagulo linea visualis occurreret. Dico, quod si sphæra impingat in K, inde resiliet per KH, & iterum impingens in H resiliet per HE, anulumque trajiciet. Nam demonstrabitur ut supra æquari angulos AKM, LKM, CKH, itemque KHC, IHN, NHE.

Si recta LI tota jaceret extra angulum C, casus esset impossibilis. Sæpe etiam continget, ut repagula MC, CD vel superficiem habeant inæqualem, vel non satis firma sint, in quo casu angulus reflexionis angulo incidentiæ æqualis non erit. Ad hæc ipsa sphæræ moles, cujus nullam habuimus rationem, si satis magna sit, aliquem producet errorem, præsertim in angulis valde acutis.

PROPOSITIO VI.

Parallelogramma super eadem basi, & intra easdem parallelas constituta æqualia sunt inter se.

Super eadem basi AD (Fig. 28.), & intra easdem parallelas AD, BF, sint parallelogramma ABCD, AEFD. Dico hæc æqualia esse.

Dem. In triangulis ABE, DCF æquantur latera AE, DF, & AB, DC (Coroll. prop. 3.), itemque EF, & BC æquales eidem AD, æquales erunt inter se: itaque addito communi segmento CE, erit quoque latus BE æquale lateri CF, & tota triacula æqualia (Prop. 4.) Dempto igitur communi triangulo CLE, erit quadrilaterum BCLA æquale quadrilatero DLEF, & addito communi triangulo ALD erit parallelogrammum ABCD æquale parallelogrammo AEFD. Q. E. D.

Coroll. 1.

Ductis AC, AF erunt triacula ACD, AFD parallelogrammorum dimidia (Coroll. 4. pr. 3.) Ergo etiam triacula super eadem basi, & intra easdem parallelas constituta æqualia sunt.

Coroll. 2.

Si non eidem basi; sed æqualibus tamen basibus intra easdem insistant parallelas, & triacula, & parallelogramma erunt æqualia. Etenim si parallelogramma DB, HE habent æquales bases AD, GH, ductis rectis lineis AE, DF ob AD & EF parallelas, & æquales eidem GH: adeoque & inter se, erunt AE, DF parallele, & æquales (Coroll. 1. pr. 2.), eritque AEFD parallelogrammum, quod cum sit æquale parallelogrammis ABCD & EGHF erunt hæc æqualia inter se.

Coroll. 3.

Igitur parallelogrammum duplum est trianguli super eandem vel æqualem basim, & intra easdem parallelas constituti.

Scholion.

Multa ex hac propositione & mira, & utilia descendunt. Ac primo quidem ostenditur, nullam esse quantita-

titatem ita tenem, qua minor dari non possit. Cum enim recta BF in infinitum produci possit, puncto F magis ac magis recedente a puncto B, dummodo sumatur EF æqualis rectæ BC, sive AD, semper parallelogrammum AEFD utcumque productum æquale erit parallelogrammo ABCD, unde apparet nullum in eo producendo, vel attenuando limitem inveniri. Quod si hæc parallelogramma sint corporum superficies, quæ ex. gr. habeant unius digiti grassitudinem, poterit idem corpus in infinitum attenuari, & produci.

Secundo: licebit metiri planam quamlibet superficiem in plura divisam triangula, & agrorum dimensiones ad invicem comparare; in qua re cum veterum Geometrarum potissimum se exerceret industria, inde facultas ipsa & nomen habuit, & ortum. Nam in primis quodlibet rectangulum BD (Fig. 29.) tot unius pedis quadrata, sive, ut ajunt, quadratos pedes continebit, quot prodierint; si unum latus per alterum multiplicetur; quandoquidem si latus AD quatuor continet pedes, AB, verò quinque, ductis totidem lineis adjacenti lateri parallelis, quatuor erunt ordines quadratorum pedum, & in singulis ordinibus quinque pedes quadrati; quare ut omnium summam habeas, duc 4 in 5, & habebis 20 pedes quadratos totius areæ dimensionem. Jam verò triangulum AED super eadem basi, & intra easdem parallelas ejus rectanguli dimidium est, & demissa perpendiculari EF in basim AD productam, si opus fuerit, erit hæc æqualis lateri AB. Unde ad habendam aream trianguli, dimidia basis in ejus altitudinem ducenda erit, vel dimidia altitudo in basim. Sic in eadem hypothese dimidia basis duorum pedum, ducta in altitudinem EF quinque pedum, dabit 10 pedes quadratos, qui erunt ejus trianguli dimensio.

Igitur si metiri oporteat superficiem polygoni ABCDE (Fig. 30.) dividatur in triangula, ductis rectis DB, DA ab uno angulorum in alios, & habebitur singulorum dimensio ex basi, & altitudinis dimensione, quæ in singulis fuerit inventa, Contineat ex. gr. basis BD

pedes 30; altitudo CF 20, duc 30 in 10, sive 15 in 20; habebis pedes quadratos 300, dimensionem trianguli BCD. Quod si idem in reliquis triangulis facias, habebis ex omnium summa totius polygoni dimensionem.

Eadem ratione areæ circularis dimensio obtinetur. Cum enim circulus ABE (Fig. 31.) divisus possit intelligi in infinitos sectores BCD, qui nullam ferè habeant curvitatē in arcu infinitè parvo, hi pro triangulis haberi possunt, quorum basis sit arcus BD, altitudo verò radius CB; itaque singulorum dimensio habetur ducendo radium BC in dimidium arcum BD; adeoque omnium summa, seu, quod perinde est, areæ circularis æquatur facto ex dimidia peripheria in radium. Itaque si circularis areæ mechanica dimensio queratur, peripheriam, & radium metiri oportet, & hunc in dimidiam ducere peripheriam.

PROPOSITIO VII.

IN omni triangulo rectangulo quadratum lateris angulo recto oppositi æquatur quadratis reliquorum laterum simul sumptis.

Sit triangulum BCD (Fig. 32.) rectangulum in C. Dico quadratum BAGD hypotenusæ, seu subtensæ DB (sic enim vocant latus angulo recto oppositum) æquari quadratis reliquorum laterum DHIC, CKLB simul sumptis. Ducatur enim CF parallela lateribus BA, DG (per Coroll. 3. def. 17.), & rectæ BH, CG. In duobus triangulis CDG, HDB latera DG, DC æquantur lateribus DB, DH (per def. 15.) anguli verò ab his lateribus comprehensi GDC, BDH æquales sunt, cum ambo coalescant ex angulo recto, & angulo CDB utriusque communi. Ergo tota triangula æqualia sunt (per prop. 2.) Sed triangulum GCD habet eandem basim cum rectangulo DGFE, & intra easdem parallelas GD, CF continetur; ergo hoc rectangulum hujus trianguli duplum est (per prop. 6.) Similiter quadratum DCIH duplum est trianguli DBH, sunt enim super eandem basim HD, & intra easdem parallelas HD, IB constituta

ergo cum æqualia sint triangula, erit etiam quadratum HICD æquale rectangulo GDEF. Eadem demonstratione ostenditur quadratum CBLK æquari rectangulo FEBA: ergo quadratum subtensa DB æquatur quadratis laterum rectum angulum comprehendentium : Q. E. D.

Coroll.

Quod si quadrata duorum laterum in triangulo simul sumpta æqualia sint tertii lateris quadrato, facile ostenditur angulum huic lateri oppositum rectum esse. Nam si in triangulo ACB (Fig. 33.) quadrata laterum AC, CB simul sumpta æquantur quadrato lateris AB, & puncto C erigatur super CB perpendicularis CD (per Coroll. 3. pt. 5.) quæ fiat æqualis lateri CA, & ducta BD, erit hujus quadratum æquale quadratis laterum BC, CD, sive BC, CA per construct. adeoque etiam quadrato AB ex hypothesi. Igitur recta AB æquatur rectæ BD, & (per prop. 4.) triangula ACB, BCD æqualia sunt, & Angulus ACB æqualis angulo BCD, qui rectus est per constructionem.

Scholium.

Per hanc propositionem, cujus auctor fertur Pythagoras, datis in triangulo rectangulo duobus lateribus, tertius invenitur. Nam si unum latus ex. gr. 3. palmorum sit, alterum 4; quadratum primi 9 quadratos palmos continebit, quadratum alterius 16; igitur horum summa dabit quadratum lateris angulo recto oppositi palmorum 25, cujus radix erit ipsa lateris extensio, quinque scilicet palmorum. Contra si detur latus angulo recto oppositum 5 palmorum, & alterutrum latus 3 palmorum, ex primi quadrato 25 aufer quadratum secundi 9, & differentia 16 erit quadratum lateris quesiti, cujus radix 4. est ipsum latus.

Porrò sicuti factum ex numero in seipsum ducto numeri quadratum dicitur, ita numerus qui in seipsum ductus datum efficit numerum hujus radix quadrata dicitur. Ita quadratum 3 est 9, & radix 9 sive $\sqrt{9}$ (sic enim radices designantur) est 3. Igitur datis in triangulo rectangulo lateribus duobus, utriusque qua-

dratum, ac propterea quadratum tertii lateris numquam non licebit obtinere. At non semper ipsius quaesiti lateris exacta habebitur dimensio, quandoquidem non omnis numeri quadrata radix inveniri potest nisi per approximationem. Sic Radix 1 est 1, & $\sqrt{4}$ est 2, at ipsius 2 non potest accurate radix inveniri, cum nullus sit numerus vel integer vel fractus, qui in seipsum ductus efficiat 2. Deserviunt Arithmetici $\sqrt{2}$ quamproximè: æqualem nempe 1. 4142 &c. hoc est, unitati, quatuor decimis partibus unitatis, uni centesimæ, quatuor millesimis, duabus denismillesimis; verum supersunt adhuc ad exactam radicem obtinendam plus quam duæ, & minus quam tres denæ millesimæ partes unitatis, & numquam ea radix determinabitur, quin aliqua quantitate vel a vera deficiat, vel veram excedat. Si itaque latera rectum angulum comprehendentia æqualia sint, subtrinsa latus unum continebit, ac præterea quatuor decimas ipsius partes, 1 centesimam 4 millesimas, 2 denas millesimas, & sic in infinitum, ita ut aliquid semper supersit, nec ullo possit vel integro vel fracto numero exactè definiri; ex quo quantitarum divisibilitas in infinitum colligitur.

Hinc etiam quantitarum incommensurabilium notitia pendet. Mensura quantitatis dicitur quantitas, quæ aliquoties sumpta illam adæquat. Ita pes est passus mensura, qui quinque pedibus constat; digitus est mensura pedis Parisiensis, qui duodecim digitis constat; at ejusmodi digitus pedem Romanorum non metitur, nam decies sumptus ipsam non adæquat, & undecies sumptus ipsum excedit, siquidem pes Romanus decem continet digitos Parisienses ac præterea 11 partes ipsius duodecimas, posita ratione pedis Parisiensis ad Romanum, ut 144 ad 131.

Quantitates commensurabiles dicuntur illæ, quæ aliquam habent communem mensuram: Ita pes Romanus, & Parisinus commensurabiles sunt, communemque mensuram habent Lineam sive duodecimam digiti partem, siquidem Parisinus ejusmodi Lineas continet 144, Romanus 131.

Con-

Contra incommensurabiles sunt, quæ nullam habent mensuram communem.

Quod dentur ejusmodi quantitates incommensurabiles etiam Geometria demonstrat, cum geometricè demonstretur in triangulo rectangulo & Isoscele ABC (Fig. 34.) nullam esse communem mensuram lateris AB, vel BC, & subrepsæ AC. Duo tamen præmittere oportet axiomata, quæ ex datâ Mensuræ definitione per se patent.

I. Quod metitur totum, & ejus partem, etiam residuum metitur.

II. Quantitas major minorem metiri non potest.

Sit igitur, si fieri potest, BM communis mensura basium AC, & laterum. Bisariam dividatur angulus BAC (per prop. 5.) per rectam AE, quæ occurrat in E lateri BC, & ex E ducatur in basim perpendicularum EF (per Coroll. 2. prop. 5.), ducaturque EG basi parallela (per Coroll. 3. def. 17.) In duobus triangulis AEB, AEF præter basim AE communem, & angulos ad B & F rectos, æquales erunt anguli ad A: ergo etiam latera AF, FE æquantur lateribus AB, BE (per Coroll. 1. prop. 3.) Præterea ob parallelas GE, AC facillè ostenditur esse etiam isoscele triangulum GBE (Coroll. 1. def. 17. & Coroll. 2. prop. 3.) cumque duobus triangulis rectangulis EFC, ABC communis sit angulus C: erit (Coroll. pr. 1. & Coroll. 2. pr. 3.) isoscele etiam triangulum EFC: Quare ob æqualia latera EB, EF, erunt etiam æqualia BG, FC, eruntque æqualia (per prop. 2.) triangula rectangula EBG, EFC, & æquales bases EG, EC. Quod si iterum bisariam secetur angulus BGE per rectam GH, & demittatur HL perpendicularis in GE, & HL eidem parallela, eadem demonstratione inveniuntur æquales rectæ lineæ GB, GL; BH, HL; BI, IE, ac demum HI, HE: eademque omnino contingent, si hæc operatio continuari intelligatur donec recta respondens ipsi GH cadat alicubi in D supra M.

Jam verò si BM metiebatur & latera AB, BC, & basim AC, metiretur quoque AF æqualem ipsi AB, er-

go per primum axioma ex paulo ante traditis metietur quoque ipsius residuum FC , & GB , BE ipsi æquales sed metiebatur totam BC , ergo etiam residuum EC , & ipsi æqualem GE . Eodem argumento ostenditur eandem BM metiri rectas GL , LE , IB , BH , HE , HI &c unde patet eo demum deveniri ut eadem BM metiatur quoque BD se minorem, quod implicat per axioma secundum. Ergo nequit inveniri communis mensura laterum AB , BC , & basis AC , licet minor & minor in infinitum inquiretur.

PROPOSITIO VIII.

IN omni triangulo majori lateri major angulus opponitur.

In triangulo ABC (Fig. 35.) sit latus AB majus latere AC ; dico etiam angulum ACB majorem fore angulo ABC .

Demonst. abscindatur ex majori latere segmentum AD æquale lateri AC , & ducta CD erit triangulum ACD isoscele, adeoque (Coroll. 2. prop. 2.) angulus ADC æqualis erit angulo ACD : sed CBA minor est externo CDA (prop. 1.) ergo minor est angulo ACD , & adhuc minor angulo ACB , Q. E. D.

Coroll. 1.

Hinc sequitur in omni triangulo majori angulo majus latus opponi. Sit enim angulus ACB major angulo ABC ; latus AB non erit lateri AC æquale, nam triangulum esset isoscele, & anguli prædicti essent æquales (Coroll. 2. prop. 2.): sed neque latus AB minor est latere AC , nam angulus ABC major esset angulo ACB ex demonstratis, reliquum ergo est, ut AB majus sit latere AC .

Coroll. 2.

Quod si igitur in duobus triangulis ABC , ABD (Fig. 36.) fuerint duo latera AB , BC , æqualia duobus AB , BD , anguli verò ab his lateribus comprehensi fuerint inæquales, erit basis AD quæ majorem angulum sub-

tendit,

tendit, major quam AC minori angulo opposita. Nam si intelligatur unius trianguli latus AB lateri alterius sibi æquali superimponi, ut hic factum supponitur, congruent quidem ista latera, sed latus BD cadet extra latus BC ob angulum ABC majorem angulo ABC. Jam verò centro facto in B intervallo BD describatur circulus, qui transibit per C ob æquales BD, BC, ducaturque CD. Erit CBD isoscele, in triangulo verò AC D angulus ACD major est angulo BCD, ac proinde angulo quoque CDB (per Cor. 2. pr. 2.) ergo multo major erit angulo CDA; adeoque latus AD oppositum angulo majori majus est latere AC, quod minori opponitur.

Coroll. 3.

Contra verò si duo triangula, duo latera habuerint æqualia, unius vero basis alterius basi major sit, erit angulus basi oppositus in illo major quàm in hoc. Nam si hos angulos æquales esse dicas, bases quoque æquales esse oportebit (per prop. 2.) quod est contra hypothesein; si vero dicas angulum minori basi oppositum majorem esse, ex modo facta demonstratione constabit hunc angulum a majori basi sublendi, quod hypothesein item repugnat.

Coroll. 4.

Omnium rectarum, quæ ab aliquo puncto C (Fig. 37.) duci possunt ad rectam indefinitè productam KL, brevissima est perpendicularis CB; nam si ducatur alia quævis CA in triangulo rectangulo CBA erunt anguli C & A simul sumpti recto æquales (Coroll. 3. prop. 2.); ergo angulus A minor est recto ABC, adeoque latus AC majus est latere CB; id quod etiam ex præcedenti constat, siquidem quadratum lateris AC æquatur quadratis laterum AB, BC simul sumptis.

Coroll. 5.

Quod si igitur centro facto in C intervallo CB circulus describatur, hic rectam CA alicubi secabit in G ita ut abscindat CG æqualem CB. Ergo quodlibet punctum A rectæ AL extra circulum cadet, qui propterea

tangitur ab hac recta in unico puncto B, in quo perpendicularis est diametro BC. Recta igitur, quæ ab extrema circuli diametro eidem perpendicularis ducitur, circuli tangens est.

Coroll. 6.

Si ducatur BF sub angulo quantumvis tenui ABE, sique fiat æqualis angulus BCA, in triangulo EBC, erunt duo anguli EBC, & BCE simul sumpti æquales recto ABC: ergo tertius angulus CEB rectus erit (prop. 1.), & recta CE erit per hanc minor recta CB, sive CG. Quare punctum E erit intra circulum. Ex quo sequitur inter tangentem AB & arcum circuli nullam duci posse rectam lineam BEF; & angulum, quem arcus circuli efficit cum tangente minorem esse quolibet rectilineo, licet hic in infinitum minuat.

Coroll. 7.

Si duo circuli FGB, IOB (Fig. 38.) eandem habent tangentem, recta PB eidem in eodem puncto perpendicularis per utriusque centrum C, D transibit, id quod ex Corollario quarto facile deducitur. Quod si ducatur CG, & DG, quæ producta secabit in O circulum IOB, & in N tangentem AB, erit semper in triangulo GDC latus DG minus duobus reliquis GC, CD simul sumptis (quod etiam facile ostenditur per hanc, & Coroll. 2. prop. 2; & per se patet); Quare cum radii CG, CB æquales sint, erit recta DG minor quam DB, sive DO, quæ item ut DB radius est circuli IOB. Ergo quodlibet punctum G circuli FGB erit intra circulum IOB, ac propterea illi circuli in unico puncto B se mutuo contingunt ubi rectam tangunt AH,

Scholion.

Hinc quoque divisibilitas in infinitum, & admirabilis infiniti naturæ deducitur. Nam si adhuc supra punctum D centro facto in L describatur circulus QMB, ille quoque dictos circulos, & communem tangentem AH in unico puncto B contingeret, ac proinde rectam DN alicubi secabit in M inter O & N, & si alij & alij in infinitum majori semper radio describantur circuli,

minus semper abscindunt segmentum MN, illud-
 toridem partes secabunt; cumque incrementa ra-
 tiorum nullum habeant limitem, nullum pari-
 debunt decrementa rectæ MN. Quod vdrò ma-
 habet admirationem, & magnas omni tempore
 tiones excitavit, angulus contactus, quem sci-
 citur arcus FGB cum tangente AB in infinitas par-
 tiditur ab arcubus illorum circulatorum, licet ipse
 angulo rectilineo minor sit ex Coroll. 4. Hujus
 non alia videtur esse causa, quam anguli rectilinei
 diversa ab ea quam habet angulus curvilineus in
 contactus: ita ut, quemadmodum infinitæ lineæ
 quam superficiem efficiunt, nec ulla inter has quan-
 ratio potest assignari licet in infinitas partes di-
 possint; ita etiam infiniti anguli contactus quovis
 eo minores sint, licet sint divisibiles in infinitum.
 id id majorem habeat admirationem; tamen Geo-
 demonstrationes percipienti erit evidens angu-
 contactus & minorem esse quovis rectilineo, & in
 curvilineos dividi posse.

PROPOSITIO IX.

circulo angulus ad centrum duplus est angulo ad
 peripheriam, si eidem arcui insistant.

Idem arcui AB (Fig. 39. 40. 41.) insistant anguli
 ad centrum, & ADB ad peripheriam; dico primum
 hoc altero duplum esse.

Nam si alterutrum latus DA per centrum transeat
 in Fig. 39.) cum æquales sint anguli CDB, CBD
 angulo isoscele BCD, erit externus BCA æqualis
 interius oppositis CDB, CBD (prop. 1.) ac du-
 ipsorum utrovis D.

Quod si centrum C cadat vel intra angulum, ut in
 40., vel extra, ut in Fig. 41., ducta DCE, erit ut
 angulus externus ACE duplus interno opposito
 DE, itaque ECB duplus angulo EDB: quare angulus
 ACB

ACB, qui est angulorum ACE, ECB summa in differentia in secundo casu, duplus est angulo A qui angulorum ADE, BDE est item summa in differentia in secundo casu: Q. E. D.

Coroll. 1.

Quare sicut anguli ad centrum mensura est rectus, cui insistit, erit anguli ad peripheriam in dimidium illius arcus. Angulus igitur ADB (Fig. diametro AB, hoc est semiperipheriæ AFB insistenti) quique angulus in semicirculo dicitur, mensuram quartam circumferentiæ partem, ac rectus proinde angulus EDB in minori segmento existens, ac propterea arcui majori EFB insistenti obtusus, ac demum angulus FDB in majori segmento acutus est.

Coroll. 2.

Si ex dato puncto A (Fig. 43.) ducere oportet rectam lineam, quæ datum circumferentiam tangat, ducaturque recta AC ad centrum dati circuli C, eaque bisariam dividatur in B (Coroll. 1. pr. 5.) centro facto in B, intervallum describatur circulus priorem secans in D & E, ducanturque rectæ AD, AE, quæ circumferentiam tangent (Coroll. 5. prop. 8.). Junctis enim punctis E, C, Iste erit tam angulus AEC, quam ADG, cum uterque in semicirculo existat.

Coroll. 3.

Hinc quoque manifestum fit in omni quadrilatero ABCD (Fig. 44.) circulo inscripto angulos oppositos sumptos duobus rectis æquari. Etenim mensura anguli ABC est dimidius arcus ADC, & mensura anguli ADC est dimidius arcus ABC. Quare utriusque mensura est semicirculus, sive 180° . Unde et facile deducitur, quod quadrilinerum, in quo anguli oppositi duobus rectis æquantur, in eodem circulo existit.

Coroll. 4.

Mensura anguli ABC (Fig. 45.), quem efficiunt chordæ CD, AE intra circumferentiam concurrentes, erit semis mensura arcuum interceptorum AC, DE: mensura vero anguli

PC, quem efficiunt chordæ AE, CG extra circulo concurrentes erit semidifferentia arcuum intercedentium AC, EG. Ducta enim EC erit angulus externus ABC (Prop. 1.) æqualis duobus internis oppositis BCE, quorum alterum metitur dimidius arcus AB, alterum dimidius arcus DE; horum igitur summam, angulum ABC metitur semisumma eorundem arcuum. Pariter cum angulus externus AEC æquetur internis oppositis ECF, EFC, erit angulus AEC dempto angulo ECG æqualis angulo F, sed anguli AEC mensura est dimidius arcus AC, & anguli ECG dimidius arcus EG. Ergo mensura anguli F est dimidius arcus AC dempto arcu EG, sive semidifferentia eorundem arcuum.

Coroll. 5.

Chordæ circuli AB, CD (Fig. 46.) parallelæ sint; CB, erunt anguli alterni DCB, CBA æquales (I. def. 7.) ac proinde arcus quoque AC, DB sunt, cum ipsorum dimidia æquales angulos metantur. Ergo lineæ in circulo parallelæ æquales utriusque intercipiunt.

Coroll. 6.

Angulos ABE, ABF (Fig. 47.) quos efficit chorda cum tangente EF metiuntur arcus dimidii BA, B. Enim cum sit diameter DB tangenti perpendicularis (Coroll. 3. prop. 8.) & ducta AD angulus in semicirculo DAB rectus sit, erunt anguli reliqui ejusdem anguli ADB, ABD simul sumpti æquales recto EBD (Coroll. 3. prop. 2.). Quare sublato communi ABD erit angulus ADB æqualis reliquo EBA, ac proinde hujus mensura eadem erit quæ anguli ADB, dimidius nempe arcus AB. Præterea anguli ABE, ABF duobus reperiuntur æquantur, (Coroll. 2. def. 10.) & mensuram habent semicirculi, quare cum angulum ABE metiatur dimidius arcus AB, anguli ABF mensura erit dimidium arcus ADB.

Scholion.

Præterque propositionum, quas Euclides in secundo demonstravit, vel etiam in tertio, facilius de-
mon-

monstrantur; præmissis aliquibus ex sexto, quæ portionum doctrinam supponunt: Hanc ab Euclides traditam & obscure in quinto breviter hic & cide exponemus.

Nosse oportet in primis notarum quarundam significationem, quatum usus in Algebra frequens est. Teræ a, b, c &c. denotant quamlibet quantitatem & ut a cognitis incognitæ discriminantur has desolent postremis alphabeti litteris x, y, z &c.

Signum additionis est $+$, effertur autem plus $2 + 3$ legitur, duo plus tria; ac denotat utriusque illius numeri summam.

Signum subtractionis est $-$, effertur autem minus. Sic $5 - 2$; legitur, quinque minus duo, ac datur id quod relinquitur, si e priori numero postea auferatur.

Signum æqualitatis est $=$, sic $2 + 3 = 5$ datur summam duorum numerorum tertio æqualem.

$>$ est signum excessus unius quantitatis super aliam, $<$ verò est signum defectus unius quantitatis ab alia. Sic $10 > 8$ denotat denarium numerum majorem se quam 8, & $7 < 9$ denotat 7 esse minorem quam 9.

Si quantitati quantitas interposita lineola subjiciatur, quotum denotat ex superiori per inferiorem divisi. Sic $\frac{a}{b}$ denotat quotum ex a divisa per b , seu quæ inferior terminus b qui denominator dicitur, in superiori, seu numeratore contineatur. Sic $\frac{8}{2} = 4$. Designari etiam solet divisio unius quantitatis per aliam duobus punctis litteris interjectis, sic $a : b = \frac{a}{b}$.

Denum signum multiplicationis est \times , & effertur factum. Sic $a \times b$ legitur a in b , & denotat factum multiplicatione ipsius a per b . Sic $2 \times 3 = 6$, hoc 2 ter sumpta efficiunt 6. Cæterum multiplicatio quantitatum per litteras communiter designari solet per mediatam ipsarum litterarum conjunctionem. Sic a deno-

denotat factum ex a in b , five a toties sumi, quot unitates continentur in b , si b numerus est integer. Quod si quantitas se ipsam multiplicet, denotatur factum apponendo litteræ ad partem ejus dextram numerum, qui aliquantulum supra ipsam litteram affargat. Sic aa , five quadratum a scribitur a^2 , & aaa , five cubus ipsius a scribitur a^3 , & sic deinceps.

Proportio alia est Arithmetica, alia Geometrica. Arithmetica est quæ inter quatuor terminos invenitur, quorum duo primi æque differunt inter se, ut duo reliqui, ita ut si primus secundo major est, etiam tertius major sit quarto, & contra. Indicatur autem hæc proportio punctis quibusdam hoc pacto 3. 5. 7. 9. Sunt nempe hæc quantitates arithmetice proportionales, quia eadem quantitate differunt 3 & 5, 7 & 9, duabus scilicet unitatibus. Ex quo fit, ut in Arithmetica proportionem summa extremorum semper aqualis sit summe mediorum, cum quartus terminus tertium contineat, atque id præterea, quo secundus differt a primo sic $3 + 9 = 5 + 7 = 12$.

Proportio Geometrica est quæ inter quatuor terminos intercedit, quorum primus toties secundum continet, vel aliquam ejus partem, quoties tertius continet quartum, aut similem ejusdem partem: vel etiam generalius, quorum primus ita continet secundum, quemadmodum tertius continet quartum. Hæc autem ipsa continentia dicitur ratio unius termini ad aliam, quorum primus dicitur *antecedens*, secundus *consequens*, & illo aucto, hoc imminuto ratio crescit. Hæc proportio punctis ita indicatur $a. b :: c. d$; nempe, ita est a ad b , ut c ad d . Sic 4. 2 :: 6. 3, quia sicut antecedens primæ rationis 4 bis continet suum consequentem 2, ita antecedens secundæ rationis 6 bis continet suum consequentem 3: & 3. 7. :: 6. 14, quia sicut numerus 7 bis continet 3, ac præterea tertiam ipsius partem 1, ita 14 bis continet 6, ac præterea tertiam ipsius partem 2. Et in genere ut sit $a. b :: c. d$, si $a = mb$, oportet ut etiam sit $c = md$.

Ex

Ex data rationis explicatione duo inferuntur:

I. Ratio est ille ipse numerus m , qui exprimit relationem termini primi ad secundum: unde si primus bis continet secundum, dicitur *duplam* ad hunc rationem habere, si ter, *triplam* &c. Si vero continet ejus dimidium, dicitur habere ad illum rationem *subduplam*, si tertiam partem *subtriplam* &c. Quare ratio a ad b scribi potest tanquam si fractio esset $\frac{a}{b}$, aut $a : b$.

II. Termini æquales eandem habent ad alium rationem, & si eandem habeant ad alium rationem æquales sunt.

PROPOSITIO X.

IN terminis geometricè proportionalibus factum extremorum æquatur facto mediorum: & contra, si factum sub extremis terminis æquatur facto sub mediis, ipsi termini sunt geometricè proportionales.

Sit $a. b :: c. d$ & si m exprimat quomodo, aut quoties b contineatur in a , ita ut sit $a = mb$, erit etiam ex proportionum notione $c = md$: est ergo $ad = mbd$, & $cb = mdb$, sunt autem mbd , & mdb idem factum ex b in d iterum ductum in m , ergo $ad = cb$: sive factum ex primo in quantum æquale facto ex secundo in tertium, quod erat primum.

Sit jam $ad = cb$, dico esse $a. b :: c. d$. exprimat m rationem a ad b , sive sit $a = mb$. Erit $ad = mbd$, sed $ad = bc$, ergo $cb = mbd$, sive dividendo per $bc = md$, hoc est, idem numerus m exprimet etiam rationem c ad d : Q. E. D.

Coroll. I.

Primæ hujus propositionis parti nititur regula, quam auream vocant Arithmetici, sive trium. Emit aliquis 15 frumenti modios aureis 95, quærit quanti stabunt modii 45. Exprimat x hunc numerum ignotum aureorum, erique 15. 95 :: 46. x . Unde $15x = 95 \times 45 = 4275$, & dividendo per 15, erit $x = 285$. Obtinetur igitur quæsitus numerus, si tertius terminus in secun-

secundum ducatur, & factum dividatur per primum.

Coroll. 2.

Ex altera propositionis parte quilibet, quod quoties sit $a. b :: c. d$, erit quoque *alternanda*, ut ajunt, $a. c :: b. d$, & *invertendo* $b. a :: d. e$, & *componendo* $a + b. b :: c + d. d$, & *dividendo* $a - b. b :: c - d. d$, nam semper productum extremorum æquale invenitur producto mediorum. In primis enim duabus permutationibus habentur ad & bc æquales quantitates ex supposita proportionē. In tertia habentur $ad + bd$, & $bc + bd$ in quarum $ad - bd$, & $bc - bd$, quæ item quantitates æquales unique inter se sunt, quandoquidem æqualibus ad , & bc , in primo casu adjicitur, in secundo adimitur eadem quantitas bd . Quinimodò regula quoque universalior ex eadem ratione deducitur. Nempe in terminis geometricè proportionalibus est, ut summa, sive differentia primi & secundi ad primum vel secundum, aut contra, uti primus vel secundus ad summam vel differentiam primi & secundi: ita summa, vel differentia tertii & quarti ad tertium vel quartum; sive tertius vel quartus ad summam vel differentiam tertii & quarti. Qui Canon nil fere differt ab axioma quarto. Porro omnes has permutationes quivis poterit in numeris experiri,

P R O P O S I T I O X I.

Rationem compositam explicare.

Difficilius intelligitur ratio ex pluribus rationibus composita, quam alii aliter definiunt. Nos illam dicemus rationem ex pluribus compositam rationibus, quæ intercedit inter productam ex omnibus illarum rationum antecedentibus, & productum ex omnibus earundem consequentibus. Sic ratio composita ex rationibus 2 ad 3, & 4 ad 5, est ratio 2 X 4 ad 3 X 5, sive 8 ad 15. Et in genere ratio composita ex rationibus a ad b , c ad d , e ad f est ratio ace ad bdf .

Coroll. 1.

Hinc ratio duplicata dicitur quæ intercedit inter quadrata, & triplicata quæ inter cubos ; & sic deinceps . Cum enim quadratum sit quantitas quævis in se ipsam ducta ; & cubus sit idem quadratum in eandem ductum quantitatem , manifestum est rationem compositam ex a ad b , iterumque ex a ad b esse rationem aa ad bb , hoc est unius quadrati ad aliud , & sic de reliquis.

Coroll. 2.

Sequitur etiam rationem a ad b componi ex rationibus ejusdem a ad quemlibet aliud terminum c , & hujus ipsius c ad ipsum b ; nam ratio ex his composita est ac ad cb , quæ non alia est quam ratio a ad b . Etenim si quantitas a est tripla, centupla &c. quantitatis b , erit eadem quantitas a in aliam quamlibet c ducta dupla pariter centupla &c. quantitatis ipsius b in eandem c ductæ. Immo in genere ratio a ad b componitur ex rationibus a ad quamlibet c , & c ad quamlibet d , & d ad quamlibet e &c. & postremi termini ad b : etenim ratio ex his omnibus composita est ratio $acde$ &c. ad cde &c. b , sive ($obcde$ &c. commune terminorum coefficienti) eadem ratio ipsius a ad b . Id vero probe tenendum est cum quantitatis incognitæ ratio ad notam quantitatem inquitur, cujus ratio ad aliam pariter notam quantitatem habetur, & hujus ad aliam &c. & tandem postremi termini ad quantitatem quæsitam . Non ratio quantitatis datæ ad quæsitam erit factum ex omnium illarum rationum antecedentibus , ad factum ex omnibus consequentibus.

Coroll. 3.

Facile etiam deducitur fractiones esse inter se in ratione composita ex directa numeratorum, & inversa denominatorum; ex. gr. ratio $\frac{a}{b}$ ad $\frac{c}{d}$ componitur ex ratione directa numeratoris a ad numeratorem c , & inversa denominatoris b ad denominatorem d ; sive (quod perinde est) ex ratione d ad b . Est eam $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} :: ad . bc$,

quando-

G E O M E T R I A.

quandoquidem factum sub extremis terminis invenitur
 æquale facto sub mediis. Nam $\frac{ca \cdot d}{d} = \frac{c \cdot d}{b}$ cum utrum-
 que sit ca . Item patet in numeris.

P R O P O S I T I O XII.

IN triangulis æquales habentibus angulos latera æqua-
 libus angulis opposita sunt proportionalia.

Sint triangu-
 la ABC, FGH (Fig. 48. 49.) æquiangu-
 la: dico latera FG, GH lateribus AB, BC æqualibus
 angulis oppositis esse proportionalia.

Demonstr. Fiat BE = FG, BD = GH, & ducta ED
 ob æquales angulos B, G erunt æqualia (Prop. 3.) trian-
 gula FGH, EBD; & trianguli ad basim E, D æquales an-
 gulis F, H, hoc est (ex hypothesi) angulis A & C. Ergo
 ED, AC parallelæ sunt (Coroll. 1. def. 17.), ac prop-
 tera ductis rectis AD, EC erunt triangu-
 la EDA, EDC
 super eadem basi, & intra easdem parallelas æqualia
 (Coroll. 1. prop. 7.) Addito ergo communi triangulo EBD,
 erunt tota triangu-
 la ABD, CBE æqualia. Sed triangu-
 la, quæ eandem habent altitudinem, & æqualibus basibus
 insistent æqualia sunt (Coroll. 2. prop. 6.), ergo triangu-
 lum CEB ita continebit triangulum DEB, quemadmo-
 dum basis CB basim BD; pariterque triangulum ADB ita
 continebit idem triangulum EDB, quemadmodum basis
 AB continet basim EB. Jam verò idem triangulum EBD
 æquè continetur ab æqualibus triangulis CEB, ADB;
 ergo etiam CB ita continet BD sive HG, quemadmo-
 dum AB continet EB sive FG, eritque AB. BC :: FG .
 GH, sive alternando AB. FG :: BC. GH: Q. E. D.

Coroll. 1.

Eadem methodo facile ostenditur ipsa triangu-
 la æqui-
 angula esse inter se in ratione duplicata laterum ho-
 mologorum, hoc est, ut quadrata laterum quæ angulis
 æqualibus opponuntur. Etenim triangulum DEB est ad
 triangulum CEB, ut basis DB ad basim CB, & trian-
 gulum CEB est ad triangulum CAB ut EB ad BA, si-

ut iterum ut BD ad BC . Ergo ratio trianguli DEB ad CAB (Coroll. 2. prop. 11.) componitur ex rationibus DB ad CB , atque iterum ejusdem DB ad eandem CB eruntque triangula ut quadrata ipsarum DB , CB . Itaque si fuerit DB dimidia ipsius CB , adeoque etiam BE dimidia AB , erit triangulum DEB dimidium trianguli CEB , & CEB dimidium trianguli CAB , ac proinde triangulum DEB erit dimidium dimidii, sive quarta pars trianguli CAB .

Coroll. 2.

Si in triangulis FGH , ABC anguli B & G fuerint æquales, & latera FG , GH proportionalia lateribus AB , BC , erunt triangula æquiangula. Fiat enim $BE = GF$, ducaturque ED parallela AC . Æquiangula erunt triangula BED , BAC (Coroll. 1. def. 17.) ac proinde $AB : B : C :: EB : BD$. Est autem ex hypothesi $AB : BC :: FG : GH$, ergo $EB : BD :: FG : GH$, & alternando $EB : FG :: BD : GH$. Cum sit igitur $EB = FG$, erit etiam $BD = GH$: & ob angulos B & G æquales erunt æqualia tota triangula EBD , FGH (Prop. 2.). Sunt vero EBD , ABC æquiangula, ergo etiam FGH & ABC æquiangula sunt,

Coroll. 3.

Quod si triangulorum FGH , ABC tria latera tribus sint lateribus proportionalia, etiam hæc eadem demonstratione erunt æquiangula. Sumpta enim $EB = FG$, & ducta ED parallela AC , erit $EB : ED :: AB : BC :: FG : GH$: & alternando $EB : FG :: BD : GH$, hoc est, in ratione æqualitatis. Eodem pacto ostendetur $FH = ED$: quare triangula FGH , EBD habent tria latera æqualia singula singulis, adeoque æqualia sunt (Prop. 4.) Cumque EBD , ABC æquiangula sint, erunt etiam FGH , ABC .

Coroll. 4.

Cum sit, ex demonstratis in propositione, $AB : BE :: BC : BD$, erit dividendo (Coroll. 2. prop. 10.) $AE : BE :: DC : BD$, ex quo sequitur rectam BD , (Fig. 50.) quæ bifariam dividit angulum B in triangulo ABC basim dividere in ratione laterum, Enim producto latere AB donec

donec fiat $BE = BC$, ductaque EC ; erunt æquales anguli ad basim in triangulo isoscele EBC (Coroll. 1. prop. 2.); quare angulus externus ABC duobus interioribus & oppositis æqualis (Prop. 1.) duplus erit angulo E , & ejus dimidium $ABD = BEC$. Cum igitur in rectis BD , EC externus angulus ABD sit interno opposito BEC æqualis, erunt ipsæ parallelæ inter se, ac proinde AD . DC : AB . BE , sive BC ; quæ per constructionem ipsi BE æquatur.

Coroll. 5.

Pariter si duæ rectæ AB HR (Fig. 51.) occurrant utcumque parallelis EC , FD ; GK , ab his secantur in partes proportionales, ut sit EF . CD :: FG . DK . Ducta enim CLM , quæ sit parallelæ ipsi AB ; erunt CL , LM æquales ipsi EF ; FG (Coroll. 4. prop. 3.): sunt verò in triangulis MCK ; LCD , LC . LM :: CD . BK , ergo etiam EF . FG :: CD . DK .

Coroll. 6.

Si datis tribus rectis quæratür quarta proportionalis, fiat quilibet angulus CAB (Fig. 50.); & in alterutro latere sumantur AE , AB duabus primis datis æquales; tertiæ vero æquale fiat latus AC , & ducta EC ducatur ex puncto B recta BD ipsi EC parallelæ; eritque AD quarta proportionalis quæsita: erit enim AE : AB :: AC . AD . Si verò rectam AC in data ratione dividere oporteat, sumantur AB , BE æquales terminis datæ rationis, & eadem constructio dabit AB . BE :: AD . DC . Ex quo etiam divisibilitas in infinitum deducitur. Cum enim esse possit AE utcumque multiplex ipsius AB in infinitum; poterit etiam esse AD quantum libuerit submultiplex AC pariter in infinitum.

Scholion.

Figuræ similes dicuntur, quarum omnes anguli æquales sunt singuli singulis; & latera circa æquales angulos proportionalia: Hinc patet similia esse triângula æquiangula, quorum proprietates, quas exposuimus, incredibile dictu est quanti sint usus in Mathematicis. Earum ope facillimè solvuntur problemata omnia, quæ

ad Trigonometriam, hoc est ad triangulorum dimensionem, pertinent. Hinc & altitudines, & distantias metimur, & alias hujusmodi quantitates per quadrantem in gradus divisum, & eam quam scalam vocant.

Quadrantis constructio non est admodum difficilis, Fiar in aliqua solidiori materia rectus angulus ABC (Fig. 58.) & centro facto in B mediocri intervallo BA describatur quadrans ADEC, ac duo alii interius paulo minori intervallo. Centris A & C intervallis AB, CB inveniantur puncta D, E, eritque tam AE, quam CD graduum 60. (Coroll. 4. prop. 3.); quare cum graduum 90 sit totus quadrans, erit tam AD quam CE, & DE graduum 30. Si igitur in tres partes æquales secentur arcus AD, DE, EC (Schol. prop. 5.), dividetur quadrans in novem arcus æquales, quorum singuli decem gradus contineant. Quod si hi rursus bifariam dividantur (Prop. 5.), quinos quosque gradus obtinebis. Demum singuli gradus haberi poterunt, eorum mensuram per attentionem inquirendo, vel per Coroll. 6. hujus, cum arcus ejusmodi parum differant a rectis lineis. Hæc figura rectis lineis CB, BA, & arcu CA comprehensa quadrans dicitur.

Scala quoque facile construitur hoc pacto, Sub angulo quocumque B (Fig. 59.) ducantur rectæ AB, BD, A puncto B ad E sumantur decem partes æquales, & fiat BD quintupla ipsius BE in decem partes æquales divisa, quarum prima est a B ad 100, sumptisque a B ad A 20 partibus æqualibus, compleatur Parallelogrammum ABDC, & ab omnibus divisionum punctis rectæ AB, itemque rectæ BD (excepto primò quod jacet inter B & E) ducantur rectæ parallelæ lateribus parallelogrammi: tum divisa quoque AF in decem partes æquales, quarum prima sit AI, agantur oblique a singulis divisionum punctis BI, & reliquæ, quarum postrema definit in F, quæque parallelæ erunt inter se (Coroll. 1. pr. 2.) cum æquales, & parallelas lineas includant. Numeris, ut in figura factum est, distributis, manifestum est rectam BD quinquaginta particulas EO

con-

continere, quarum decem in EB continentur; partemque EO in viginti æquales partes gradatim divisam esse ob latus EF trianguli OFE in totidem æquales partes divisum. Harum particularum unam prima post verticem F parallela continet, duas secunda, tres tertia, & sic deinceps, inter rectas FO, FE interceptas. Itaque recta BD continebit ejusmodi particulas $20 \times 50 = 1000$, ac proinde inveniri poterunt ipsius rectæ BD in eadem scala partes millesimæ quocumque.

Metiri jam oporteat locorum A & B (F. 52. 53.) distantiam BA eorum accessu vel a flumine, vel ab alia quavis causa intercluso. Assumpto quolibet loco C, cujus distantiam a B metiri liceat, ope quadrantis & linearum visualium AC, BC noveruntur anguli B & C. Tum in charta probe complanata assumatur ex scala *bc* totidem partium, quot pedes in intervallo BC continentur, fiantque anguli *b*, *c* ope quadrantis ejusdem æquales angulis B, C. Lateribus *ba*, *ca* in aliquo puncto *a* coeuntibus exploretur quomam in scala particulas contineat latus *ba*, totidemque pedes intervallum AB continebit. Nam cum in triangulis BAC, *bac*, anguli B, C æquantur angulis *b*, *c* per constructionem, ac propterea A quoque & *a* æquales sint (Coroll. prop. 1.), erunt triangula similia, & latera proportionalia.

Si BAC campus sit, cujus mensura in quadratis pedibus inquiretur, demittatur in basim *bc* perpendicularum *ad*, & inveniantur particulae, quæ ab illo in scala continentur. Tot enim pedes continebit perpendicularum AD ob similitudinem triangulorum ADB, *adb*, ejusque dimidium in basim ductum dabit aream ABC in pedibus quadratis (Schol. prop. 6.)

Eadem ratione altitudinem Montis A (Fig. 54.) metiri licebit, si in subjecta planitie duæ dentur stationes B, C, quarum distantiam metiri possimus.

Et ita quidem inveniuntur latera, & area in triangulo, cujus unum detur latus cum duobus angulis. Si verò tria dentur latera, & querantur anguli, sumptis ex scala tribus rectis *bm*, *bc*, *cn* (Fig. 52. 53.) totidem

dem partium; quot in datis lateribus pedes continentur, centris b ; c , intervallis bm ; cn describantur arcus circulorum se mutuo interfecantium in a , & ductis ab ; ac , erit triangulum bac dato triangulo æquiangulum (Coroll. 3. hujus) ob latera proportionalia; unde & altitudo, & area innoscet: Sed de his planis in Trigonometria constabit.

P R O P O S I T I O XIII.

Si duæ chordæ sive intra circulum, sive extra circulum se mutuo interfecent; factum sub unus segmentis erit æquale facto sub segmentis alterius.

Secent se mutuo chordæ AC, DE (Fig. 53. 56.) sive intra, sive extra circulum; dico esse $AB \times CB = DB \times BE$.

Dem. Ductis AD, CE, erit in primo casu in duobus triangulis ADB; BCE angulus ABD equalis angulo ECB ad verticem (Coroll. 4. def. 10.); ac præterea æquantur anguli ADB, ECB; ut qui eadem insistant arcui AB (Coroll. 1. prop. 9.); ergo æquiangula sunt triangula & similia, ac proinde (Prop. 12.) BA. BD:: BE. BC.

In secundo autem casu quadrilinei circuli inscripti anguli oppositi ACE; ADE æquantur duobus rectis (Coroll. 3. prop. 9.), & duobus item rectis æquantur ACE + BCE (Coroll. 3. defn. 10.), quare ADE æquatur ipsi BCE; & cum angulus B sit utrique communis, æquiangula & similia erunt triangula BAD, BEC. Ergo in utroque casu erit BA. BD:: BE. BC, ac proinde $BAXCB = BDXBE$ (Prop. 10.); Q. E. D.

Coroll. 1.

Si fuerit AC (Fig. 57.) circuli diameter, & chorda DE ad illam perpendicularis, ac propterea bifariam divisa in B (Coroll. 4. pr. 5.); erit $AB \times BC$ æqualis DE^2 ; nam in hoc casu $EB \times BD = BD^2$. Est igitur AB. DB:: DB. BC (Prop. 10.). Quare si inter AB & BC quærat media proportionalis; bifariam divisa AC in F,

GEOMETRIÆ.

41.

ac descripto semicirculo erigatur in B perpendicularum BD donec circulo occurrat; eritque BD media proportionalis quæsitæ.

Coroll. 1.

Ducto radio FD erit, ob angulum rectum B, $FB^2 + BD^2 = FD^2 = FC^2$ (Prop. 7.) Quare cum sit $DB^2 = AB \times BC$, erit $AB \times BC + FB^2 = FC^2$: hoc est, si recta AG secta fuerit bisariam in F, & non bisariam in B, erit quadratum dimidiæ æquale rectangulo sub inæqualibus segmentis una cum quadrato intermediæ.

Coroll. 3.

Si ducantur præterea AD, DC, erit angulus ADC in semicirculo rectus (Coroll. 1. prop. 9.) quare $AC^2 = AD^2 + DC^2$: sed ob angulos rectos in B, $AD^2 = AB^2 + BD^2 = AB^2 + AB \times BC$ & $DC^2 = BD^2 + BC^2 = BC^2 + AB \times BC$: ergo $AC^2 = AB^2 + BC^2 + 2AB \times BC$. Hoc est, utcumque secetur recta AG in B, quadratum totius AC æquatur quadratis segmentorum AB, BC una cum rectangulo bis comprehenso sub ipsis segmentis.

Coroll. 4.

Cum sit autem $AD^2 = AB^2 + AB \times BC$, erit (Prop. 10.) $AB : AD :: AD : AB \times BC$: hoc est, chorda est media proportionalis inter segmentum AB, totamque diametrum AC, & illius quadratum æquatur rectangulo $AB \times AC$.

Coroll. 5.

Si figura 56 intretur in 60, ita ut BD transeat per centrum F, & BCA accedat ad circumferentiam, donec evanescente AC evadat BC tangens; erit $BC^2 = BE \times BD$, & ducta FC, quæ tangenti occurreret ad angulos rectos (Coroll. 5. prop. 8.) erit in triangulo rectangulo FCB, $FB^2 = FC^2 + CB^2 = FE^2 + EB \times BD$. Hoc est, si recta DE bisariam dividatur, eique in directum adjiciatur recta quævis EB, erit quadratum compositæ ex dimidia & adjecta æquale quadrato dimidiæ una cum rectangulo ex tota & adjecta simul sumptis in adjectam.

Scho-

Ex hoc postremo corollario definiti potest quam longè pateat prospectus in maris superficiem ex data altitudine: sed telluris diametrum prius definire oportet ex ipsius circumferentia, quam in annotationibus ad primam propositionem invenimus. Id autem fiet si proxima ratio circumferentiæ ad diametrum inveniantur, in quo etiam circuli quadratura verè proxima sita est, qua contenti esse possumus cum exactam habere non liceat. Archimedes ad rem conficiendam polygonis usus est inscriptis & circumscriptis.

Concipiantur radius AC (Fig. 61.) in partes 1000000 aut plures etiam, ut libuerit, divisus & tangenti AD occurrat in D recta CD angulum rectum ECA, & quadrantem AE bifariam dividens. Erit. ob angulum ACD semirectum, & angulum CAD rectum (Coroll. 3. prop. 8.) angulus quoque ADC semirectus, & triangulum isoscele (Coroll. 3. prop. 3.) Quare $DA = CA = 1000000$, & $DC^2 = DA^2 - AC^2 = 2000000000000$ cujus radix DC major est quam 447213, & minor quam 447214. Bifariam diviso angulo DCA recta CH, quæ occurrat tangenti in H, erit DC. CA::DH. HA (Coroll. 4. prop. 12.); & componendo DC.-CA (244721 $\frac{2}{3}$). CA (1000000)::DA (1000000).HA.

Unde invenitur HA major quam 447213, minor quam 447214. Hinc eruitur HC, & secto iterum bifariam angulo HCA invenietur nova portio tangentis AD, atque aliæ deinceps, ut libuerit. Quod si chorda IL parallela fuerit tangenti HAM, ac proinde radio CA perpendicularis, & bifariam secta in K (Coroll. 4. prop. 5.), erit CH. HA::CI. IK (Prop. 12.). Cumque tres priores quantitates notæ sint, quarta quoque IK innotescet & major & minor vera, ac propterea etiam ipsius dupla IL, & ducta CLM, quæ tangenti occurrat in M, erit tota HM dupla ipsius AH.

Sit jam circulus APT (Fig. 62.) primò in quatuor partes æquales divisus, deinde in 8, in 16, in 32, in

64, in 128. &c. prout cuique libuerit, & concipiamus per ea divisionum puncta, tangentes, & chordas alternatim ductas, habebimur, ut patet, duo polygoni, quorum alter inscriptus circulo est, alter circumscriptus. ambo autem triangulis constant equalibus triangula HCM, HCL; cumque haberi possint HM & IL quantumlibet veris proximè, & numerus laterum habeatur, & omnium quoque summa innotescet, hoc est, perimeter inscripti proximè minor vera, & perimeter circumscripti proximè major vera, ita ut hic defectus vel excessus quantum cuique libuerit tenuis sit, cum radius in quemlibet partium numerum dividi possit. Jam vero manifestum est perimetrum polygoni circumscripti circuli peripheria maiorem esse, perimetrum verò inscripti minorem, ac propterea intra hos limites ipsam peripheriam contineri. Isti limites quantum quisque velit contrahuntur aucto laterum numero. Etenim ob triangulorum HCA, ICK similitudinem cum sit CA. CK :: AH. KI, erit quoque dividendo AC. AK :: AH. AH - KI, & in eadem ratione erit tota perimeter polygoni circumscripti ad ejus differentiam ab inscripto (Axiom. 4.) Quod si laterum numerus augeatur minuitur quantumlibet IK, & multo magis AK, adeoque minuitur quantumlibet polygonorum differentia, & contrahuntur limites, intra quos situs est valor peripheriæ circuli.

Hinc quoque accuratius demonstratur arcam circuli factum esse ex radio in dimidiam peripheriam. Nam triangulum HCM est factum ex radio AC in dimidiam basim HM. (Schol. prop. 6.), ac proinde totum Polygonum habetur ducendo radium AC in dimidiam perimetrum. Est autem area polygoni circumscripti major quam area circuli, ita tamen ut ejus excessus supra aream circuli minor sit quam excessus supra polygonum inscriptum. Verum ita potest laterum numerus infinitum augeri, ut differentia perimetri polygoni circumscripti a circuli peripheria, & illius areæ ab area polygoni inscripti minor sit data qualibet quantitate. Quamobrem factum quoque ex radio in dimidiam peripheriam

riam ab area circuli differet differentia quæ minor sit
data qualibet quantitate, ac proinde nulla.

Hæc methodo Archimedes invenit diametrum ad pe-
ripheriam esse in ratione 7 ad 22, ita ut tenuissimus
sit excessus peripheriæ sic inventæ supra veram.

Hæc eadem ratio subtilius ab aliis quæsitæ est, in qui-
bus Ludolphi Colonienfis eminet industria, qui eam ad
cifras usque 60 promovit. Ex Leibnitio in Actis Lip-
sienfibus totum habetur ratio diametri ad quædam pe-
ripheriæ partem, ut 1 ad 1 $\approx \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{1}{7} + \frac{1}{9}$ &c. pro-
ducendo hanc seriem quousque libuerit per signa con-
traria, & numeros impares, eandemque rationem ha-
bet quadratum circulo circumscriptum ad aream circuli.
Sed omnium est elegantissima ratio diametri ad peri-
pheriam, quam exprimitur tria patia trium primorum
numeratorum imparium, videlicet 113 ad 355.

In re nostra contenti esse possumus Archimedis ra-
tione, cumque peripheria maximæ telluris circuli (Schol.
prop. 1.) passus Parisiæ contineat 24649920; fiat ut
22 ad 7 ita prædictus ille passuum numerus ad telluris
diametrum, quæ obvertiet passuum 7843156, ac proinde
de miliaria continebit 7843, ac passus 156.

Sit jam HI montis altitudo ad mille passuum assur-
gens, & quærat intervallum HA quousque patet in
maris superficiem oculi prospectus; erit HS passuum
7844156, ergo $AH^2 = IH \times HS = 1000 \times 7844156$
 $= 1844156000$; cujus radix 88567 miliaria dabit 88,
ac passus præterea 567; intra quod spatium continentur
objecta ex hoc monte conspicua, cum cætera omnia ob
ipsam telluris rotunditatem ex oculis sese subducant.
Refractionis tamen, vi cujus radius AH inflectitur, non
nulla adhuc objecta detegit, quæ aliquanto longius di-
stent. At si HI sit unius passus, quantum ferè e solo
assurgit hominis oculus stantis in litore, erit HS pas-
suum 7844157, & $IH \times HS$ erit pariter 7844157; cu-
jus radix passus dabit 2800 7. Quare si duo homines
sex passuum millibus distent in eodem maris litore

ob telluris rotunditatem se invicem videre non possunt.

PROPOSITIO XIV.

OMnes figuras similes rectilineas in eundem similiarum triangulorum numerum partiiri licet.

Sint due figure similes rectilinee $ABCDE$, $abcde$ (Fig. 63. 64.), & ductis BE , CE ; be , ce , dico similia esse trianguia ABE , abe ; BEC , bec &c. : nam in triangulis EAB , eab anguli A & a equales sunt, ut ipsa notio figurarum similitudinis indicat, eruntque latera proportionalia; hoc est AE . ae :: AB . ab . Ergo (Coroll. 2. prop. 12.) similia erunt trianguia ABE , abe , ac proinde (Prop. 12.) anguli ABE , abe equales sunt; cumque essent equales anguli ABC , abc , erunt etiam equales EBC , ebc . Erant autem latera circa equales angulos ABE , abe proportionalia, hoc est BE , be ; AB , ab ; BC , bc (ob figurarum similitudinem) ergo iterum in triangulis BCE , bce latera circa equales angulos EBC , ebc proportionalia sunt, ac propterea ipsa trianguia similia. Eadem methodo si progrediaris, reliqua quoque trianguia similia esse comperies, easque figuras in eundem similiarum triangulorum numerum divisas esse : Q. E. D.

Coroll. 1.

Eodem pacto ostenditur similes esse figuras illas rectilineas, quas similia trianguia eodem numero, eodemque ordine partiuntur.

Coroll. 2.

Cum duo quolibet similia trianguia sint inter se ut quadrata laterum homologorum (Coroll. 1. prop. 12.), latera autem sint in eadem ratione constanti, erunt (Ax. 4.) perimetri similiarum figurarum ut duo quolibet ipsarum latera homologa; & aree totę erunt ut quadrata eorundem laterum. Id etiam circulis convenit, ut patet ex his quę adnotavimus ad Prop. 13. : quare si unius circuli radius alterius radio duplus sit, il-

lius

lius quoque peripheria dupla erit, area vero quadrupla.

Scholion.

Possunt etiam alia quādam ratione similia triangula in similibus figuris considerari. Nempe si fuerint similes figure $ABCDE$, $abcde$ (Fig. 65. 66.) ducanturque ex duobus angulis æqualibus A & a , B & b , ad reliquos angulos rectæ lineæ AD , BD , AC , &c. ad , bd , &c. simili methodo demonstrabitur similia esse triangula AEB , aeb , ADB , adb &c. id quod in agrimensura maximum habet usum. Etenim si alicujus fundi aut agri ichnographiam describere oporteat, ac dimensiones accipere ex duobus locis A , B : metire prius locorum distantiam AB , & oculorum aciem in objecta conspicua dirigens, quibus ager terminatur in E , D , C , probe observa angulos BAE , BAD , BAC , itemque ABC , ABD , ABE : tum in charta aut tabula duc rectam ab tot particulis & scala desumptis constantem, quot inventi sunt pedes in intervallo AB , & opte quadranti fiant in a & b anguli æquales inventis in A & B . Linearum ita ductarum concursus in e , d , & determinabunt perimetrum figuræ $aedcb$, quæ similis est agro describendo ut ex demonstratis constet. Itaque quot fuerint particularum inventionis rectæ lineæ ae , ad , de , be & totidem pedibus constant intervalla AE , ED , DC , CB &c. area vero invenietur ex dictis ad propof. 13. & 6.

Eadem ratione, ut patet, distantiam DC utrinque inaccessam metiri licet. Etenim sumptis duabus stationibus A & B , quarum intervallum metiri liceat, & angulis in A & B triangulorum ADB , ACB , fiat ut antea simile quadrilinum $dabc$, & quot particulari in scala continebit recta dc , totidem pedes, vel decomposas continebit distantia quæsitæ DC .

Scholion.

Cum Euclidis Elementa passim ab auctoribus citentur, non erit inutile indicem subijcere, unde constare possit ubinam in his nostris elementis eorum demonstratio

GEOMETRIÆ.

45

titratio querenda sit, quæ Euclides in sex prioribus libris complexus est, quibus planam geometriam absolvit. Ufu autem constabit nullam fere ejus propositionem paulo frequentius adhiberi in geometricis quæ non fuerit a nobis demonstrata, aut non facile ex his demonstretur. Cæterum libri 5 & 6 propositiones præcipuas complectitur Scholion ad prop. 9, & propositiones 10, 11, 12 cum suis Corollariis, quod cum semel notasse satis fuerit, supervacaneum duximus has cum nostris comparare. Sed & rationum theoriâ uberius tractabimus in Arithmetica.

Euclidis		Euclidis	
Lib. I.	Nobis est	Lib. I.	Nobis est
Pr. 1	Cor. 4. pr. 2.	Pr. 26	Pr. 3. & Cor. 1.
4	Pr. 2.		eiusd.
5	Cor. 2. pr. 2.	27)	Scol. def. 17. &
6	Cor. 2. pr. 6.	28)	Coroll. i. ejusd.
7	Coincidit cum propositione 4.	29)	dem.
8	Pr. 4.	30	Cor. 2. ejusd.
9	Pr. 5.	31	Cor. 3. ejusd.
10	Cor. 1. pr. 5.	32	Pr. 1.
11	Cor. 3. pr. 5.	33	Cor. 1. pr. 2.
12	Cor. 2. pr. 5.	35	Cor. 4. pr. 3.
13	Cor. 2. def. 10.	36	Pr. 6.
15	Cor. 4. ejusd.	36	Cor. 2. pr. 6.
18	Pr. 8.	37	Cor. 2. ejusd.
19	Cor. 1. pr. 8.	38	Ibidem.
22	In sch. pr. 12.	39)	Ex iisd. facillime
23	Cor. def. 7.	40)	dem.
24	Cor. 2. pr. 8.	41	Cor. 3. pr. 6.
25	Cor. 3. ejusd.	47	Pr. 7.
		48	Cor. ejusd.

Euclidis Lib. II.		Euclidis Lib. III, Nobis est	
Pr. 4	Cor. 3. pr. 13.	Pr. 17	Cor. 2. pr. 9.
5	Cor. 2. pr. 13.	20	Pr. 9.
6	Cor. 5. ejusd.	21	Paterex ead.
Lib. III.	.	22	Cor. 3. ejusd.
Pr. 3	Cor. 4. pr. 5.	31	Cor. 1. ejusd.
10	Cor. pr. 4.	32	Cor. 6. ejusd.
13	Cor. 7. pr. 8.	34	Pr. 13.
16	Cor. 5. 6. 7. ejusd.	35	Cor. 5. ejusd.



E L E M E N T A⁴⁹ ARITHMETICÆ.

C A P U T P R I M U M.

De fundamentalibus Arithmetica operationibus:

1. **E**Æ sunt notatio, additio, subtractio, multiplicatio, divisio, & extractio radicum, quas omnes hoc capite breviter expediemus.

§. I.

Notatio.

2. **N**umeros omnes in vulgari arithmetica decem notis designamus, quarum Arabes feruntur auctores; sunt autem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harum notarum varia est significatio non solum ex diversa ipsarum forma, sed etiam ex diverso loco, quem occupant. Nam quæ ante punctum postremæ legenti occurrunt unitates designant; quæ proxime præcedunt unitatum decades; exinde centenarii sequuntur, millenarii, & sic deinceps in decupla proportionem. Atque huic potissimum usui cyphra, seu 0. destinatur, cum enim ipsa nullum designet numerum, auget tamen reliquarum notarum significationem longius illas a puncto removens; sic unitatis nota, quæ punctum proxime præcedens unicam designaret unitatem, beneficio unius vel duplicis cyphræ in secundum aut tertium locum rejecta denas unitates, aut centenas designabit.

3. Breviares numeri faciliè leguntur, nemo enim non videt numerum A (Tab. 1.) ducentas quadraginta septem unitates exprimere; at in numeris longioribus aliquo opus est artificio, Numerum B, quem legere oportet,

D

teat,

teat, ita divides a postremis notis exorsus, ut ternos singulis partibus numeros attribuas. Tres postremos a præeuntibus divides puncto superius apposito: tribus sequentibus appones 1; & sic deinceps reliquis ternariis punctum alternatim appones, vel numerum, ita tamen ut numeri unitate semper augeantur, quemadmodum in apposito schemate factum vides. His peractis quamlibet notarum classem perinde leges, ut si sola esset, & ubi punctum invenies dic mille, ubi 1 dic decies centena millia, seu, ut vulgo loquimur, millionem; ubi 2, dic milliones millionum, sive Billiones; ubi 3, dic Trilliones, & sic deinceps. Sic itaque numerus B legendus crit. Ter mille ac ducenti quadragintaduo Trilliones, quingenta septuaginta octo millia ac quingenti sexaginta duo Billiones, nongenta quatuordecim millia, ac viginti Millions, quadringenta sexaginta septem millia, bis centum, ac duodecim.

4. Quod si notæ eadem punctum subsequantur, fractos expriment decimales; ita quidem, ut quæ primum occurrit decimas unitatis partes designet, secunda centesimas, tertia millesimas, & sic deinceps. Has autem notas vel singulas seorsim efferre licet, vel omnes simul denominatione a postrema desumpta, quæ denominatio ex numero desumitur, quem exprimit unitas tot cyphris aucta quot sunt post punctum notæ. Sic numerus C designat viginti tres unitates, & duas decimas partes unitatis, quatuor centesimas, nullam millesimam, sex denas millesimas, vel bis mille quadringentas sex denas millesimas. Numerus D denotat ducentas triginta duas unitates, nullam decimam, duas centesimas, tres millesimas, seu 23 millesimas partes unitatis. Demum numerus E nullam exhibet unitatem, nullam decimam, nullam centesimam, sed tantum duas millesimas, & sex denas millesimas, sive 26 denas millesimas partes unitatis.

5. Fractiones aliq̃ duobus numeris exprimuntur, quos lineola interjecta dirimit, ita ut alter supra lineam scribatur, alter infra lineam. Qui inferior est denomina-

ficatur, qui superior est numerator. Ille denotat in partes unitas divisa sit, hic autem ejusmodi partem numerum designat. Sic numerus F duas tertias partes exprimit, numerus C quinque octavas, numerus H septem duodecimas. Fractiones quoque sunt tales, quibus horas, & gradus circuli parti consuevit; nam & horas & gradus singulos in 60 minuta dividimus, singula minuta prima in 60 secunda, singula secunda in 60 tertia, & sic deinceps. Item fractiones peculiaribus quibusdam notis designamus, nam horas integras exprimit numerus cui assignatur littera h, gradus integros numerus cui superius assignatur o: & in utroque casu unica lineola numeris imposita minuta prima designat, duæ lineolæ minuta secunda, tres tertia, & sic deinceps: unde numerus sic leges: 23 horas, 46 minuta prima, 52 secunda, 37 tertia. 41 quarta.

§. II.

Additio in numeris integris.

Numeri his notis expressi, si integri sunt, in unam summam facile colliguntur. In exemplo quatuor numeros, quos addere oportet, ita alios adscribe serie descendente, ut unitates unitatibus respondeant, decades decadibus, & sic de reliquis; tum omnes numeros ducta linea, & a postrema columna exorsus dic; 1 & 8 efficiunt 9, 9 & 2 efficiunt 11 & 1 efficiunt 12. Colligis ergo ex hac columnam decadem unitatum, ac præterea duas unitates quare scribe 2 in loco unitatum, & decadem illam rejice in sequentem decadem summam dicens: 2 efficiunt 3, 3 & 6 efficiunt 9, 9 & 9 efficiunt 18 & 6 efficiunt 24, hoc est duas decades decarum, five duo centenaria, & 4 decades: scribe ergo 4 in loco decadam, & duo centenaria in sequentem columnam rejice, eodemque pacto in hac & reliquis operare,

D 2

rare,

tare, & tandem invenies numerum K, qui quatuor merorum erit quæſita ſumma. Eodem pacto, in I trium numerorum ſumma colligitur numerus L, qui nota ſupra numeros datos eſt auctus, quod in columna quæ poſtrema eſt operanti, 12 colligunt unitas illa in ſequentem locum rejicienda fuit.

7. Norandum eſt autem quod uniufcujuſque colliguntur numeri ita colliguntur tamquam ſi eſſent unitates, eaque ſumma tot unitates in proximè ſequentem ciuntur, quot in præcedente decades ſupra unitates lectæ ſunt.

8. Totius autem operationis ratio conſtat, quia progredimur ab unitatum columna ad reliquas, quolibet in ordine ſubſequenti decuplo majorem ſi valorem quam in proximè præcedente.

§. III.

Subtractio in numeris integris.

9. **U**T numerum datum a dato numero ſubducatur ſubducendum numerum illi ſubjicies, a quo trahi debet, ita ut unitates unitatibus respondeant, cades decadibus, & ſic de reliquis. Tum ab unitate exorſus quamlibet inferiorem notam a ſuperiori ſubtrahes, & reliquum ſcribe infra lineam & habebis numerum qui ſit datarum quantitatum differentia. Quod alicubi occurrat inferiorem notam ſuperiori majorem eſſe, hanc augere oportebit decem unitatibus, eam mutuas accipies a proximè ſequenti nota, quam præterea deinceps habebis tamquam unitate multiplicatam.

10. In Ex. 3. numerus M eſt inter datos numerus differentia quæſita, quia auferendo 5 ex 7 relinquitur 2, auferendo 4 ex 9 relinquitur 5 &c. At in Ex. 4. cum numerus 8 ex 7 ſubduci nequeat, adjice huic 10 unitates, & auferendo 8 ex 17 reliquum habebis 9; tum vero notam ſuperiorem proximè ſequentem unitate multiplicabis, hanc enim ab ea mutuas accepisti.

deni

denis unitatibus præcedentem auferes. Aufer ergo 4 ex 5 & habebis residuum 1. Eodem pacto in reliquis duabus notis operare, & habebis numerum N differentiam quæsitam. Haud abfimili ratione invenitur differentia O in Ex. 5^o, ubi cum ex o nequeat auferri 6, auferitur ex 10, & residuum 4 infra lineam ponitur: tum quia iterum sequitur o ex quo nequit auferri 4, auferitur non quidem ex 10 sed ex 9, quandoquidem denarius numerus, qui eo loco substituitur ex proxime sequenti 9, jam in antecessum unitate multiplicatus est; atque ita fieret si plures essent o, cum tamen numerus qui primo occurrit unica tantum unitate minor fiat.

11. Si nota inferiori ex superiori sublata nihil reliqui sit, eo loci notari debet o, quod tamen non fit, si nullus præterea sequatur numerus, qui in differentia quæsitæ ante cyphram sit adscribendus, ut factum vides in Ex. 6^o, in quo præter duas postremas notas reliquæ omnes se mutuo elidunt.

12. Operationis ratio satis per se constat, cum unitates ab unitatibus auferantur, denarii a denariis &c. Nam quod in Ex. 4^o: numerus 7 decem augeatur unitatibus, & numerus insequens 6 una multiplicetur, ratio in promptu est. Hæc nempe unitas in numero 6 decem valet earum quibus constat numerus 7, eique respondens 8, quare etsi unam ille amittat huic tamen decem acquiruntur. Similiter in Ex. 5^o, unitas e 9 sublata decem valet unitates si in locum rejiciatur, cui subest auferendus numerus 4, & rursus una ex his decem unitatibus in locum translata cui subest numerus 6, decem valet unitates ejusmodi, quibus nota auferenda constat. Quare his sublati ex 10, relinquitur numerus 9, ex quo auferas 4, & deinceps 8, ex quo 2 auferre oportebit.

13. Si explorare velis utrum subductio ritè peracta sit, differentiam inventam adde numero sublato, & quantitas redibit, ex qua subductio facta est.

14. Si tota quantitas auferenda illam excedat, ex qua debet auferri, adhuc minor numerus e majori sub-

ducitur; sed differentia quæsitæ erit quantitas negativa, & minor nihilo. Sic si quis expensas faceret, quæ suas opes excederent, has subduceret ab expensis, & differentia ostenderet quanto deterioris conditionis sit factus, quam si nihil haberet, vel quid sibi desit, ut ære alieno expeditus nihil habere incipiat. Unde vides æs alienum congrue dici quantitatem negativam & nihilo minorem. Innumera sunt ejusmodi, ex quibus Tyrones oportet negativæ quantitatis notionem probè concipere.

§. IV.

Multiplicatio in numeris integris.

15. **Q**uantitas data per numerum integrum multiplicatur cum toties sumitur, quoties unitas in numero continetur, per quem debet multiplicari. Tum verò per numerum fractum multiplicari dicitur, cum tot illius partes sumuntur, quot fractio indicat, in quam ducitur. Augetur itaque numerus cum in integrum ducitur: minuitur si in fractum ducatur.

16. Singulæ notæ in singulas facile ducuntur, si numeri breviores sint. Sic nemo non videt 3 in 4, sive 4 tær sumptum 12 efficere. Si numerorum alter denarius sit, factum ex multiplicatione emergens tot erunt decades, quot alter numerus habet unitates; at si quinarium fuerit, tot erunt decades sumendæ, quot in alterius dimidio sunt unitates: demum si uterque numerus quinario major sit, in altera manu, reliquis compressis, tot digiti erigantur, quot alter numerus habet unitates supra quinarium, itemque in altera manu tot erigantur, quot unitatibus alter numerus quinarium excedit. Tum verò tot decades sumantur quot sunt erecti digiti, iisque adjiciatur quod prodit invicem ducendo digitos in utraque manu compressos, atque ita habebis factum ex utriusque dati numeri multiplicatione. Sic si ducere oporteat 7 in 9, erunt erecti digiti in altera quidem manu 2, in altera 4, unde sex decades sumendæ

de sunt; compressi verò erunt in illa 3, in ista 1, ex quorum multiplicatione emergunt tres unitates; factum ergo ex 7 in 9 sunt 6 decades, & 3 unitates, si-
ve 63.

17. Idem facile absolvitur per tabulam, ut vocant, Pythagoricam. Rectanguli ACDB latus AC in novem partes æquales dividè, latus verò CD in decem. Per utrisque divisionis puncta duc rectas lineas his lateribus parallelas, ac divisum erit rectangulum in decem columnas, quarum singulæ novem continent rectangula. Scribe in prima columna novem primos numeros, in secunda eorum duplos, in tertia triplos, & sic deinceps. In decima vero columna nonnisi cyphras conscribes ad usus postea indicandos. Interim habebis, ut vides, productum cujuslibet numeri in alium quemlibet ab 1 ad 9, quod facile invenies si alterum numerum in prima columna inquiras, alterum in primo ordine rectangulorum; nam si ab hoc descendas ad ordinem usque, in quo primus invenitur, ibi erit productum quesitum. Sic si factum quæras ex 9 in 6, sume in prima columna 6, in primo autem ordine sume 9, & descende usque ad ordinem sextum, in quo 6 invenitur, & numerus 54 erit factum ex 6 in 9.

18. Idem productum invenitur si in prima columna assumes 9, & in primo ordine 6: ex quo patet nihil omninò interesse sive primum numerum per secundum multiplices, sive secundum per primum. Idipsum in genere de numeris omnibus ostenditur, unde si tres aut mille numeri invicem debeant multiplicari, undecumque incipias, aut quocumque ordine progrediaris unum ducens in alterum, & factum ex his duobus in tertium, & sic deinceps, semper idem postremo loco factum emerget.

19. Si numeros pluribus notis constantes multiplicare oporteat, horum alterutrum infra alterum scribe ita, ut unitates unitatibus subjiciantur; deinde notas omnes superioris numeri per singulas inferioris multiplica initio utrobique a postremis factò. Decades quæ inter multi-

plicandum colliguntur seponere adjiciendas factis ex eadem numeri inferioris nota in proxime sequentem superioris, si qua supersit. Facta quæ emergunt ex singulis notis inferioris in omnes superioris infra lineam seorsim notentur, ita ut uniuscujusque unitate subjiciantur numero per quem multiplicatio peragitur. Quod si horum omnium summa colligatur, ea erit productum questum.

20. In Ex. 7^o queritur factum ex 235 in 43. Scribe 43 sub 235, uti dictum est, tum ducta linea dic: 3 in 5 efficiunt 15. Scribe quinque sub numero multiplicante 3, & unam decadem seponere adjiciendam facto sequenti ex 3 in 3, quod est 9, cui si 1 addas, habebis unam decadem, & nullas præterea unitates: scribe igitur 0, & facto ex 3 in 2 adjiciens 1 scribe 7. Rursus dic: 4 in 5 efficiunt 20; scribe 0 ita ut multiplicatori 4 subiaceat, & facto sequenti 4 in 3, quod est 12, adjiciens 2 habebis 14: scribe igitur 4, & 1 servans dic: 2 in 4 efficiunt 8, & adjecto 1, scribe 9. Demum ducta linea collige in unam summam hos numeros ita dispositos, eritque numerus Q factum ex datis numeris.

21. Demonstratio facile eruitur ex ipsa numeralium notarum natura, quæ in anterioribus locis decuplo plus valent, quam in posterioribus, & ex eo principio quod partes simul sumptæ totum adæquant.

22. Ipse verò usus docebit, quod si vel alteruter vel uterque numerus in cyphas desinit, poterunt hæ in multiplicatione omnino negligi, dummodo productum totum in fine cyphræ apponantur, quot erant in coefficientibus. Sic in Ex. 8 idem prodit numerus R ex 52300 in 8420. Sive per ipsas cyphas multiplicationem instituas, sive his neglectis ducas 523 in 842, & productum tres cyphas apponas. Similiter si intra notas ipsas multiplicatoris aliqua cypha occurrit, poterit ea negligi, dummodo factum ex numero subsequenti sub ipso multiplicante numero notari incipiat, ut in Ex. 9^o.

23. Si explorare velis utrum multiplicatio rite peracta sit, jubent eosdem numeros iterum multiplicare, sed ordine inver-

inverso; ita nempe ut qui prius multiplicator fuerat, fiat multiplicandus, & contra. Sed hoc valde molestum accidit ubi numeri longiores sunt. In his casibus ad calculi molestiam levandam, & ad erroris periculum longius amovendum satius erit artificium adhibere, quod Neperus excogitavit. Tabulam Pythagoricam ita scribe ut numeri, qui duabus notis constant transversa lineola dirimantur, uti factum est in rectangulo ACDB, deinde tabulæ columnas divide ut ordine quolibet disponi possint, ac plures ejusdem numeri tabellas compara, ut tot præsto esse possint, quot ejusdem numeri notas in numero multiplicando esse contingat. Quin etiam cum fieri possit ut inter numeri multiplicandi notas cyphræ occurrant, lamellas quoque habere necesse est in quibus solæ cyphræ notentur. His positis si detur in Ex. 10^o numerus T, quem per V multiplicare oporteat tabellas selige, quarum singulæ singulas notas numeri T habeant in fronte, easque eodem ordine disponere, quo in dato numero disponuntur. Quoniam T per 8 multiplicare oportet, numeros omnes in ordine octavo occurrentes initio a postremis facto scribe infra lineam ita ut postremus jaceat sub numero 8, hoc tamen animadvertere quod qui in eodem rhombo includuntur colligi debent in unam summam, & decades, si quæ occurrunt, proxime subsequenti adijciendæ. Habebis eam ratione factum ex numero T in 8. Rursus nota eodem pacto sub numero 9 numeros, quos lamellæ exhibent in ordine nono, & habebis factum ex T. in 9. Idem in reliquis præsta, & omnium summa dabit numerum X, quod est productum ex numero T in V. Totius operationis ratio facile intelligitur ex dictis.

§. V.

Divisio in numeris integris.

24. **C**UM quantitas data per aliam datam quantitatem dividenda proponitur, eo demum questio reducitur ut inveniatur quoties in dividenda quantitate dividens quantitas contineatur; unde numerus ex divisione resultans, per quem scilicet huic questioni satis sit, quotus dicitur.

25. In Ex. 11^o proponatur numerus 10105 per 43 dividendus. Dividendo numero divisorem præfige lineola interjecta: tum operationem instituens in notis initialibus dividendi, quæ quantitatem exhibeant divisori æqualem, vel proxime maiorem, dic: quoties 43 continentur in 101? Resp. 2. Scribe ergo 2 ex altera parte dividendi, lineola pariter interjecta, & factum ex 2 in 43, sive 86, aufer ex 101, & residuo 15 notam appone, quæ in dividendo proximè sequitur quantitatem jam divisam 101. Dic iterum: quoties 43 continentur in 150? Resp. 3. Scribe 3 in quoto & factum ex 3 in 43, seu 129 aufer ex 150. Residuo 21 adnecte sequentem notam dividendi 5, & dic iterum: quoties 43 continentur in 215? Resp. 5. scribe 5 in quoto, & aufer ex 215 factum ex 5 in 43, sive 215. Cum nihil ex ea divisione supersit, constat numerum 235 illum præcisè esse qui oritur ex divisione 10105 per 43.

26. Demonstrationem habebis, si animadvertas in ejusmodi questione ita prorsus se rem habere ut si quæretur quota pars totius quantitatis singulis hominibus obveniret, si eam ex æquo tot hominibus distribui oporteret, quot habet divisor unitates. Nam in singulis operationibus illud scilicet inquirimus, quot unitates, decades &c. singulis dari possint; iisque datis, quæ dari possunt, quot adhuc distribuendæ supersint. Rem transfer in quæstorem regium, qui 10105 nummos aureos a

Rege

Rege acceperit militibus 43 ex æquo largiendos, & adhuc res magis in aperto erit.

27. Facile vides post quamlibet subtractionem peractam id quod relinquitur, antequam notam ulteriorem ex dividendo adjicias, divisore minorem esse oportere: nam si residuum æquale foret vel majus, jam divisor pluries contineretur in quantitate jam divisa, quam numerus indicet in quotum relatus.

28. Postquam residuo ulteriorem divisoris notam adjeceris, si adhuc quantitas manet divisore minor, qui proinde nusquam in ea contineatur, cyphram scribes in quoto, & adhuc ulteriorem divisoris notam residuo adjicies ut divisionem promoveas. Sic in Ex. 12^o quia sublati 1641 ex 1684, residuum 43 actum nota 7 adhuc minus est divisore 347, ponitur 0 in quoto, & nota 6 apposita numero 437, queritur quoties divisor in 4376 continetur.

29. Si divisione peracta, cum nulla reliqua est in dividendo nota, adhuc aliquid residui ex postrema subtractione supersit, quoto adjicienda est fractio, cujus denominator est divisor, numerator vero residuum illud postremum. Sic in Ex. 13^o cum 182 superfuerint, quoto adjecta est fractio $\frac{1}{8} \frac{6}{3} \frac{2}{5}$. Nempe si nummos 43603 parti deberes ex æquo hominibus 853, singuli acciperent nummos 52, & præterea 182 partes ejusmodi, quarum in singulis nummis 835 continentur. Poteris etiam divisionem promovere si postremo residuo cyphram adjicias puncto interposito, ut unitates ad decimas partes unitatis redigantur, nam si puncto item interposito quoto notas adscribas, quæ deinceps obveniunt, ex divisione (quam per novas subinde cyphras residuis adjectas continuare poteris ut libuerit) habebis partes unitatis decimas, centesimas, millesimas &c. integris notis addendas, eadem prorsus methodo, qua notæ integræ inventæ sunt, ut videre est in Ex. 14^o. Continget interdum ut ad ultimum divisionis limitem hoc pacto pertingas, plerumque tamen fiet ut in seriem incidas abe-

untem

antem in infinitum, cujus termini serius oculus iidem resideant, numquam tamen serius, quam post eundem terminos, quot habet divisor unitates. In hoc casu producitur divisio, donec valor obtineatur tam vero proximus, quantum quaestio, de qua agitur, requirit.

30. Cum numeri longiores sunt, omnis difficultas in eo sita est; quod non satis pateat, quoties divisor in assumptis dividendi notis contineatur. Qui satis fuerit in ejusmodi calculis exercitatus facile videbit ex primis ipsis utriusque numeri notis, quoties unus sumendus sit, ut altero fiat proximè minor; at qui usu careat facile in eo decipietur. Tutius incedet, si divisionem aggressus eam prius, quam scalam vocant, sibi confecerit. Divisor nempe per numeros omnes ab 1 ad 9 multiplicandus est, omnesque producti ex ea multiplicatione numeri divisoni ex ordine subjiciendi, ut in Ex. 14^o factum est; hoc enim pacto si hos numeros compares cum dividendi notis, in quibus divisionem instituis, statim videbis quinam ex illis sit proximè minor: pones in quoto numerum, in quem ductus divisor eam efficit quantitatem, quantitatem vero ipsam ex dividendi notis subduces.

31. Verum ea res admodum molesta accidit, & animus defatigatione victus facilius quam credi possit impinget ubi cæteroquin nulla est difficultas. Quare in his præsertim casibus Neperianis lamellis uti præstat. In Ex. 15^o (Tab. 2.) tabellas selige, & dispone ut earum in fronte numeri exhibeant divisorem 37895. Deinde resectis ad dexteram dividendi notis, quibus numerus fiat divisoni par, vel eodem proximè major, quære in lamellarum ordinibus, numerum 94076, vel proximè minorem, probe animadvertens quod diximus, hos numeros in lamellis ita legendos ut qui eodem rhombo includuntur in unam summam colligantur, denariis, si quæ occurrunt, in anteriores notas de more translatis. Invenies hoc pacto in ordine secundo numerum proximè minorem prædicto, 75790: scribe ergo 2 in quoto, & dendo subtrahere, residuo adijce numerum inventum a divi-

proxi-

proxime sequentem dividendi notam, & sic porro per-
te donec vel divisionem absolvas, vel quorum habeas
tantum libuerit vero proximum.

32. Divisionis rite peractæ argumentum habebis si di-
visorem in quorum ducas, redeatque divisus numerus;
nam si non redeat, manifestum est alicubi errorem esse
missum. Nota tamen quod si divisorem exactum ha-
beret non licuit, facto ex divisore in quorum addere
oportet residuum ex ultima divisionis subtractione, ut
redeat divisa quantitas. Sic in Ex. 15^o si ducas 37895 in
241, & facto addas postremum residuum 21138,
habebis divisum 94076528.

§. VI.

Additio & subtractio in numeris fractis.

ET hæc quidem in numeris integris ita peragun-
tur, at in fractis aliam fere rationem inire o-
portet. Fractiones ejusdem speciei dicuntur, si eundem
habent denominatorem, diversæ si diversum. Quæ ejus-
dem speciei sunt facile in unam summam adduntur, vel
in invicem subtrahuntur addendo vel subtrahendo nume-
ratores: qua in re illud est animadvertendum, quod
quoties ex numeratoribus colligitur numerus denomina-
tori æqualis, toties unitas ad integros est reiicienda:
itemque in subtractione si subtrahenda fractio illa ma-
ior est unde subtrahitur, unitas ex integris, si qui sunt
in quantitate mulctanda, mutua est accipienda, ex qua
fractio fiat eundem habens cum subtrahenda deno-
minatorem, ac numeratorem ut minori fractioni adjij-
ciatur.

34. In exemplo 16^o si fractionum numeratores colli-
gas bis pervenies ad 5 partes unitatis quintas, quare
duæ unitates integris sunt adjiciendæ, & summam col-
liges $64\frac{1}{5}$. At in Ex. 17^o quoniam fractio $\frac{4}{8}$ x $\frac{2}{5}$ au-
ferri

ferri nequit, ex 23 unitas sumitur quæ valet $\frac{5}{5}$ & $\frac{4}{5}$ auferuntur ex $\frac{7}{5}$, tum 8 auferuntur ex 22, & reliqua est differentia 14. $\frac{3}{4}$

35. Licet etiam in unam summam seorsim colligere numeratores, & numerum exinde proveniente per denominatorem dividere: quotus enim integros dabit numeros, & residuum erit numerator fractionis adjiciendæ. Sic in Ex.18^o summa numeratorum est 94, quem numerum si divides per 24, quotus est 3. $\frac{2}{3} \frac{2}{4}$ quem integrorum summæ addere oportet. Et hac quidem methodo uti præstat ubi numeris majoribus fractiones constant.

36. Cum pondera & mensuræ, aut alia ejusmodi in unam summam colliguntur, vel ab invicem subtrahuntur, quorum majores partes certum minorum partium numerum continent, eadem methodo in his pertractandis uti debemus, quæ in reliquis ejusdem speciei fractionibus usi sumus: nam & hæc re ipsa fractiones sunt, quibus denominator idcirco non apponitur, quia jam constat quot ex illis requirantur ut unam ex partibus proximè majoribus efficiant. Sic in Ex.29^o cum 18 octavæ colligantur duæ tantum hærent loco suo, reliquæ vero 16 cum duas uncias efficiant, earum numerum duabus augment unitatibus: & similiter cum uncia colligantur 32, duas ex his libras conficimus, & in unciarum loco 8 tantum, quæ superfluent, notari debent. At in Ex.20^o cum 4 octavæ a 3 auferri nequeant, mutuum accipe unam unciam, quæ 8 continet octavas, & ex 11 sublati 4, supersunt septem. Similiter cum ex 5 reliquis unciis 9 auferri nequeant, mutuum accipimus unam ex libris, quæ duodecim unciis constat, & 9 unciis sublati ex 17, supersunt 8: ac denique ex libris 40 subducimus 17 & reliquas habemus 23.

§. VII.

Fractiones ad eundem denominatorem redigere.

FRactiones diversæ speciei addi nequeunt vel subtrahi, nisi prius ad eundem denominatorem redigantur. Potest autem qualibet fractio salva quantitate diversum habere denominatorem, si numeratorem per eandem quantitatem multiplices, vel divides, per quam denominator multiplicatur, aut dividitur; Sic $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{4}{8}$ &c. eadem quantitas sunt, licet diversi sint numeri, quia unius numerator numeratoris alterius æque multiplex vel submultiplex est, ut denominator denominatoris. Itaque si duæ dentur fractiones diversæ speciei, ut alia ratio non suppetat qua redigi possint ad eandem speciem, numeratorem unius duces in denominatorem alterius, & viceversa; denominatores vero ipsos invicem duces, ut in Ex. 21^o factum est. Nam factum ex denominatoribus erit novarum fractionum communis denominator, & quo priora producta novos dabunt numeratores. Et eadem ratione progredi licebit si plures sint ejusmodi fractiones ad eandem speciem revocandæ. Nam ubi priores duas addideris, vel invicem subduxeris, pro ut res postulat, summa, vel differentia, ad eundem denominatorem redigetur, quo tertia afficiatur, & sic deinceps.

38. Dixi, ut alia ratio non suppetat, nam multoties idem obtineri potest una tantum immutata fractione, si nempe hujus denominator ad eundem numerum revocari possit cum denominatore alterius, sive per integrum multiplicetur (in quem numerator etiam ducendus erit) sive per integrum dividatur, quo etiam numerator dividi possit. Sic si dentur duæ fractiones $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{6}$, nemo non videt primam revocari posse ad denominatorem secundæ duplicando ipsius denominatorem, ac numerato-

rem:

rem: & si dentur $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{1} \frac{6}{8}$, secunda ejusdem evadit speciei cum prima, si per 6 uterque illius numerus dividatur. Verum non id semper licebit, nam $\frac{1}{5}$ & $\frac{8}{7}$ Ex: gr. non possunt ad eundem denominatorem adduci, nisi utroque denominatore immutato per traditam methodum; cum nullus sit integer, in quem ductus 5 evadat 7, & nullus sit integer per quem 7 divisus evadat 5.

§. VII.

Inventio divisorum.

39. **G**eneratim loquendo, nusquam licebit unam fractionem ad eandem speciem cum altera revocare, nisi utraque immutata, quoties denominatores numeri erunt vel in se primi, vel inter se. Numeri in se primi dicuntur, quos sola unitas metitur, cujusmodi sunt 1, 5, 7, 11, 19. Inter se primi dicuntur, qui præter unitatem nullum habent inter se communem divisorem.

40. His opponuntur numeri compositi, quos nempe præter unitatem alii quoque numeri metiuntur: sic 12 componitur ex 2 & 6, itemque ex 3 & 4, unde 2, 3, 4, 9 metiuntur 12, seu (quod perinde est) aliquoties sumptis 12 adæquant. Quod si igitur alicujus fractionis denominator sit numerus compositus, & resolvi possit in alterius fractionis denominatorem divisione instituta per numerum, ex quo numerator etiam componatur, licebit per divisionem fractionem hanc ad alterius denominatorem deprimere.

41. Et in minoribus quidem numeris facile dignoscitur utrum, & quos communes habeant divisores, at in majoribus aliquo artificio opus est, quo etiam utimur cum fractionem ad minimos terminos deprimere volumus. Etsi autem methodus tradi solet, qua communes
ejus-

ejusmodi divisores inveniantur, libet tamen docere quomodo omnes dati numeri divisores inveniendi sint, quod & ad rem facit, de qua loquimur, & alias etiam in arithmetica præstat utilitates.

42. Quærantur omnes divisores numeri 148. Ducta linea horizontali (Ex. 12^o) super illam aliam erige transversam lineam, cui ex alterutra parte numerum datum, & quotos ex divisione emergentes adscribas, ex altera vero divisores inveniendos. Quæraturn primò minimus dati numeri divisor, qui in casu nostro est 2, ut vel ex eo potest intelligi, quod numerus datus est par. Scribe ergo 2 in divisoribus, & ex altera parte quorum ex hac divisione 74. Rursus cum hic quotus sit numerus par, dividi poterit per 2: quare scribe iterum 2 in divisoribus, & quorum 37 ex alia parte. Tum duc 2 in 2, & factum 4 adice divisoribus inventis. Nam si 148 dividi potest per 2, & quotus hujus divisionis iterum dividitur per 2, manifestum est, quod totus numerus etiam per 4 dividi potest. Quoniam verò postremus quotus 37 numerus est primus, qui per se ipsum tantummodo dividi potest, aut per unitatem, nam alii ipsius divisores frustra inquiruntur: scribe 37 in divisoribus, & unitatem in quotis, deinde ob rationem jam dictam duc 37 in divisores antea inventos 2 & 4, & qui inde fiunt numeri 74, 148 divisoribus adjiciantur, habebisque omnes dati numeri divisores 2, 4, 37, 74, 148. Quod si

igitur revocanda esset ad minimos terminos fractio $\frac{37}{148}$ ex his intelligeres dividendam esse per maximum divisorem communem 37, ut evaderet $\frac{1}{4}$; & si ad eandem denominationem revocare oporteret fractiones $\frac{1}{37}$, $\frac{8}{148}$, hanc ad illam redigendam esse intelligeres divisione instituta per 4, qui numeratorem etiam dividit, & evadent $\frac{2}{37}$.

43. Notandum hic est, quod numeri etiam integri

E

ad-

ad quamlibet fractionis speciem revocari possunt, si per numerum multiplicentur, qui denominator est fractionis datæ, & factò idem subjiçatur denominator. Sic 7 & $\frac{2}{5}$ ad eandem speciem rediguntur si 7 ducatur in 5, exinde consticiatur fractio $\frac{35}{5}$. Ratio in promptus est ex dictis, si numeri integri pro fractis habeantur, quorum denominator est unitas.

§. VIII.

Fractiones multiplicare, & dividere.

44. **N** Ulla reductione opus est, ubi fractiones multiplicare oportet; satis enim numeratores, & denominatores invicem ducere, ut novus existat numerator & denominator fractionis, quæ erit factum ex datis fractionibus emergens. Sic factum ex $\frac{2}{6}$ in $\frac{4}{8}$ est $\frac{8}{48}$. Contra vero si fractio per aliam fractionem dividenda sit, dividendæ numerator per alterius denominatorem est multiplicandus, & illius denominator in hujus numeratorem ducendus est. Sic quotus ex $\frac{3}{6}$ per $\frac{2}{16}$ est $\frac{4}{12}$, sive 4. Nec mirum esse debet, si fractio per fractionem divisa dat numerum integrum, cum revera una fractio bis, ter, quater &c. in alia contineri possit. Itaque fractionis valor per multiplicationem minuitur, augetur per divisionem, & ratio constat, si ipsa divisionis, & multiplicationis natura attendatur. Quod si numerus compositus ex integro & fracto per numerum ex fracto & integro pariter compositum multiplicandus sit aut dividendus, uterque integer ad eandem cum fracto suo speciem revocandus est, & in unam summam cum eodem colligendus, ubi enim hoc feceris eadem præfusa methodo res absolvitur; ut in puris fractionibus.

Quoniam factum est. Atque ita etiam si diversæ speciei quantitates, ut puta, libræ, uncie, octavar per similes quantitates multiplicandæ essent, aut dividendæ, utraque prius oporteret ad infimam speciem redigere.

Sic ut habeatur factum ex $2 \frac{4}{5}$ in $3 \frac{5}{6}$, prior quantitas ad eandem speciem redacta dat $\frac{14}{5}$, secunda verò $\frac{3 \frac{3}{6}}$, & factum ex utraque $\frac{3 \frac{2}{3} \frac{2}{6}}$, sive $10 \frac{2 \frac{2}{3} \frac{2}{6}}$, aut $10 \frac{1 \frac{1}{3}}$, fractione ad minimos terminos depecta.

§. IX.

De iisdem in fractionibus decimalibus.

45. **F**Ractiones decimales eadem omnino ratione qua integri, pertractantur. Solum habenda est maxime ratio puncti, quo ab integris dirimuntur. Hoc enim punctum in eadem verticali linea jacere debet cum plures quantitates vel in unam summam colligendæ sunt, vel ab invicem subducendæ. Ubi vero multiplicatio instituitur, eum locum in facto occupare debet, ut totidem post se notas relinquat quot erant in utroque coefficiente. Denique si divisio peragitur, divisi numeri decimales notæ probe notandæ sunt computando in his etiam cyphas, quæ ad divisionem continuandam adjectæ essent; nam in quoto, & divisore simul totidem esse debent post punctum notæ, quot erant in dividendo. Additionem, subtractionem, multiplicationem, & divisionem ejusmodi exhibent exempla 23, 24, 25, 26.

46. Notandum est tamen quod interdum vacantis loca cyphis supplenda sunt. In subtractione, si numerus subtrahendus plures habet notas quam is unde subtrahitur, huic adjicere oportet tot cyphas, quot in illo notæ superfluent, Sic in Ex. 27 subtractionis peragitur

non aliter quam si vacantia superioris numeri loca cyphras continerent.

47. At si quantitates se mutuo destruant antequam ad punctum pervenias, quæ vacant in differentia loca ad punctum usque cyphris supplenda sunt, sive etiam integri numeri omnino se destruant, ut in Ex. 28°, sive aliquam relinquant differentiam, ut in Ex. 29°.

48. In multiplicatione, si non tot fuerint in facto notæ, quot in utroque coefficiente decimales, tot illi sunt cyphræ antèrius apponendæ, donec hunc notarum numerum adæquent. Ita factum est in Ex. 30.

49. Demum in divisione instituenda, si dividendus non tot habet notas quot requiruntur ut divisorem superet vel adæquet (tot in fine cyphræ adjiciantur, quot opus fuerit ad hunc defectum supplendum. Quod si divisione peracta, plures sint in diviso numero decimales notæ quam in divisore simul, & quoto, huic erunt apponendæ antèrius tot cyphræ quot in diviso notæ superfluent. Utrumque contingit in Ex. 31°. Nam si divisor est 356. 27, & dividendus sit 2. 324, huic erunt duæ cyphræ apponendæ, ut divisio possit institui, quæ cum deinde per duplicem cyphræ adjectionem continuetur, numerabit dividendus septem decimales notas, cum duæ tantum sint in divisore. Quinque igitur ejusmodi notæ esse debebunt in quoto, & ut totidem sint duæ illi cyphræ erunt antèrius apponendæ.

S. X.

Extractio Radicum.

30. **V**eniendum est jam ad extractionem radicum, qua in re illud in primis est animadvertendum quod si numerus in se ipsum ducitur, productum dicitur quadratum, sive potentia aut dignitas secunda ejusdem numeri, cum numerus ipse potentia prima dicatur. Si quadratum iterum ducitur in suum numerum, factum dicitur cubus, sive potentia tertia. Si cu-

bus

bus in eundem dteatur numerum factum dicitur potentia quarta. Si hæc iterum ducatur in eundem numerum, factum erit potentia quinta, eodemque modo sexta, septima &c. ejusdem numeri potentia gignuntur. Sic 3 est sui ipsius potentia prima, 9 secunda, 27 tertia, 81 quarta, 243 quinta, & sic deinceps.

51. Contraria prorsus ratione 3 dicitur radix quadrata, aut secunda, five sine ullo addito radix numeri 9, radix cubica aut tertia numeri 27, Radix quarta 81, quinta 243 &c.

52. Dati numeri potentiam quamlibet invenire facillimum est ope multiplicationis; at radicem investigare longe difficilior: immo infiniti numeri nullas habent radices veras, quas numeris liceat exprimere, sed tantummodo veris proximas, quæ scilicet fractionum ope ad veras quantum libuerit accedant, quin usquam ad exactum earundem valorem pertingant. Sic potentia secunda binarii est 4, ternarii est 9, adeoque Radix 4 est 2, radix 9 est 3: sed nullus numerus inter 4 & 9 radicem habet exactam in numeris vel integris vel fractis. Non in numeris integris quia major esse debet quam 2, minor quam 3: non in fractis vel in integris simul cum fractis, quia numerus fractus, vel compositus ex integro & fracto, in suo quadrato fractionem aliquam semper habet.

53. Radices extrahere dicimur cum ejusmodi radices veras, vel veris proximas investigamus. Methodum hic dabimus expeditam ad radices quadratas extrahendas, de altioribus dicemus in arithmetica speciosa, ubi formulæ algebraicæ ipsam hujus operationis rationem facile demonstrabunt. Ante tamen in promptu habere necesse est quadrata novem primorum numerorum, quæ sunt, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ut statim assignari possit radix vera, vel proxime minor vera cujuslibet numeri minoris quam 100.

54. Detur in Ex. 32º numerus 18190225 cujus radicem quadratam extrahere oporteat. Numerum datum in classes divide, quarum singulæ duas notas conti-

neant, initio a postremis facto, nihil enim refert siue unica tantum nota prima classis constet, siue duabus, ut in hoc casu contingit, & quot erunt ejusmodi classes, totidem radix quæsitâ habebit notas. Hinc dicta linea transversa ad calcem numeri, ut divisione fit,

55. Quære radicem veram, aut proxime minorem vera notarum primæ classis, quæ in nostro casu est 4, scribe 4 ubi in divisione quoti numeri notari solent, & ejus quadratum 16 aufer ex 18. Residuo 2 adnecte notas classis proxime sequentis & hujus novi numeri postrema nota contempta, quære quoties duplum radice hætenus inventæ, siue 8, contineatur in 21? Resp. 2. scribe ergo 2 in radice & ex 219 aufer productum ex 2 in 82, hoc est, in numerum compositum ex duplo radice prius inventæ in decadam ordinem translatro, & ex radice postremo inventa. Quod si contingeret factum ex 2 in 82 majorem esse, quam ut ex 219 subduci posset, pro 2 scribendus esset in radice numerus proxime minor & in eo tota operatio esset reformanda. Sed in casu nostro id minime contingit, quare ex 219 aufer 2 in 82, siue 164, & residuo adnecte notas classis proxime sequentis. Rursus contempta novi numeri postrema nota dic: quoties duplum radice hætenus inventæ, siue 84, contineatur in 550? Resp. 6, & quoniam factum ex 6 in 846 est ejusmodi ut auferri possit ex 5502, scribe 6 in radice, & ea subtractione peracta residuo adnecte postremas duas dati numeri notas. Dic ergo iterum quoties duplum radice hætenus inventæ, siue 852 contineatur in 4262? Resp. 5: & quoniam factum ex 5 in 8535 auferri potest ex 42625, scribe quinque in radice, & subtractione peracta quoniam nihil reliqui sit, id erit indicio radicem exactam dati numeri esse 4265.

56. Quod si post ultimam subtractionem aliquid superfit, punctum residuo apponitur, & duæ cyphræ adjunguntur, ut operatio continuetur in partibus decimis unitatis. Exinde eadem ratione progredimur ad centesimas, & sic deinceps quantum libuerit, ut videre est in Ex. 33°.

57. Idem hic quoque notare oportet quod est in divisione animadversum. Nempe si post adjectas alicui residuo notas duas classis proxime sequentis duplum radice inventæ nusquam contineatur in numero, qui per illud dividendus est postrema hujus nota contempta, cyphra ponenda est in radice, & classis sequentis duabus notis demissis operatio continuanda.

58. Denique hæc operatio divisioni est perquam simillima, in qua radix sit quotus, divisor verò sit duplum radice postremò inventæ auctum nota, quæ deinceps inquitur. Hoc unum interest, quod in divisione divisor semper est idem, hic autem semper augetur; ibi totus divisor cognoscitur, hic autem ignota est novi divisoris nota, quæ inquitur; quod in causa est, cur in hac divisione instituenda postrema quantitatis dividendæ nota præteratur.

59. Si numerus, unde radix extrahenda est, fractiones habeat decimales, classium divisio hinc & inde a puncto exordium sumit, ut videre est in Ex. 34: ubi nota quod cum decimalium classes definant in unam notam, ubi hæc postremo residuo est adjicienda, apposita cyphra ad binas adducitur.

60. Hujus operationis ritè peractæ argumentum habebis, si radice inventæ quadratum quæras, & huic residuum addas, si aliquid peracta operatione superfuit, redibit enim numerus, unde radix extracta est. Quod si radix extracta est ex quantitate composita ex integris & decimalibus, ubi operationis periculum facies numerus emerget, qui præter dati numeri notas aliquot in fine cyphras contineat; ne tamen putes alicujus erroris indicium hoc esse, nam cyphræ decimalibus in fine numeri adjectæ nihil mutant quantitatem, quemadmodum nihil eandem mutant in integris cyphræ antea appositæ.

§. XI.


De numeris surdis.

61. **M**ultoties ab extrahenda radice superfedemus ubi veram invenire non licet, & numero ex quo esset extrahenda signum radicale præfigimus $\sqrt{}$ sic $\sqrt{3}$ significat radicem quadratam numeri 3, $\sqrt[3]{10}$ denotat radicem cubicam denarii & $\sqrt[4]{28}$ denotat radicem quartam 28. Et hi sunt quos Arithmeti vocant numeros surdos, sive irracionales.

62. Ubi plures dantur ejusmodi numeri surdi, adduntur, vel subtrahuntur facillime, si & ejusdem sint ordinis & idem sit ubique sub signo radicali numerus præfigendo scilicet numerum, qui denotet quoties e surda quantitas sumenda sit; sic $7\sqrt{2}$ est summa $2\sqrt{2}$ & $5\sqrt{2}$, & $5\sqrt{2}$ est differentia inter $7\sqrt{2}$, & $2\sqrt{2}$. At ubi numeri sub signo radicali positi diversi sunt non aliter fere addi possunt, aut subtrahi quam connectendo quantitates per additionis, aut subtractionis signa de quibus dictum est in Scholio post prop. 9. Geom. & iterum dicetur in §. I. Elem. Algebræ.

63. Contingit tamen interdum ut quantitates surde ad eundem numerum revocari possint; in quo casu licebit post reductionem easdem addere, aut subtrahere uti dictum est. Reducuntur autem eadem ratione, qua minimos terminos revocantur. Numeri sub signo radicali positi quære omnes divisores, & inspicere an inter illos sit aliquis, ex quo liceat radicem extrahere ejus ordinis, cujus est surda quantitas. Si aliquem ejusmodi divisorem invenias, ejus radicem præfige signo radicali, sub quo hærebit tantummodo alter dati numeri coefficientens. Sic $\sqrt{8}$ resolvitur in radicem facti ex 2 in

4 unde æqualis invenitur $2\sqrt{2}$, & $\sqrt{32} = \sqrt{16\sqrt{2}}$ æquatur $4\sqrt{2}$. Eadem ratione $\sqrt[3]{16}$ æquatur $2\sqrt[3]{2}$, quia



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

RECEIVED

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

16 resolvitur in coefficientes 8 & 2, quorum ille habet radicem cubicam 2, & $\sqrt[4]{96}$ æquatur $2\sqrt[4]{6}$, quia 96 resolvitur in 16 & 6, quorum prior habet radicem quartam 2.

64. Demum multiplicantur, & dividuntur numeri irrationales, quemadmodum reliqui numeri, & facto vel quoto idem quod prius erat signum radicale præfigitur, quod quidem in utroque numero sit ejusdem ordinis; nam si sint ordinis diversi, prius ad eundem ordinem quantitates erunt ejusmodi revocandæ, de qua re commodius dicetur ubi de potentiarum exponentibus & logarithmis agemus. Interim factum ex $\sqrt{2}$ in $\sqrt{8}$ est $\sqrt{16}$, sive 4, & quotus ex $\sqrt{8}$ divisus per $\sqrt{2}$ æquatur $\sqrt{4}$, seu 2. Factum vero ex $\sqrt{2}$ in $\sqrt{3}$ est $\sqrt{6}$, & quotus ex $\sqrt{5}$ per $\sqrt{3}$ æquatur $\sqrt{\frac{3}{5}}$. Quod si quantitates irrationales per rationales multiplicare oporteat aut dividere, non alia re opus est quam has illis præfigere, aut subijcere sic factum ex 10 in $\sqrt{3}$ est $10\sqrt{3}$, & quotus ex divisione $\sqrt{3}$ per 5 est $\sqrt{\frac{3}{5}}$, seu $\frac{1}{5}\sqrt{3}$; sic enim scribere præstat ne divisorem radicali signo affectum esse quis putet.

C A P U T II.

De Rationibus, & Proportionibus.

S. I.

De ratione simplici.

1. **E**T si de his in Geometriæ Elementis aliqua diximus quantum eo loci res postulabat, non tamen erit inutile aliqua hic repetere, ubi ea doctrina plenius tradenda est; tum ne sæpius lectorem ad superiora remittamus, tum quia tanti refert animo hæc altius imprimere.

re,

re, ut opère prætium sit ea sæpius Tyronibus incutere. Utemur interdum arithmetice speciose notis ad proportionum affectiones vel generalius exprimendas, vel brevius demonstrandas. Itaque antequam hoc caput legere aggrediantur, recolant quæ de his ibidem adnotavimus, aut §. I. & II. Algebræ, quos a reliquis volumus divellere, attente perlegant.

2. *Ratio* dicitur ea duarum quantitatum habitudo, qua ad invicem referuntur in ordine ad ipsam quantitatem. *Geometrica* est si in ea relatione spectemus quomodo una quantitas alteram contineat: *Arithmetica*, si excessum tantummodo unius supra aliam consideremus. Si referas 10 ad 5 quatenus prior quantitas secundam bis continet, ratio erit geometrica: at si referas 10 ad 5 quatenus prior quinque unitatibus secundam excedit, ratio erit arithmetica. Rationis autem nomine, nisi quid additur, semper Geometrica designatur.

3. In omni ratione quantitas, quæ ad aliam refertur, antecedens dicitur, ea vero ad quam refertur, consequens.

4. *Ratio Geometrica* dicitur dupla, tripla, decupla &c. Si antecedens bis, ter, decies &c. consequentem continet: contra vero subdupla, subtripla subdecupla &c. Si bis, ter, decies &c. antecedens in consequenti continentur.

5. *Exponens rationis Geometricæ* dicitur quotus ex antecedenti per consequentem diviso: *Exponens* vero arithmetice est differentia consequentis ab antecedenti. Sic exponens rationis Geometricæ 10 ad 5 est 2, exponens arithmetice 10 ad 7 est 3: *Exponens Geometricæ* 6 ad 9 est $\frac{2}{3}$, exponens arithmetice 5 ad 8 est $8 - 5 = 3$: & in genere si dentur quantitates *a* & *b*, earum rationem geometricam exponet $\frac{a}{b}$ sive $a : b$ (nam ita quoque ea divisio designatur) arithmeticeam $a - b$. Hinc ratio geometrica ad instar fractionis scribitur, arithmetica ad instar subtractionis.

6. Tota rationum doctrina ab hoc generali theoremate pendet: si antecedens & consequens rationis geometricæ per eandem quantitatem multiplicentur aut dividantur eadem manet ratio: & eadem pariter manet ratio arithmetica si illius antecedentem, & consequentem eadem augeas quantitate, vel imminuas. Res demonstratione non indiget, patet enim ex ipsis terminis esse $6:2=6 \times 4:2 \times 4=24:8$, & $a:b=ac:bc$: itemque $6:3=\frac{6}{2}:\frac{3}{2}$, & $a:b=\frac{a}{d}:\frac{b}{d}$. Similiter $8=5(8+4)-(5+4)=12-9$, & $8-5=(8-2)-(5-2)=6-3$.

7. Quantitates æquales æqualem habent ad eandem quantitatem rationem, & contra: duarum vero inæqualium quantitatum quæ major est majorem habet ad tertiam quantitatem rationem, quam minor. Hæc & his similia satis per se manifesta sunt, & inter axiomata reponenda.

8. Duarum rationum æqualitas proportio dicitur Geometrica vel Arithmetica pro rationum ipsarum qualitate: quare ad habendam proportionem quatuor quantitates requiruntur, & prima ad secundam esse dicitur, ut tertia ad quartam. Quod si eadem quantitas bis assumatur, ut proportio in tribus tantum quantitatibus consistat, quod videlicet fit cum primæ rationis consequens idem est cum antecedente secundæ, proportio dicitur continua, quæ alias discreta diceretur. Designatur Geometrica

Proportio sic: $a.b::c.d$, vel $a:b=c:d$, vel $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$:

Arithmetica vero $a-b=c-d$.

9. In proportionem Geometricam factum sub extremis terminis, æquatur facto sub mediis: & si quatuor quantitates sint ejusmodi, ut factum sub extremis æquetur facto sub mediis, ex sunt geometricè proportionales. Id ipsum contingit in extremarum, & mediarum summa, si de Arithmetica proportionem sermo sit. Si rem in numeris experiaris, ita se habere liquido deprehendes, ac si demonstrationem directam inquiris, primam, & secun-

secundam partem demonstravimus in Elem. Geom. prop. 10. Tertia verò & quarta ex dictis num. 6., & 7. facile demonstratur. Nam si fuerit $a - b = c - d$, erit (per n. 6.) $(a + c) - (b + c) = (a + c) - (a + d)$; ergo (per num. 7.) $b + c = a + d$. Rursus si fuerit $b + c = a + d$, erit (per num. 5.) $(a + c) - (b + c) = (a + c) - (a + d)$. Ergo (per num. 6.) $a - b = c - d$.

10. In omni proportionē geometrica datis tribus terminis quartus facile invenitur. Nam si unus est ex extremis, æqualis erit factō sub mediis per alterum extremum diviso; & si est unus ex mediis æquabitur factō sub extremis per alterum medium diviso. In Arithmetica vero proportionē idem invenitur eadem ratione si multiplicationi additionem substituas, & divisioni subtractione. Descendit ex præcedentibus, nam si est $a. b :: x. c$, erit $a \times c = b \times x$, atque adeo $x = \frac{ac}{b}$ similiter si fuerit $c. d :: e. x$ erit $cx = de$, adeo-

que $x = \frac{de}{c}$. At in Arithmetica si fuerit $a - x = b - c$, erit $a + c = x + b$, unde $x = a + c - b$. Hinc regula aurea, sive trium, descendit, in qua datis prioribus tribus terminis geometricæ proportionis, tertius duci jubetur in secundum, & factum dividi per primum, ut quartus habeatur.

11. Ex nono numero deducitur quod utcumque ordinentur quatuor termini proportionales, manet proportio dummodo qui semel fuerant extremi, vel ambo maneant extremi, vel mediis, aut vice versa. Cum enim sint proportionales, factum sub extremis æquabitur factō sub mediis, & ordine, uti dictum est, immutato eadem manebit æqualitas. Et idem valet de summa in proportionē Arithmetica. Quoniam vero quilibet ex quatuor terminis primum locum occupare potest ejus coefficiente in postremum locum rejecto, & ex aliis duobus uterque mediorum primus esse potest altero secundo existente; terminorum ordo octies mutari potest.

est, ut patet in A, & B (Tab. pag. 110.) ubi ejus rei exemplum tam in Geometrica proportionione positum est, quam in Arithmetica.

12. Ex prima terminorum ordinatione reliquæ omnes inferuntur, quarum illationum duæ tantum propriis nominibus designantur a Geometris, secunda scilicet, & quinta earum quæ sunt in A; nam argumentari dicimur *alternando* cum primus inferitur esse ad tertium, ut secundus ad quartum: *invertendo*, si inferitur esse secundus ad primum, ut quartus ad tertium. Cæterum omnes ejusmodi mutationes non incongrue uno vocabulo *permutando* fieri duci possent.

13. In proportionē geometrica est summa vel differentia terminorum primæ rationis ad primum vel secundum, ut summa vel differentia terminorum secundæ rationis ad primum vel secundum; & contra primum vel secundus terminus primæ rationis est ad summam vel differentiam terminorum ejusdem, ut primus vel secundus terminus rationis secundæ ad ejusdem terminorum summam vel differentiam. Rursus summa terminorum primæ rationis est ad eorundem differentiam, ut summa terminorum secundæ ad ipsorum differentiam: & contra differentia terminorum primæ rationis ad eorundem summam est ut differentia terminorum secundæ ad ipsorum summam. Hinc decem inferuntur proportionēs, quæ dispositæ sunt in C, quarum posteriores quinque ex quinque prioribus fiunt *invertendo*. Harum omnium legitimam illationem in numeris explorabunt Tyrones, quos litteris in prima proportionē semel substitutos iisdem in omnibus reliquis substituent, permagni enim interest per hanc numerorum substitutionem algebraico, ut ita dicam, sermoni assuescere eumque sibi familiarem efficere; in nostro autem casu quantitates semper proportionales obtinebunt. Cæterum generalis horum demonstratio patet in D ubi harum omnium illationum extremi & medii termini invicem ducti dant æquales quantitates, cum sit ex hypotesi

$ad = bc$, & his æqualibus quantitibus ubique addatur vel adimantur æquales.

14. Ex his decem proportionibus cum secundam inserimus, in qua summa terminorum ad secundum refertur, argumentari dicimus *componendo*; si vero eorundem differentia ad secundum refertur, argumentari dicimus *dividendo*: Quod si demum utriusque rationis prior tertius ad primi & secundi differentiam refertur, ut in octava sit, hoc argumentandi genus dicitur *converso rationis*. Reliquæ illationes propriis nominibus earent. Cæterum in Arithmetica proportionē harum illationum nulla locum habet.

15. In qualibet proportionē eadem manebit rationum æqualitas, si per eandem quantitatem multiplicetur aut dividatur, vel primus & secundus terminus; vel primus & tertius; vel tertius & quartus; vel secundus & quartus, vel aliquod ex his binariis; vel omnia simul, si-ve per eandem omnia, si-ve per singulas singula binaria quantitates. Et enim in his omnibus casibus invenietur factum sub extremis terminis æquale facto sub mediis, ut patet in exemplo appposito in E ubi hos casus expressimus, in iisdem quantitibus $a . b :: c . d$ per eandem m successive multiplicatis, aut divisis. Et in quatuor quidem prioribus casibus factum sub extremis est ubique mad ; factum sub mediis mbe ; in quatuor vero posterioribus, illud est $\frac{ad}{m}$, hoc $\frac{bc}{m}$; quæ omnia æqualia sunt inter se ob $ad = bc$. Porro cum maneat proportio si-ve dividatur per eandem quantitatem si-ve multiplicetur unumquodlibet ex prædictis binariis; manifestum est eandem manere si-ve in pluribus successive, si-ve in omnibus simul idem fiat. Rem in numeris experiri Tyronebus erit in primis utile, ut monuimus, tum ad exercitationem, tum ad res altius animo designandas.

§. II.

De ratione composita.

16. **R**atio composita ex pluribus geometricis rationibus illa dicitur, quam habet factum ex earum antecedentibus ad factum ex consequentibus; ratio autem ex Arithmetice composita est illa, quam habet summa antecedentium ad summam consequentium. In F & H duæ sunt ex una parte rationes geometricæ, tres ex altera, & rationes ex his compositæ in G & K inveniuntur. Similiter duæ sunt rationes arithmetice in L, & ex his compositæ in M.

17. Ratio composita est factum ex componentibus in geometricis, summa in arithmetice. Nam quod ad primum attinet ratio $a : b$ est fractio $\frac{a}{b}$, & ratio $c : d$

est $\frac{c}{d}$ cum sit per num. 5. valor rationis quotus ex antecedenti per consequentem diviso. Sed $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

exprimit rationem $ac : bd$ ex simplicibus compositam: ergo ratio composita est factum ex componentibus. Sic ratio 4: 2 erat dupla, ratio 9: 3 tripla, ratio composita 36: 6 est sextupla. Similiter ex ratione 4: 2 dupla, 9: 3 tripla, 20: 5 quadrupla, oritur ratio 720: 30, cujus exponentis est 24, factum scilicet ex 2 X 3 X 4. Secunda pars evidens est, nam summa antecedentium est $a + c$, summa consequentium $b + d$, unde ratio ex his composita $(a + c) : (b + d)$. Patet etiam in rationibus $6 : 2 = 3$, $7 : 5 = 1\frac{2}{5}$, ex quibus componitur ratio $13 : 7 = 1\frac{6}{7} = 1\frac{2}{7} + 1\frac{4}{7} = 2\frac{6}{7}$.

18. Si plures sint geometricæ proportionales & primi seorsim termini invicem multiplicentur; tum secundi, tum tertii, tum quarti; facta erunt proportionalia: & idipsum continget in proportionibus arithmetice si multiplicationi summa terminorum substituantur. Patet, quia

quatuor termini, qui inde efficiuntur, duas constituent rationes ortas ibi ex multiplicatione, hic ex summa rationum æqualium adeoque & ipsæ æquales erunt inter se. Exempla habes in Q, R, S, T.

19. Si in pluribus rationibus geometricis vel arithmetis eundem terminum alicubi esse contingat tum in antecedentibus, tum in consequentibus; eadem erit ratio composita etiamsi terminus ille supprimatur. Exempla habes in V & X, ubi $am:nc$, & $a:n$ sunt rationes compositæ ex tribus superioribus suppresso termino b in prima, & bc in secunda, quod hi antecedentibus, & consequentibus communes sunt. Eadem exempla exhibent numeri in Y, Z. Quod si quis in arithmetis quoque rationibus exempla desideret, facillime per se ponet. Demonstratio pendet ex eo quod in his casibus terminus supprimitur, qui multiplicaret in geometrica, & augeret in arithmetica utrumque terminum rationis, quare eadem manet ratio (*per num. 6.*) sive abjiciatur ille terminus, sive inducatur in rationem compositam. Inde etiam facile eruitur quod toties in consequentibus idem terminus prætermitti potest quoties in antecedentibus suppressus est, ut in AA: ubi cum b semel in antecedentibus occurrat, bis in consequentibus, in his non nisi semel supprimi potest.

20. Ratio sive geometrica, sive arithmetica uniuscujusvis termini ad alium quemvis componitur ex rationibus intermediis, quæ oriuntur ex quovis numero terminorum interjacentium. Sic ratio $a:b$ æquatur rationi compositæ ex $a:m$, $m:p$, $p:r$, $r:c$, $c:b$, initio facta in a , & desinendo in b , sumptis terminis intermediis quot libuerit. Sic in numeris ratio 36:2 est ratio composita ex 36:18, 18:6, 6:12, 12:4, 4:2. Demonstratio in promptu est, quia quantitates illæ intermedie in antecedentibus & consequentibus occurrunt, unde ratio composita ex $a:m$, $m:p$, $p:r$, $r:c$, $c:b$ eadem est ac ratio $amprc:mpreb$, in qua suppressis communibus terminis remanet ratio $a:b$.

21. Hinc duplex oritur argumentandi ratio, quarum alte-

altera dicitur *ex æqualitate ordinata*, altera *ex æqualitate perturbata*. Sint, ut in AB & AC, tres quantitates ex una parte, & tres ex alia, ita ut eadem sit utrobique ratio primæ ad secundam, & secundæ ad tertiam; erit etiam utrobique eadem ratio primæ ad tertiam, & hoc est argumentari ex æqualitate ordinata. Si vero fuerit ex una parte prima quantitas ad secundam ut secunda ad tertiam ex alia, & contra; argumentabimur ex æqualitate perturbata si inferamus eandem esse utrobique rationem primæ ad tertiam. Exempla pro ratione arithmetica sunt in AD & AE, demonstratio autem pendet ex eo quod ultimæ rationes ex præcedentibus æqualibus componantur.

22. Hinc etiam intelligitur cur Euclides rationem compositam definiens ex duabus $a : b$, $c : d$, fieri jubet ut antecedens secundæ c ad suum consequentem d , ita consequentem primæ b ad novam quantitatem e , ut sit $a : e$ ratio ex duabus prædictis composita. Id inquam, intelligitur ex nostra etiam definitione, nam ratio $a : e$ componitur ex rationibus $a : b$; $b : e$; quare cum sit $b : e \equiv c : d$, erit ratio $a : e$ composita ex rationibus $a : b$, $c : d$.

23. Ratio inversa, seu reciproca dicitur, quam habet consequens ad suum antecedentem. Sic ratio inversa 3 ad 6 est ratio dupla, eadem scilicet, quam habent 6 ad 3.

24. Fractiones sunt in ratione composita ex directa numeratorum, & reciproca denominatorum. Exemplum numericum habes in AF, & ibidem ostenditur universim in litteris, revocando fractiones ad eundem denominatorem.

25. Ratio ex duabus æqualibus composita dicitur duplicata, ex tribus triplicata, ex quatuor quadruplicata, & sic deinceps.

26. Hinc ratio Geometrica, quam habet quadratum unius quantitatis ad quadratum alterius est ejus duplicata, quam habent ipsæ quantitates ad invicem, ratio cuborum triplicata, & sic aliarum potentiarum rationes

æque multiplices sunt, & dicuntur rationis, quam habent inter se radices, quot habent potentiarum exponentes unitates. Et contra ratio quam habent inter se radices quadratæ, cubicæ, quartæ &c. dicitur subduplicata, subtriplicata, subquadruplicata &c. rationis potentiarum correspondentium: at ratio quæ intercedit inter radices quadratas cuborum, hoc est ratio $a^{\frac{1}{2}}$ & $b^{\frac{1}{3}}$, dicitur sesquuplicata, cum sint $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$.

27. Facile intelligitur in omni progressionē sive geometrica, sive arithmetica primum terminum ad tertium habere rationem duplicatam primi ad secundum, primum ad quartum habere rationem triplicatam, & sic deinceps: nam ex rationes componuntur ex omnibus intermediis, quæ æquales sunt inter se. Euclides definit rationem ejus duplicatam, quam duæ quantitates habent inter se, illam quæ intercedit inter primum terminum & tertium proportionalem post primum & secundum; triplicatam quæ intercedit inter primum & quartum, & sic de reliquis, quod cum nostra definitione coincidere nemo non videt.

28. Si duæ sint variabiles quantitates ita connexæ inter se, ut si una dupla, tripla, vel utcumque multiplex evadat, altera etiam æque multiplex fiat; dicitur esse prima in ratione directâ simplici alterius. Sic in motu uniformi spatium est in ratione simplici directâ temporis. At si prima in eadem ratione decrescit, in qua altera augetur, tunc illa esse dicitur in ratione inversa, sive reciproca istius. Sic ubi res aliqua in partes æquales dividitur divisionibus diversis, magnitudo partium est in ratione inversa numeri ipsarum partium. Quod si istæ duæ variabiles quantitates ita sint invicem connexæ, ut altera crescat in eadem ratione qua primæ quadratum, aut cubus, aut potentia quarta &c. tunc illa esse dicetur in hujus ratione duplicata, triplicata, quadruplicata &c. Sic in sphaeris superficies sunt in ratione duplicata radiorum, moles vero in ratione tripli-

cata

zāta eorundem. At si in eadem ratione decreſcit, quā creſcunt primæ quadrata vel cubi, dicitur eſſe in ratione hujus reciproca duplicata aut triplicata: Sic gravitas Nevvtoniana eſt in ratione reciproca duplicata diſtantiarum, quia decreſcit in eadem ratione, quā diſtantiarum quadrata augentur: Dicitur demum una quantitas eſſe in ratione compoſita plurium quantitatum, quando creſcit in eadem ratione, quā productum ex his quantitatis: Sic in diverſis motibus uniformibus ſpatium eſt in ratione compoſita celeritatis, & temporis: Porro componuntur hæ rationes ex directis, & reciprocis, ſive ſimplicibus, ſive duplicatis, triplicatis, ſubduplicatis &c.

29. In quantitatibus variabilibus ratio inverſa, quā una ad alteram refertur bene etiam exprimitur per hoc quod una eſſe dicatur directe ut unitas, ſive conſtans quælibet quantitas, per alteram variabilem diviſa; nam fractio quæ inde emergit tanto minor eſt, quō major eſt ille diviſor: Sic ubi ſpatium diverſis celeritatibus percurritur, tempora ſunt in ratione reciproca celeritarum, hoc eſt, ut unitas ſive alia conſtans quantitas per easdem celeritates diviſa, aut ad easdem applicata: quod loquendi genus ſatis eſt Geometris familiare ad hanc diviſionem deſignandam:

30. Hoc proportionis genus, quod inter quantitates variabiles intercēdit, ſigno etiam æqualitatis exprimitur. Sic, ſi ſpatium dicatur S , tempus T , velocitas C , erit $S = CT$; hoc eſt, ſpatium æquabitur velocitati in tempus ductæ. Nempe ſi fuerit aliud ſpatium s , aliud tempus t , alia velocitas c , erit $S : s :: CT . ct$.

31. Hinc argumentamur utrinque multiplicando aut dividendo, tamquam ſi vera & propria æqualitas intercederet. Cum ſit enim $S = CT$, erit utrinque dividendo per C $\frac{S}{C} = T$, hoc eſt, tempus in ratione compoſita ex directa ſpatii S , & reciproca velocitatis C . Quod autem ita ſe res habere debeat patet ex eo, quia cum ſit $S . s :: CT . ct$, ſi primus & tertius terminus

dividatur per C , secundus & quartus per c , manebit
 rationum æqualitas (per num. 15.) eritque $\frac{S}{C} : \frac{s}{c} :: T. t.$

32. Si quantitas quædam, quæ prius variabilis erat,
 constans evadat; poterit ejus loco unitas substitui, at-
 que adeo auferri, si vel in fractionis denominatore erat,
 vel in numeratore cum aliis quantitatibus composita.
 Sic cum sit $S = CT$, si duo motus æquabiles inter se
 comparentur, & eadem sit utrobique velocitas, erit
 $S = T$, hoc est, spatia in ratione temporum directa;
 & rursus cum sit $T = \frac{S}{C}$, si idem fuerit in duobus


motibus spatium, erit $T = \frac{1}{C}$, hoc est tempora in ra-
 tione reciproca velocitatum. Eodem pacto res agitur in
 aliis similibus casibus, in quibus hac methodo ex uno
 Theoremate alia quamplurima facillimè eruuntur. Fa-
 cilis est demonstratio, cum sit enim $S. s :: CT$, et
 ubi C constans est, erit $C = c$, quare dividendo ter-
 minos secundæ rationis per eandem quantitatem mane-
 bit $S. s :: T. t$. Similiter cum sit $T. t :: \frac{S}{C} : \frac{s}{c}$, si
 fuerit $S = s$, dividendo per hanc quantitatem tertium,
 ac quartum terminum, manebit $T. t :: \frac{1}{C} : \frac{1}{c}$, quon-
 niam $\frac{S}{S} = 1$ & $\frac{s}{s} = 1$.

C A P U T III.

De Progressionibus, & Logarithmis.

1. **P**rogressio vocatur, uti dictum est, terminorum
 series, qui in eadem continua proportionem cre-
 scunt, vel decrescunt. Est autem progressio arithmetica,
 vel geometrica pro qualitate rationis, qua termini ad
 invicem referuntur. Geometricam habes in A, Arith-
 meti-

<div>A.</div> <div>d</div> <div>d</div> <div>md</div> <div>md</div>	<div>L</div> <div>$a - b$</div> <div>$c - d$</div> <div>$6 - 3$</div> <div>$7 - 5$</div>
<div>d</div> <div>d</div>	<div>$a - (b + d) = (b + d) \quad M \quad 13 - 7$</div>
<div>d</div> <div>m</div> <div>d</div>	<div>$a . b :: m . n$</div> <div>$c . d :: p . q$</div> <div>$e . f :: r . s$</div>
<div>m</div>	<div>$34 \quad ace . bdf :: mpr . nqs$</div>
<div>4 . 3 ::</div> <div>9 . 3 ::</div> <div>20 . 5 ::</div>	<div>$a - b = m - n$</div> <div>$c - d = p - q$</div> <div>$e - f = r - s$</div>
<div>1 . 30 :: 14</div>	<div>$f) = (m + p + r) - (n + q + s)$</div>
<div>AA</div> <div>a</div> <div>m</div> <div>b</div> <div>am</div>	<div>$24 . 12 . 4 :: 18 . 6 . 3$</div> <div>$24 . 12 :: 6 . 3$</div> <div>$12 . 4 :: 18 . 6$</div> <div>$24 . 4 :: 18 . 3$</div>
<div></div>	<div></div>



ARITHMETICÆ.

87

am in B. Et hæ quidem Progreſſiones creſcentes
& decreſcentes vero in C, & D exhibentur.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512 &c.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 &c.

4. 2. 1. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{64}$ &c.

0. 1. 0. - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6 &c.

1. Progreſſionis ratio ea eſt, quam habet primus terminus ad ſecundum, eadem eſt enim qua quilibet alius terminus ad proxime ſequentem refertur.

2. Si terminus quilibet referatur ad eum, qui ſecundus ab illo eſt, inveniatur habere ad eundem rationem progreſſionis duplicatam, ſi ad tertium triplicatam, &c. ininceps.

3. Ex eo quod rationes ejuſmodi ex omnibus intermediiſ componuntur. Sic in A eſt 8 ad 32 in ratione duplicata 1 ad 2; & 8 ad 64 in eadem ratione triplicata; & ſic de reliquis.

4. Igitur ſi in qualibet progreſſione, ſumantur quatuor termini, quorum priores duo eodem intervallo diſtint inter ſe; ac duo poſteriores, erunt hi proportionales. Sic ſi ſumatur in A ſecundus terminus 2, & quintus 16; itemque ſextus 32; & nonus 256; erit 2. 16:: 32. 256. Nam harum rationum utraque æque multiplicata eſt rationis in qua termini progrediuntur.

5. In progreſſione Geometrica terminorum differentie erunt pariter in eadem continua ratione: & ſi in eadem terminorum ſerie fuerint differentie terminis proportionales, erunt hi in progreſſione geometrica. Sic in 18, 6, 2, differentie 12, 4 ſunt ut 18 ad 6, in eadem nempe ratione, adeoque termini illi 18, 6, 2 ſunt in progreſſione geometrica.

Dem, Sit a, b :: b, c. Erit (per num. 13 & 14 cap. 2.)

convertendo $a. a - b :: b. b - c$. ergo alternando (*per num. 12. ib.*) erit $a. b :: a - b. b - c$. Sit jam $a. b :: a - b. b - c$; erit alternando $a. a - b :: b. b - c$; & convertendo $a. b :: b. c$.

6. In omni progressionē Geometricā terminī crescunt, vel decrescunt in infinitum, nec ulla est finita quantitas ultra quam vel crescens non ascendat, vel non descendat decrescens: quin tamen hęc ad nihilum usquam perveniat.

Dem. Cum enim terminorum differentię sint ipsis terminis proportionales, his crescentibus illas quoque augeri necesse est, Sit jam quælibet data quantitas p , & differentia termini primi a secundo q . Erit profecto numerus aliquis m , in quem si ducatur q datam quantitatem excedet. Quod si igitur tot progressionis termini sumantur post primum, quot habet m unitates, erit postremus major quam p . Etenim quod quilibet terminus sequens antecedenti addet, erit plus quam q , & universa incrementa totidem terminorum quot sunt in m unitates, erunt plusquam mq , adeoque datam quantitatem p excedent, & progressio eandem prætergredietur. Sit rursus quantitas r quantumvis exigua, dico progressionem Geometricam decrescentem infra illam demum descendere. Dicatur enim primus terminus a , & sumatur aliquis terminus p , qui sit ad a ut a ad r . Si progressio fiat crescens a termino a in eadem ratione, in qua decrescit, post aliquem terminorum numerum perveniet ad quemdam numerum n , qui major sit quam p . Sumatur jam in decrescente idem numerus terminorum, & sit t terminus, ad quem pervenitur: erit (*per num. 4.*) $t. a :: a. n$, est autem ex hypothesi $a. r :: p. a$, erit ergo perturbate (*per num. 21. cap. 2.*) $t. r :: p. n$; Et quia p minor est quam a , erit & t minor quam r , ex quo constat nullam esse finitam quantitatem infra quam series decrescens non descendat. Nec tamen ad nihilum perveniet, quia in serie crescente post quemlibet terminorum numerum ad finitam aliquam quantitatem n pervenietur, & post eandem terminorum numerum

sum in decrescente invenietur t qui sit ad a ut a ad u , nec esse poterit $t = 0$ cum sit $a a : u$.

7. Progressio Arithmetica crescens ultra quamlibet positivam quantitatem ascendet, decrescens vero infra quamlibet negativam descendet, & in ejus terminis etiam 0 esse poterit.

Cum enim eadem quantitas continuò adjiciatur vel adimatur; limitem quemcumque vel positivum vel negativum prætergredi necesse est. Quod si terminos esse contingat differentiarum exactè multiplices; crescens aut decrescens series per 0 necessariò transibit, cum additio vel subtractio continua terminos destruat. Sic in D series per 0 transit, & ab 0 incipit in B. (pag. III.)

8. Dato termino primo, ratione terminorum, & eorum numero, tam in geometrica progressionem, quam in arithmetica postremus invenitur.

Sit a terminus primus, & terminorum ratio in geometria ut 1 ad r , & numerus terminorum $m + 1$. Erit terminus secundus ar , tertius ar^2 , quartus ar^3 , ultimus ar^m . At in Arithmetica si primus terminus sit a , ratio vero ut 0 ad r , hoc est differentia terminorum r , & numerus terminorum $m + 1$, erit secundus $a + r$, tertius $a + 2r$, quartus $a + 3r$, & ultimus $a + m r$. Hinc duo hæc theoremata inferuntur. In progressionem geometrica ultimus terminus æquatur facto ex primo in exponentem rationis ad eam potestatem elevatum, quam exprimit numerus terminorum unitate multiplicatus. At in progressionem arithmetica ultimus terminus æquatur summæ ex primo, & differentia terminorum in eorundem numerum ducta unitate multiplicatum. Sic in A (pag. III.) terminus quintus ita invenitur: $a = 1$, $r = 2$, $m + 1 = 5$, $m = 4$, ergo quintus $ar^m = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16$. At in B $a = 0$, $r = 1$, $m = 4$, unde terminus quintus $a + m r = 4$.

9. In progressionem Geometrica est differentia primi a secundo ad differentiam primi ab ultimo, ut primus ad totam seriem dempto ultimo.

Veret 1, secundo $\frac{1}{4}$, tertio $\frac{1}{16}$, & sic deinceps; post infinitas solutiones adhuc aliquid deberet.

11. In progressionē Arithmetica dimidium summæ termini primi & ultimi in numerum terminorum ductum dat totam seriem.

Cum enim sit primus ad secundum ut penultimus ad ultimum, summa primi & ultimi eadem erit, quæ secundæ & penultimæ, & sic de cæteris, cum omniæ ejusmodi binaria eandem habeant summam. Cum igitur tot sit binaria quot habet terminos dimidia series, manifestum est summam termini primi & ultimi in dimidium numerum terminorum totam seriem colligere. Sic in B (pag. 111.) summa priorum sex terminorum, quotum primus est 0, postremus 5, erit $(0 + 5) \times 6 : 2 = 30 : 2 = 15$.

12. Hæc si conferas cum his quæ dicta sunt in n. 8. facile intelliges summam omnium numerorum in serie naturali ab unitate progredientium usque ad numerum quemdam x inclusive fore $(xx + x) : 2$; & summam omnium imparium pariter ab unitate, existente terminorum numero x , fore x^2 . Sic omnium numerorum summa usque ad 6 inclusive est $(36 + 6) : 2 = 21$. & summa sex priorum imparium $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$. Similiter si sumas quemdam numerum x numerorum parium in serie naturali a 2 progredientium, invenies hanc fore $xx + x$. Sic summa priorum quinque numerorum parium $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 25 + 5 = 30$.

13. Si sint duæ progressionēs, quarum altera geometrica sit, altera arithmetica, & sub singulis primæ terminis singuli secundæ notentur, undecumque initium fiat, hi dicuntur illorum Logarithmi. Sic termini progressionis F sunt logarithmi progressionis E, singuli singulorum sibi imminuentium: 6 est logarithmus 2, & 16 est Log. 64.

E $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. &c.
16 8 4 2

F 4. 2. 0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. &c.

14. Logarithmi multipliciter variari possunt. Integrum est enim cuivis duas quaslibet progressionis assumere, & alteram alteri affigere. Sed ad rem totam determinandam satis est duos geometricæ progressionis terminos cum suis Logarithmis constituere. Sic ubi semel decreveris 4 & 6 esse Log. 1 & 2, reliqui Logarithmi constituti sunt.

15. Utcumque fuerit constituta progressio geometrica cum suis Logarithmis, utramque seriem licebit interjectis quocumque terminis augere. Si quidem inter duos quoslibet Geometricæ terminos medium geometricè proportionale, & inter duos eorum Logarithmos medium arithmeticè proportionale constituas. Sic inter 2 & 4 medium proportionale est $\sqrt{2 \times 4} = \sqrt{8} = 2.829$ &c. cujus Log. est $(6 \div 8)$: $2 = 7$. Et eadem methode semper inveniri poterunt infiniti alii Logarithmi numerorum, qui vel integri sint, vel ex integris & fractis compositi, medios terminos inter duos proximos semper inquirendo. Porro geometricæ progressionis termini dicuntur sine ullo addito *numeri*, termini vero arithmeticæ *Logarithmi*.

16. Utcumque fuerint Logarithmi constituti, semper verum erit hoc generale Theorema, quod si e progressionē Geometrica quatuor sumantur termini, qui sint inter se geometricè proportionales, erunt eorum Logarithmi in proportionē arithmetica. Eruat enim illi ita in serie dispositi, ut priores duo æque distent inter se, ut duo posteriores; quod idem cum Logarithmis contingat, erunt etiam hi arithmeticè proportionales.

17. Igitur quæcumque fuerit Logarithmorum constitutio, in regula trium satis erit secundi & tertii termini Logarithmos addere, & ab ea summa Logarithmum primi subtrahere ut habeatur Logarithmus quarti; cum enim sint geometricè proportionales numeri, quorum tres dantur & unus inquitur, erunt eorum Logarithmi arithmeticè proportionales; quare summa primi & ultimi æqualis erit summæ secundi & tertii, adeoque habi-

bebitur quartus, si ab horum summa primum subducas.

18. Logarithmi designantur præfigendo quantitati litteram L , vel Log , quod frequentius usurpatur. Itaque $\text{Log. } a$ denotat Logarithmum numeri a . Quod si his notis utaris, clarius etiam intelliges quod dicebamus; fore nempe $\text{Log. } x = \text{Log. } b + \text{Log. } c - \text{Log. } a$, si fuerit $a : b :: c : x$. Cum sint enim numerorum geometricè proportionalium Logarithmi arithmeticè proportionales, erit $\text{Log. } a - \text{Log. } b = \text{Log. } c - \text{Log. } x$; ergo $\text{Log. } a + \text{Log. } x = \text{Log. } c + \text{Log. } b$; adeoque $\text{Log. } b - \text{Log. } c = \text{Log. } a - \text{Log. } x$.

19. Forma Logarithmorum omnium commodissima est, in qua Logarithmus unitatis constituitur 0, & utraque progressio crescit. Sint duæ hujusmodi progressionēs G , & H ,

$$G \quad \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 \text{ \&c.}$$

$$H \quad 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \text{ \&c.}$$

20. In hac forma Logarithmorum in primis quilibet numerus erit aliqua potestas ejus, qui proximè sequitur unitatem: sic in nostro exemplo 4 est potestas secunda ipsius 2, 8 potestas ejusdem tertia, 16 potestas quarta &c. Erit enim $1 : 2 :: 2 : 4 = (2 \times 2)$; 1 , & $1 : 2 :: 4 : 8 = (2 \times 2 \times 2)$; 1 , & sic deinceps.

21. Præterea si progressio arithmetica habeat post 0 unitatem, erunt Logarithmi hujusmodi potestatum exponentes. Sic 4 est Logarithmus 16, qui est quarta potestas ipsius 2. Id manifestè sequitur ex num. præcedenti.

22. In qualibet forma Logarithmorum, in quibus 0 sit $\text{Log. } 1$, locum habebunt hæc quatuor Theoremata,

$$1^o \text{ Log. } (pq) = \text{Log. } p + \text{Log. } q.$$

$$2^o \text{ Log. } \frac{p}{q} = \text{Log. } p - \text{Log. } q.$$

$$3^{\circ} \text{ Log. } p^m = m \text{ Log. } p.$$

$$4^{\circ} \text{ Log. } \sqrt[m]{p} = \frac{1}{m} \text{ Log. } p.$$

Horum theorematum sensus, ac vis est quæ sequitur.

23. Denotat primum æquari Logarithmum facti Logarithmis coefficientium simul sumptis. Sic quia $2 \times 8 = 16$; hujus numeri Logarithmus in progressionem Hæqualis est $1 + 3$; qui sunt Logarithmi numerorum 2 & 8. Facilis est demonstratio: Est enim $1. p : q. pq$. Ergo $\text{Log. } 1 + \text{Log. } (pq) = \text{Log. } p + \text{Log. } q.$ (per num. 18.), sed $\text{Log. } 1 = 0$; ex hypothese, ergo $\text{Log. } (pq) = \text{Log. } p + \text{Log. } q.$

24. Secundi theorematum sensus est: Logarithmum quoti æquari Logarithmo divisi, dempto Logarithmo divisoris. Sic quoniam $64 : 16 = 4$ erit $\text{Log. } 4 = \text{Log. } 64 - \text{Log. } 16 = 6 - 4 = 2$. Etenim cum sit per regulam trium $q. 1 :: p.p : q$, erit $\text{Log. } q + \text{Log. } (p : q) = \text{Log. } 1 + \text{Log. } p$, & delendo $\text{Log. } 1$, qui in nostro casu est $= 0$, & auferendo utrinque $\text{Log. } q$, erit $\text{Log. } (p : q) = \text{Log. } p - \text{Log. } q.$

25. Tertium theorema est: Logarithmum potestatis cujuslibet numeri obtineri multiplicando per exponentem potestatis ipsius numeri Logarithmum. Sic si elevare velis numerum 4 ad tertiam potestatem, & hujus potestatis Logarithmum quæras, obtinebis ducendo $\text{Log. } 4$ in 3. Nempe $\text{Log. } 4 = 2$, & $2 \times 3 = 6$, qui est $\text{Log. } 64$; est autem 64 potestas tertia ipsius 4. Etenim potestates oriuntur ducendo numerum in se ipsum, quare hujus Logarithmus continuò sibi ipse adjicitur, ut novæ potestatis Logarithmus habeatur. Sic $a = a \times a$, ac propterea $\text{Log. } a^2 = \text{Log. } a + \text{Log. } a = 2 \text{ Log. } a$, eodemque modo $a^3 = a \times a \times a$, & $\text{Log. } a^3 = \text{Log. } a + \text{Log. } a + \text{Log. } a = 3 \text{ Log. } a.$

26. Quartum theorema est: Logarithmum radices aliqujus numeri haberi, si ejus Logarithmus per exponentem

in radicis dividatur. Sic Log. $\sqrt[3]{64} = 6 : 3$, hoc est logarithmo 64 per 3 diviso, est autem quotus ex hac divisione emergens 2 Logarithmus ipsius 4, qui radix prima est numeri 64. Demonstratio facile intelligitur ex superiorum theorematum demonstratione.

27. Hinc factum est, ut numerorum radices ab Arithmeticis tamquam quædam ipsorum potestates per exponentes fractos designentur, ut eodem pacto illas pertrahere liceat, quo reliquæ numerorum potestates, quæ

communiter hoc nomine designantur. Sic $\sqrt[3]{4}$ scribitur

$4^{\frac{1}{3}}$ & $a^{\frac{2}{3}}$ denotat radicem cubicam quadrati ipsius a ,

$a^{\frac{m}{n}}$ denotat radicem n ipsius a . Patet igitur quantitates radicales, sive numeros surdos ordinis diversi ad eundem ordinem redigi, non aliter quam fractiones ad eundem denominatorem, id ipsum nempe efficiendo eorum radicalium exponentibus fractis: quod ex 71. cap. I. in hunc locum rejecimus. Sic si oportet

in vicem multiplicare $\sqrt[3]{a}$ & $\sqrt[3]{aa}$, cum id fieri nequeat, nisi prius ad eundem ordinem redigantur,

scribe pro $\sqrt[3]{a}$, $a^{\frac{1}{3}}$, & pro $\sqrt[3]{aa}$, $a^{\frac{2}{3}}$ & revolvendo exponentes ad eundem denominatorem habebis

$a^{\frac{1}{6}}$, & $a^{\frac{4}{6}}$, sive $\sqrt[6]{a^1}$, & $\sqrt[6]{a^4}$, quorum factum

est $\sqrt[6]{a^7}$, sive $a\sqrt[6]{a}$. Eadem ratione $\sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}$ & $\sqrt[3]{6} = 6^{\frac{1}{3}}$, quibus ad eundem ordinem redactis habebis

$2^{\frac{1}{6}}$, & $6^{\frac{2}{6}}$, sive $\sqrt[6]{2}$, & $\sqrt[6]{36}$, quarum factum

est $\sqrt[6]{288}$.

28. Si numerorum omnium Logarithmi haberi possent, supputandi rationem commodissimam haberemus. Multiplicatio enim additione perficeretur, divisio subtractione, & quælibet dati numeri potestas, vel radix multiplicatione aut divisione ejus Logarithmi invenire-

hæretur. Nunc autem cum omnes accurate haberi non possint, obtinentur quantum libuerit veris proximi continuus mediorum proportionalium inquisitione. Sic multorum anteriorum labore supputati sunt Logarithmi pro omnibus numeris usque ad 100000. Sed hi sunt alterius cujusdam formæ, de qua mox dicemus.

29. In hac Logarithmorum forma, in qua unitati responderet 0, integri numeri Logarithmos habebunt positivos, fracti negativos, ut facile apparet in H, ex quo constat hoc theorema. Dato Logarithmo negativo, ut ejus numerus habeatur faciesit unitatem accipere per numerum divisam, cui idem Logarithmus si positivus esset, responderet. Nempe si fuerit $a = \text{Log. } b$, erit $-a = \text{Log. } \frac{1}{b}$; etenim $\text{Log. } \frac{1}{b} = \text{Log. } 1 - \text{Log. } b = -\text{Log. } b$. Sic -3 est $\text{Log. } \frac{1}{8}$, quia 3 est $\text{Log. } 8$.

30. Præterea si plures fuerint Logarithmorum series utcumque constitutæ, dummodo in omnibus $\text{Log. } 1$ sit 0, erunt cujuslibet numeri logarithmi inter se, ut logarithmi cujuslibet alterius. Nam si ex. gr. $\text{Log. } 2$ fuisset constitutus pro 1 quilibet alius numerus, cum numerorum sequentium Logarithmi æquabiliter crescant, tanto majores omnes reliqui obvenissent, quanto major primus assumptus esset.

31. Forma Logarithmorum commodissima, quæ nunc usurpatur est ea, in qua geometrica progressio in ratione decupla est 1, 10, 100, 1000 &c. Arithmetica vero 0, 1, 2, 3 &c. quamvis, ad habendos Logarithmos pro numeris intermediis, integris numeris decimales fractiones adjectæ sint, ut Logarithmi evaderent 0. 0000 &c. 1. 0000 &c. 2. 0000 &c. Incredibili labore inventi sunt veris quam proximi Logarithmi numerorum, qui medii sunt inter 1 & 10, inter 10 & 100. &c. inquirendo medios proportionales veris quam proximis, & eorum Logarithmos. Sic ut haberetur $\text{Log. } 9$ quæsitus est medius proportionalis inter 1 & 10, sive inter 1. 0000000, & 10. 0000000, extrahendo ex

10. 0 &c. radicem quadratam veræ proximam 3. 1622777, cujus Logarithmus est dimidius Log. 10. Es iste quidem numerus major est aliquanto quam 3, sed adhuc longè distat a 9. Itaque inter eum & 10. 0 &c. iterum quaesitus est medius proportionalis extrahendo radicem numeri, qui oritur ducendo 10. 00 &c. in 3. 16 &c. & inventa est radix veræ quam proxima 5. 6234132. Hic numerus paulo major est quam 5, & ejus Logarithmus habetur si summa Logarithmorum 10. 00 &c. & 3. 16 &c. bifariam dividatur. Sic continua inquisitione mediorum proportionalium inter duos numeros qui sint proximè majores vel minores quam 9, deveniunt tandem ad numerum qui ne una quidem millionesima differat a 9; ejusque Logarithmus numero 9 attribuitur. Hoc artificio supputatæ sunt tabulæ Logarithmorum pro numeris naturalibus ab 1 usque ad 100000, sed hæ majoris formæ volumen implent. In libellis, qui vulgò solent circumferri, producuntur tabulæ usque ad 10000. Nos ad calcem Trigonometriæ post tabulas sinuum Logarithmos adjecimus ab 1 ad 1000, ne voluminis moles auferetur, & quod hi ad instituti nostri rationem satis essent.

32. Cæterum in tabulis supputandis non necesse est eam, quam inuimus, methodum adhibere; nisi in numeris primis. Nam in his, qui ex aliorum multiplicatione oriuntur, satis erit Logarithmos coefficientium addere, ut habeatur Logarithmus facti. Sic Log. 15 = Log. 3 + Log. 5 & Log. 27 = Log. 3 + Log. 9.

33. In hac Logarithmorum forma Log. numerorum ab 0 ad 10 habebunt 0 cum aliquot decimalibus adjunctis. Sic invenietur in tabulis Log. 3 = 0.4771213. At qui sequuntur a 10 usque ad 100 habebunt unitatem decimalibus auctam, & ita porro. Sic Log. 15 = 1.1760913. Log. 171. = 2.2329961. Numerus ille integer decimalibus præfixus dicitur Logarithmi characteristica, & hoc habetur Theorema. Omnis quantitas, que designatur unitate, & quolibet cyphrarum numero, habet in Logarithmi characteristica tot unitates meris cyphris

phris præfixas, quæ ipsa cyphas. Sic Log. 1000000 = 6. 0000000. Quilibet alius numerus tot habet pro characteristica unitates decimalibus præfixas, quot ipse notis constar una dempta. Sic Log. 897 = 2.9527924.

34. Igitur ubi semel Logarithmi characteristica innotuerit, jam sciri potest quot notis ejus numerus constabit: id quod multoties percommodum accidit. Sic si scire velles ad quam perveniet quantitatem qui unitatem continuò duplicet per 64 vices, dicens nempe 1, 2, 4, 8 &c. satis erit notare eum esse perventurum ad sexagesimam tertiam potestatem binarii, quare ejus numeri Logarithmus æqualis erit 63 X Log. 2, seu 18.9648900. Jam vero si Logarithmus haberet post integras notas meras cyphas, constaret ejus numerus unitate & 18 cyphis, adeoque trillio esset; si vero haberet characteristicam 19, quam meræ cyphræ subsequerentur, esset una Trillionum decas: cum igitur inventus Logarithmus inter hos duos medius sit, & quidem propius accedens ad secundum, quam ad primum, etsi nondum de ejus numero constet, habes tamen Trillione longe majorem esse, & ad denos Trilliones proximè accedere.

35. Cognita jam Logarithmorum natura, videndum superest quomodo dato numero ejus Logarithmus inveniat, vel contra; & quomodo tabulæ ultra suos limites extendi possint, Quod ubi fecerimus alicujus problematis solutionem adjiciemus, quod sine Logarithmis esset ad solvendum difficillimum.

36. Si datus numerus integer est, eoque minor ad quem tabulæ pertingunt, inveniat in ipsis tabulis Logarithmus numero appositus. Sic Log. 257 = 2.4099331. Si fractionem adjunctam habeat, cape Logarithmum integri, & ejus differentiam a Logarithmo proxime sequente. Tum dic: si numerus integer augetur unitate, ejus Logarithmus augetur inventa differentia; cum ergo augeatur datis partibus unitatis quanto major evadit ejus Logarithmus? id nempe invenies per regulam trium, & additum Logarithmo integri dabit Logarithmum compositi ex integro & fractis. Sic si queratur
Log.

Log. 257. 325, proxime ex tabulis Log. 258, & ex eo subtrahere Log. 257, invenies differentiam 16866. Tantum nempe crevit Logarithmus, ubi numerus augetur unitate; at in nostro casu augetur non quidem 325 unitatibus (quod probè notandum est) sed 325 millesimis partibus unitatis, unde ita ille numerus tractari debet, ut fractio habens denominatorem 1000. Fac igitur

$1: 16866 :: \frac{325}{1000}$ ad quantum, quem minutiis contem-
 ptis invenies 5481. Tantum nempe crevit Log. 257 ob additas numero fractiones datas, igitur Logarithm^o 257 adde 5481, & habebis Log. 257. 325 = 2.4104812 quamproximè. Essi enim Logarithmorum differentiarum numerorum differentiis non sint proportionales, tamen ab ea proportionem tam parum aberrant in differentiis exiguis, cujusmodi hæ sunt, ut pro talibus haberi possint sine ullo sensibilis erroris periculo. Quod si commodius sit integrum numerum per fractionis denominatorem multiplicare, ut tota quantitas simul collecta fractio spuria evadat, commodius etiam invenietur ejus Logarithmus subducendo Logarithmum denominatoris a Logarithmo numeratoris per n. 24. Sic si queratur Log. 9 $\frac{1}{3}$ cum ea quantitas commodè redigatur ad spuriam fractionem $\frac{28}{3}$, a Log. 29 aufer Log. 3, & habebis Log. 9 $\frac{1}{3}$ = $\frac{1}{3}$ = 0.9700367.

37. Quod si numerus datus sit vera fractio, erit Logarithmus denominatoris major quam numeratoris; quare hic ab illo subtrahendus, & præfigendum differentię signum negativum, ut habeatur Log. numeri unitate minoris negativus, juxta num. 29. Sic Log. $\frac{3}{25}$ = Lo. 3. —

Log. 25 = 0.4771213 — 1.3979400 = — 0.9208187. Quod si fractio sit decimalis notandum est in ea subaudiri denominatorem constantem unitate, ac totidem cyphris quot sunt in ipsa notæ, itaque hujus denominatoris Logarithmum subtrahere a Log. numeratoris, &

signum negativum differentiae praefigens rem, ut supra; confeceris. Sic si quaratur Log. 0. 194 aufer Log. 194 a Log. 1000 (hic enim est denominator ejus fractionis) & habebis Log. 0. 194 $\equiv -0.7121983$.

38. At si numerus detur inajor iis, qui in tabulis continentur, ejus Logarithmum vero proximum sic invenies. Ex numero dato tot notas puncto interjecto resecta, quot opus est, ut non plus valeat, quam qui in tabulis continentur. Tum ejus Log. inquires non aliter quam si ex integris & decimalibus constaret, uti factum est in num. 36. Logarithmi sic inventi characteristicam tot unitatibus auge, quot in dato numero notae pro decimalibus sunt habitae, & habebis Log. quæsitum. Queratur exempligr. Log. 257325. Punctum insere post 257, ut fiat 257.325. Ejus Log. invenies ut supra 2. 4104812; & quia tres notae ab integro resectae sunt, & pro decimalibus habitae, addde 3 hujus characteristicae, & habebis Log. 257325 $\equiv 5.4104812$. Operationis ratio facile intelligitur, etenim dum integri numeri notas aliquas ad ordinem decimalium deprimis; perinde facis, ut si illum divideres per numerum constantem unitate & totidem cyphris, quot sunt depressae notae. Sic in nostro casu est 257.325 $\equiv 257325 : 1000$. Redibit autem numerus ad priorem quantitatem, si per eundem numerum illum multiplices, per quem divisus est, eritque 257.325 $\times 1000 \equiv 257325$; quare Log. 257325 \equiv Log. 257.325 + Log. 1000 (per fr. 23); sed Log. 1000 $\equiv 3 : 0000000$, & in genere loquendo Log. numeri constantis unitate & meris cyphris totidem unitates habet pro characteristica, quot numerus cyphras, ergo &c. Sic si daretur num. 25732.5, cum duas tantum ex integro notas ad decimales deprimere necesse sit; perinde erit ut si illum divideres per 100, quare invento Log. 257.325 ut antea; ejus characteristica duabus tantum unitatibus augenda esset, & haberetur Log. 25732.5 $\equiv 4.4104812$.

39. Notandum tamen, quod si datus numerus ita numeros tabularum excedat, ut plusquam duplo plures notas

notas habent, Logarithmi hac methodo inventi non satis erunt accurati; cum proxima sit, non accurata, ea proportio; in qua regulæ trium usus innititur. Quare in his casibus satius est tabulas consulere, quæ ad numeros majores pertingunt: aut, si numerus ex his componitur, qui habeantur in tabulis, coefficientium Logarithmos in unam summam colligere.

40. Et hætenus quidem dato numero ejus Logarithmus quæsitus est. Superest, ut dato Logarithmo numerus investigetur. Si Logarithmus datus in tabulis accuratus occurrat, numerum capies eidem appositum. Sic si detur 2.7371926, illum facile invenies; si ductum sequaris characteristicæ & notarum proximè sequentium numerus autem 546 eidem adscriptus, est ille qui quærebatur. Quod si datus Logarithmus accuratus in tabulis non occurrat, & tamen habeat characteristicam, quæ in illis contineatur; duos invenire licebit, quorum alter sit proximè major dato, alter proximè minor. Utrumque ex tabulis deprome cum numeris sibi respondentibus; & ex proximè majori aufer proximè minorem; deinde hunc ipsum aufer a dato, & numero, qui proximè minori respondet, adijce fractionem, cujus denominator sit primà illa differentia, numerator verò secunda, & sic habebis quæsitum numerum. Sic si proponatur Logarithmus 2.7375292, invenies in tabulis 2.7379873 proximè majorem, cui respondet numerus 547, & 2.7371926 proximè minorem, cui respondet 546. Aufer hunc & a proximè majori; & a dato Logarithmo, habebisque geminas differentias, 7947 & 3366, ex his fractionem compone adjiciendam numero 546, & habebis numerum quæsitum $546 - \frac{3366}{7947}$. Opera-

tionibus ratio est, quia numerorum differentia sunt differentias Logarithmorum quamproxime proportionales. Igitur ut 7947 (quæ est differentia Log. in tabulis existentium) ad 1 (quæ est differentia numerorum illis respondentium) ita 3366 (differentia Log. proximè mino-

ris a dato) ad differentiam, qua numerus dato Log. respondens excedit minorem numerum 546.

41. Fractio inventa facile revocatur ad decimales numeros dividendo numeratorem quot opus fuerit cyphris auctum per denominatorem, & contemptis tenuioribus minutis, si quotus accuratus haberi nequit. Sic in nostro casu fractio evadet 0. 4235, & numerus Log. dato respondens 546. 4235.

42. Si dati Logarithmi characteristica tabularum canonem excedit, jam primum constabit quot notas quaesitus numerus habere debeat, totidem nempe, quot characteristica unitates, ac praeterea unam. Ut autem inveniri possit ejus characteristica tot unitatibus multiplicanda est, quot opus fuerit, ut in tabulis possit inveniri. Logarithmus ita depressus inquiratur in canone & si accuratus occurrat, numerus ei respondens tot cyphris auctus, quot unitates e characteristica ademptae sunt, erit quaesita quantitas. Quod si accuratus non invenitur sumantur proxime major, & minor, & exinde, ut supra factum est, quaerantur notae decimales adjiciendae numero, qui logarithmo proxime minori responderet. Curandum est autem, ut totidem saltem per divisionem eliciantur, quot unitates a characteristica dati Logarithmi ademptae sunt. Nam si tot ejusmodi notae integro illi numero adjectae jam pro integris habeantur, habebitur simul quaesita quantitas. At si characteristica fuerit plus quam duplo major ea, quae in tabulis maxima occurrit, inventus numerus in ultimis notis accuratus non prodiret hac methodo ob rationem in re simili supra adductam.

43. Ex. gr. detur Logarithmus 5. 7375292, & tabulis utaris his elementis adjectis. Multiplicanda erit characteristica 3 unitatibus, ut fiat 2. 7375292. Inventus est supra hujus Logarithmi numerus 546. 4235. Tres ex his decimalibus notis ad integros redigantur, eritque quaesitus numerus 546423...5. Si datus Logarithmus fuisset 4. 7375292, numerus ei responderet 54642. 352. Si 3. 7375292; 5464. 235. Ac demum si datus Logarith-

A R I T H M E T I C A E. 101

arithmus idem fuisset accuratè ac Log. 546, fuisset quæ-
 sita quantitas 546000, & sic de reliquis. Operationis
 ratio facilè intelligitur, nam dum dati Logarithmi cha-
 racteristicam aliquot unitatibus imminuimus, perinde
 facimus ut si numerum ei respondentem per numerum
 divideremus unitate & totidem cyphris expressum quot
 sunt e characteristica sublatae unitates. Quantitas igitur
 huic depresso Logarithmo respondens in eundem nume-
 rum ducenda est, ut illa habeatur, quæ dato Logarith-
 mo responderet.

44. Si Logarithmus datus fuerit negativus, quærat
 positivi numerus, & hic unitati subscriptus fractionem
 dabit, quæ illi respondeat. Sic si detur -2.7371926 ,
 cum ei respondeat 546, erit quæsitæ quantitas $\frac{1}{546}$

45. Artificii hætenus expositi utilitatem numquam sa-
 tis Tyrones intelligent, nisi ubi se coperint in Trigono-
 metria exercere. Sed tamen vel ex hoc uno problema-
 te poterunt ex parte conjicere. Fœnori det aliquis dena
 aureorum millia, ita ut 100 aureorum annuus fructus
 tres aurei sint. Quæritur quot anni requirantur ut fors
 cum suis fructibus, & fructuum quotannis crescentium
 fructibus ad 40 aureorum millia perveniat. Dicatur 100
 $\equiv a$, 103 $\equiv b$, 10000 $\equiv c$, 40000 $\equiv d$, numerus an-
 norum quæsitus $\equiv x$. Erit in fine anni primi $a. b :: c.$

$\frac{bc}{a}$. Ineunte anno secundo fors est $\frac{bc}{a}$, & si fiat iterum $a.$

$b :: \frac{bc}{a} . \frac{b^2c}{a^2}$, hæc erit fors ineunte anno tertio, unde
 in ejus fine $a. b :: \frac{b^2c}{a^2} . \frac{b^3c}{a^3}$. Constat igitur, quod
 in fine annorum x , erit fors $\frac{b^xc}{a^x}$, & ex hypothesi esse

debet $\frac{b^xc}{a^x} \equiv d$. Igitur (per n. 24. 25.) $x \text{ Log. } b = x \text{ Log. } a + \text{Log. } d$

$c = x \text{ Log. } a \equiv \text{Log. } d$; & auferendo utrinque $\text{Log. } c$,
 erit $x \text{ Log. } b = x \text{ Log. } a \equiv \text{Log. } d - \text{Log. } c$, ac de-

Log. $d = \text{Log. } c$
 mum $x = \text{Log. } b - \text{Log. } a$. Substituē datos valores li-
 teris, & habebis $x = \text{Log. } 40000 - \text{Log. } 10000$

Log. 103 = Log. 100 : Log.
 40000 habetur, si colligas in unam summam Logarith-
 mos 40, & 1000, qui sunt ejus coefficientes; & Log.
 10000. si Log. 1000 unitate augeas in characteristica.
 Sic erutis ex tabulis Logarithmis, habebis $x =$
 $4.6020600 - 4.0000000 = 0.6020600 = 46.8. \&c.$
 $2.0128372 - 2.0000000 = 0.0128372$

Itaque anni requiruntur 46, 9 menses, ac præterea ali-
 quot dies, & unius diei partes in hujusmodi re contem-
 pendæ, ut fors ad datam quantitatem eo fœnore augea-
 tur.

46. Et hæc de progressionibus & Logarithmis satis
 dicta sint. Superest, ut aliquid etiam dicatur de propor-
 tione Harmonica.

C A P U T IV.

De proportionē Harmonica.

1. **S**I tres fuerint ejusmodi numeri, ut sit primus ad
 tertium in eadem proportionē geometrica, in qua
 est differentia primi & secundi ad differentiam secundi
 & tertii, hi numeri dicuntur harmonicē proportionales.
 Sic 2, 3, 6. sunt harmonicē proportionales, quia 2. 6
 $:: 3 - 2 = 1, 6 - 3 = 3$.

2. Si fuerint tres numeri harmonicē proportionales,
 factum ex medio in summam extremorum, æquale est
 duplo producto ex ipsis extremis. Sic in adducto exem-
 plo $(2 + 6) \times 3 = 2 \times (2 \times 6) = 24$. Facile demon-
 stratur, quia si fuerint a, b, c harmonicē proportio-
 nales, erit $a. c :: a - b. b - c$. Ergo multiplicando extre-
 mas & medias quantitates, erit $ab - ac = ac - cb$,
 & ad-

& addendo utrinque ac $\frac{1}{a} + \frac{1}{c}$ erit $ab + cb = 2ac$; hoc est $(a+c) \times b = 2ac$.

3. Hinc datis extremis terminis medius invenitur, si fiat ut summa extremorum ad eorum alteram, ita duplum alterius ad quæsitum. Sic $2 + 6.2 :: 2 \times 6.3$, hoc est $8.2 :: 12.3$. Ratio est manifesta, erit enim $a + ca :: 2cb$.

4. Dato quoque extremorum altero una cum medio alter extremus invenietur, si fiat ut differentia dupli extremi dati a medio ad ipsum extremum datum, ita medius ad quæsitum. Sic $2 \times 2 - 3.2 :: 3.6$. Cum sit enim $ab \times cb = 2ac$, si utrinque auferatur cb , habebitur $ab = 2ac - cb$, hoc est $2a - b. a :: b.c$.

5. Idem facilius obtinebitur opè alterius Theorematis vi cuius harmonica proportio ad continuam arithmetica redigitur. Proportio nempe harmonica est inversa ratio continuæ arithmeticæ, & contra. Hoc est si fuerint a, b, c harmonicè proportionales, erunt $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$

in continua arithmetica ratione, & contra. Sic in exemplo aducto $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$, hoc est, reducendo fractiones ad eundem denominatorem $\frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{2}{6} - \frac{1}{6}$ &

rursus cum sint $2, 4, 6$ in continua ratione arithmetica, erunt $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ harmonicè proportionales, cum sint $\frac{1}{2} : \frac{1}{6} :: \frac{1}{2} - \frac{1}{4} : \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$, sive $\frac{6}{12} :$

$\frac{2}{12} :: \frac{6}{12} - \frac{3}{12} : \frac{3}{12} - \frac{2}{12}$, hoc est $\frac{6}{12} : \frac{2}{12} :: \frac{3}{12} : \frac{1}{12}$. Facilis est demonstratio, cum sit enim primus terminus a , tertius c , erit medius $b = \frac{2ac}{a+c}$, ergo si per tres ejusmodi terminos unitas dividatur habebitur $\frac{1}{a},$

$\frac{a+c}{2ac}, \frac{1}{c}$, ubi si addantur extremi termini $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{c}{ac} + \frac{a}{ac} = \frac{a+c}{ac}$, quantitas habetur dupla ipsius $\frac{a+c}{2ac}$. Ergo tres

Ibi termini sunt arithmetice proportionales.

6. Quod si tres fuerint ejusmodi quantitates, in quibus differentia primæ & secundæ ad differentiam secundæ & tertiæ sit ut tertia ad primam: dicentur esse quantitates in proportionē Contraharmonica. Si erunt contraharmonicè proportionales a, b, c , si fuerit $a - b - c :: c. a$. Facile ad hanc proportionem transferentur quæcumque de Harmonica dicta sunt.





100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000


100-100000


100-100000


100-100000


100-100000

100-100000









ELEMENTA

SOLIDORUM.

1. **Q**Uædam, quæ admodum facile sine demonstrationibus intelliguntur, præmittimus, ut per se nota.

2. *Axioma* 1. Recta linea vel cum plano tota congruit, vel ipsi parallela est, quo casu æquidistat tota, vel ex altera parte ab ipso recedit, ex altera accedit, quo casu, si satis producat, ipsum in unico puncto secabit.

Coroll. 1.

3. Si bina rectæ puncta cum plano quodam congruant, congruit tota.

Coroll. 2.

4. Eiusdem rectæ pars in quodam plano, pars extra ipsum esse non potest.

Coroll. 3.

5. Binorum planorum intersectio est linea recta, cum recta ducta per bina quævis intersectionis puncta debeat jacere in utroque, per num. 3.

6. *Ax.* 2. Per quorvis puncta in directum jacentia, sive per quamvis rectam lineam infinita numero plana duci possunt.

7. *Ax.* 3. Per binas rectas sive concurrentes in aliquo puncto, sive parallelas inter se, ac per tria puncta non in directum jacentia, vel per tria cujusvis trianguli rectilinei latera planum semper duci potest, idque unicum.

8. *Ax.* 4. Bina plana vel parallela sunt, & semper æquidistant; vel ex una parte a se invicem recedunt, ex altera accedunt, & ex eadem satis producta debent se intersectare in recta quadam.

Coroll. 1.

9. Planorum inter se parallelorum intersectiones cum eodem plano sunt inter se parallelæ.

10. Cum enim plana illa parallela nusquam concurrant, illæ intersectiones nusquam concurrent.

Coroll. 2.

11. Binæ rectæ quæcumque GI , KM (Fig. 1.) a planis parallelis AB , CD , EF secantur in eadem ratione in H , & L .

12. Ducatur enim e puncto K recta parallela GI , occurrens planis CD , EF in N , O , & GK , HN , IO intersectiones planorum illorum parallelorum cum plano $GHOI$ erunt parallelæ inter se (per num. 9.), ut & NL , OM intersectiones plani OKM cum iisdem. Quare in parallelogrammis $KGHN$, $HNOI$ erunt latera KN , NO æqualia lateribus GH , HI . Est autem ob LN , MO parallelas KL ad LM , ut KN ad NO (pr. 12. Geom.); erit igitur etiam ut GH ad HI .

13. *Definitio 1.* Recta plano perpendicularis dicitur, cum est perpendicularis rectis omnibus in eodem plano ductis per concursum ejus rectæ cum ipso plano.

Coroll. 1.

14. Binæ rectæ, ut AC , BC (Fig. 2.) eidem plano in eodem puncto C ad eandem partem ductæ perpendiculares esse non possunt.

15. Si enim ducatur planum per ipsas, id occurret priori plano in quadrata recta DCE per num. 8. eritque tam angulus ACE , quam BCE rectus, nimirum totum æquale parti.

Coroll. 2.

16. Si bina plana fuerint eidem rectæ perpendicularia, erunt parallela inter se, & si binorum planorum parallelorum alteri perpendicularis sit quædam recta, erit & alteri.

17. Occurrat enim ea recta (Fig. 3.) binis iis planis in A , & B & ducta quavis recta CBD in posteriore, ducatur per hanc planum $CDEF$, cujus intersectio cum priore sit EAF . Tum si AB est perpendicularis utrique plano,

plano, anguli ad A & B erunt recti, adeoque ipsæ AE, BD parallelae (per cor. 1, def. 7. Geom.). Quare nulla recta posterioris plani occurret plano priori, & proinde plana ipsa nusquam concurrent. Si autem plana fuerint parallela, & recta AB perpendicularis priori, erit BD parallela AE per num. 9, adeoque AB, quæ continet angulos rectos cum AE, continebit etiam cum BD, eritque idcirco perpendicularis ad omnes rectas posterioris plani transeuntes per B, & proinde perpendicularis ipsi plano.

THEOREMA.

18. Si recta quædam AC (F. 4.) sit perpendicularis binis rectis BD, EF in quodam plano ductis per ejus concursum cum ipso plano, erit perpendicularis & reliquis omnibus, ac ipsi plano.

19. Ducatur enim quævis alia GCH, cui occurrat alicubi in G recta occurrens binis datis hinc inde in B, E, capisque CD, CF æqualibus ipsis, CB; CE, ducatur FD, occurrens ipsi GH alicubi in H, tum considerentur septem paria triangulorum æqualium.

20. BCE, DCF ob angulos ad verticem C æquales, & latera CF, CD æqualia lateribus CB, CE per constructionem.

21. BCA, DCA ob angulos ad C rectos ex hypothesis, latera CB, CD æqualia per constructionem, & latus CA commune.

22. ECA, FCA pariter ob angulos ad C rectos, latera CE, CF æqualia, CA commune.

23. BAE, DAF ob latera singula singulis demonstrata æqualia, nimirum BE, FD num. 20., AB, AD, num. 21., AE, AF num. 22.

24. BCG, DCH ob angulos ad verticem C æquales, CBG, CDH demonstratos æquales num. 20., latera CB, CD æqualia per constructionem.

25. ABG, ADH ob latera AB, AD demonstrata æqualia num. 21., BG, DH num. 24., angulos ABG, ADH num. 23.

26. ACG , ACH ob latera CG , CH demonstrata æqualia num. 24, AG , AH num. 25, & CA commune,

27. Quare & anguli ACG , ACH æquales erunt, & recta AC cuivis GH , adeoque toti plano perpendicularis. Q. E. D.

Coroll. 1.

28. Si e quodam puncto C . (F. 5.) cujusdam rectæ AC exeant tres rectæ CB , CD , CE ipsi perpendiculares, in eodem erunt plano.

29. Si enim ducto plano EH per binas CE , CD , tertia CB in eo plano non jaceat, ducto plano GC per ACB , quod priori occurreret in aliqua recta CF ; recta AC perpendicularis binis CD , CE erit perpendicularis & ipsi CF . Quare angulus ACF rectus erit, & æqualis recto ADB , pars toti.

Coroll. 2.

30. Si recta CA (F. 6.) semper perpendicularis rectæ quidam MN gyret circa ipsam immotam, producet planum ipsi perpendiculare.

31. Si enim ductis in ea superficie genita binis rectis ex C , ducatur quævis tertia, ea erit in eodem plano cum ipsis, cum nimirum omnes tres eidem MN perpendiculares esse debeant.

Coroll. 3.

32. Per datum quodvis punctum potest duci planum perpendiculare datæ cuivis rectæ MN .

33. Sit primo punctum datum C (Fig. 7.) in ipsa recta, & ductis per eam binis planis, MQ , MO ducantur in iis ipsi MN perpendiculares CA , CB , & planum per ACB ductum erit per num. 18. perpendiculare rectæ MN perpendiculari binis AC , BC .

34. Quod si punctum datum sit A extra ipsam, ducatur AC ipsi perpendicularis, tum in quovis alio plano MQ per MN ducto, & non transeunte per A recta CB perpendicularis eidem MN , & pariter erit factum.

Coroll. 4.

35. E binis rectis parallelis AB , CD (Fig. 8.) si altera sit perpendicularis plano cuiuspiam, erit & altera, & si ambæ fuerint perpendiculares, erunt parallelæ.

36. In plano enim DA ducto per ipsas AB, CD, quod plano dato occurrerit in recta AC, ducatur CB ad quodvis punctum B in priore assumptum, tum in plano dato recta CE perpendicularis CA, & æqualis AB, ac ducantur rectæ AE, BE.

37. Triangula CAB, ECA habentia angulos ad C, & A rectos, latus AC commune, latera AB, CE æqualia, habebunt & bases CB, AE æquales. Quare in tri, angulis BAE, ECB singula latera singulis æqualia, adeoque angulus BCB æqualis recto BAE (per prop. 4. Geom.). Cumque etiam ACE sit rectus, recta EC perpendicularis binis CA, CB erit perpendicularis etiam tertiæ CD per num. 18. Quare ipsa CD perpendicularis binis CA, CE erit pariter per num. 18. perpendicularis etiam toti plano dato ACEF.

38. Si autem ambæ fuerint perpendiculares, ducto plano BACD, erunt bini anguli BAC, ACD interni simul æquales duobus rectis, adeoque ipsæ parallelæ erunt. (per cor. 1. def. 7. Geom.)

Coroll. 5.

39. Rectæ FO, GQ (Fig. 7.) parallelæ eidem MN, licet non in eodem plano positæ, sunt parallelæ inter se.

40. Si enim per quodvis punctum D rectæ MN ducatur per num. 33. planum ACB ipsi perpendiculare, erit perpendicularis eidem tam FO, quam QG, per num. 35. Adeoque erunt inter se parallelæ per eund. num.

Coroll. 6.

41. Si binæ rectæ CD, CB (Fig. 9,) fuerint parallelæ, binis AE, AI etiam jacentibus non in eodem plano, continebunt angulos DCB, EBI ad easdem partes æquales.

42. Nam assumptis CB, CD ad arbitrium, tum AE, AI ipsis æqualibus, ducantur CA, DE, BI, & quoniam CB, AI sunt parallelæ, jacent in eodem plano per num. 7. Quare cum & æquales sint; etiam rectæ CA, BI, quæ illas claudunt, erunt & æquales & parallelæ,

parallelæ, & eodem argumento DE, CA parallelæ erunt, & æquales. Hinc & DB, EI, quæ illas claudunt, erunt æquales; & parallelæ. Igitur in triangulis DCB, EAI habentibus singula latera singulis æqualia, erunt anguli ad C & A æquales.

Coroll. 7.

43. Si bina plana IACB, EACD se invicem secantia in recta quadam AC secantur utrumque binis planis DCB, EAI parallelis inter se, anguli DCB, AEI ab intersectionibus contenti ad easdem partes erunt æquales.

44. Nam intersectiones CD, AE, & CB, AI singulorum planorum cum planis parallelis erunt inter se parallelæ per num. 9.

Coroll. 8.

45. Dato puncto vel extra datum planum, vel in ipso, poterit duci recta ipsi plano perpendicularis, eritque unica.

46. Si punctum sit A extra datum planum (Fig. 10.), ducta quavis recta MN in plano dato, ducatur ex A perpendiculum AB in ipsam: tum BC eidem MN perpendicularis in plano dato; in quam ex A ducatur perpendicularis AC, quæ erit perpendicularis plano dato.

47. Nam in primis erit per num. 18. MN perpendicularis plano AIBC cum sit perpendicularis rectis BA, BC. Quare si ducatur recta DCE parallela MBN, erit & ipsa perpendicularis eidem plano per num. 35.; adeoque etiam perpendicularis erit rectæ AC: Cumque ipsa AC sit etiam perpendicularis rectæ CB per constructionem, erit perpendicularis toti plano dato MNED per num. 18.

48. Quod si detur punctum B in ipso plano, assumatur punctum quodcunque A extra ipsum, & ducatur perpendicularis AC. Tum in plano BCAI ex B recta BI parallela rectæ CA, quæ pariter erit eidem plano perpendicularis per num. 35.

49. Si autem essent binæ rectæ ut AB, AC eidem plano perpendiculares ex eodem puncto A extra planum posito;

posito; anguli ABC , ACB in eodem triangulo ABC essent recti, quod est absurdum. Unica igitur ex eodem puncto extra planum assumpto duci potest. Unica vero duci posse e puncto posito intra planum patet ex num. 14.

Coroll. 9.

50. Per datum punctum, vel per datam rectam dato plano parallelam duci poterit planum plano ipsi parallelum.

51. Si enim datur punctum C (Fig. 9.), demissa CA perpendiculari in planum datum, ducantur in eo binæ AE , AI ad arbitrium, tum CB , CD iis parallelæ, & planum DCB erit parallelum plano dato.

52. Erit enim CA perpendicularis rectis AE , AI per num. 13.; adeoque & rectis CB , CD ; nimirum per n. 1. plano DCB , quod idcirco erit parallelum plano EAI per num. 16.

53. Si autem detur linea parallela plano dato, assumpto in ea quovis puncto C , & ducto per C plano parallelo dato; debet recta illa data jacere in hoc plano; si enim ex eo exiret, vel accederet ad planum datum, vel ab eo recederet.

Coroll. 10.

54. Si binæ rectæ CA , CB (Fig. 7.) coeuntes in quodam puncto C binis aliis DE , DH coeuntibus in D parallelæ sint; nec in eodem plano jaceant, planum per illas ductum erit parallelum plano ducto per has.

55. Nam e puncto C demisso perpendiculo CN in planum EI ; in quo jacent DE , DH ; ducantur NO , NQ parallelæ ipsis DE , DH ; quæ proinde erunt per n. 39. parallelæ etiam ipsis CA , CB , erunt autem per num. 13. anguli CNQ , CNO recti. Quare & NCB , NCA recti erunt, & proinde planum ACB perpendicularare rectæ CN per n. 18, cui cum perpendicularare sit ONQ , erunt ea plana inter se parallela per num. 10.

56. Def. 2. Angulum binorum planorum se in quadam recta interfecantium dico, inclinationem plani ad planum, quam metitur angulus rectilineus contentus

ab intersectionibus plani perpendicularis communi intersectioni eorundem planorum, qui si fuerit rectus, dico planum plano perpendiculare.

Coroll. 1.

57. Si in binis planis CI , AD (Fig. 9.) è quovis puncto C mutue intersectionis CA ducantur binæ rectæ CB , CD perpendiculares ipsi intersectioni, angulus rectilineus DCB erit mensura inclinationis planorum.

58. Erit enim per num. 18 planum BCD perpendiculare intersectioni CN perpendiculari ad binas CB , CD existentes in eo plano.

Coroll. 2.

59. Ad quamvis rectam cujusvis plani duci potest planum cum eo continens angulum æqualem dato.

60. Si enim sit recta CA plani $DCAE$, & ducatur in eodem plano CD ipsi perpendicularis, tum in plano perpendiculari ipsi rectæ CA recta CB continens angulum DCB æqualem dato, erit $BCAI$ quæsitum planum.

Coroll. 3.

61. Si planum plano insitit duos angulos efficit hinc inde simul æquales duobus rectis, & si bina plana se interfecant, angulos ad verticem oppositos æquales continent.

62. Idem accidit in rectis omnibus, adeoque etiam in illis, quæ sunt communes intersectiones eorum planorum cum plano perpendiculari ad communem illorum intersectionem.

Scholion.

63. Eodem pacto ubi planum incidit in bina plana parallela, habebuntur in eorum angulis illa omnia, quæ habentur in rectis lineis, ubi recta incidit in binas rectas parallelas.

Coroll. 4.

64. Planum transiens per rectam alteri plano perpendicularem est ipsi perpendiculare.

65. Si enim recta AC (Fig. 10.) perpendicularis plano

no EDMN, quod a plano ACBI per ipsam ductum feceretur in recta BC. Ducatur DE in plano DN perpendicularis ad BC, & quoniam ipsa BC est etiam perpendicularis rectæ CA, erit per num. 18. totum planum ACD ipsi perpendicularare; ac proinde angulus ACD erit mensura inclinationis planorum BD, CI per num. 56. qui cum sit rectus, erunt ea plana sibi invicem perpendiculararia.

Coroll. 5.

66. Si bina plana sibi invicem perpendiculararia fuerint, recta uni ex iis perpendicularis per intersectionem ducta jacebit in altero, recta intersectioni perpendicularis ducta in altero erit alteri perpendicularis, recta alteri perpendicularis ducta ex quovis alterius puncto jacebit in hoc posteriore, & in communem intersectionem cadet.

67. Sit enim primo communis intersectio BC, (Fig. 10.) & fecentur illa plana plano perpendiculari ipsi intersectioni, cujus plani intersectiones cum illis planis sint CA, CD. Erit CA perpendicularis ad CB per num. 13, & angulus ACD inclinatio planorum pariter rectus per num. 56. Quare CA erit perpendicularis plano DN per num. 18, ac proinde e quovis puncto intersectionis C educta recta ipsi plano DN perpendicularis debet per num. 14. congruere cum ipsa CA, jacente nimirum in plano BA.

68. Pariter cum CA sit perpendicularis plano DN, & intersectioni BC, ac jaceat in plano BA; quævis recta intersectioni perpendicularis ducta in plano BA ex quovis puncto A congruet cum CA, & proinde erit perpendicularis plano ND.

69. Denum recta ex quovis puncto A plani BA perpendicularis plano DN debet per num. 45. congruere cum AC, adeoque jacere in plano BA.

Coroll. 6.

70. Planorum eidem plano perpendicularium intersectio est ipsi perpendicularis.

71. Nam recta ipsi plano perpendicularis educta ex

quo ipsius puncto, in quo se intersectant illa bina plana, debet jacere in utroque ex ipsis per num. 66; ac proinde debet congruere cum communi eorum intersectione.

Coroll. 7.

72. Per quodvis punctum, vel quamvis rectam plano perpendicularem infinita plana duci possunt eidem plano perpendicularia.

73. Nam per quodvis datum punctum duci potest recta AC (Fig. 10.) perpendicularis dato plano per n. 45, in quo duci poterunt ex ejus puncto C infinitae rectae CB, & omnia plana ACBI transibunt per punctum datum, ac per rectam AC, & erunt perpendicularia plano dato per num. 64.

Coroll. 8.

74. Per bina puncta non jacentia in recta plano perpendiculari, vel per rectam ipsi non perpendicularem semper potest duci planum plano perpendiculare, idque unicum.

75. Sint ea puncta A, I (Fig. 10.) vel recta AI; ex altero eorum puncto A, vel e quovis puncto A rectae ejusdem duci poterit AC perpendicularis illi plano per num. 45, & planum ACBI transiens per ea puncta, vel per eam rectam erit perpendiculare plano dato per num. 64.

76. Quoniam autem recta AC perpendicularis plano dato, debet jacere in quovis plano ipsi perpendiculari transeunte per A per num. 66, ac unicum planum duci potest per puncta CAI non in directum jacentia per num. 7; unicum planum duci poterit dato plano perpendiculare transiens per puncta A, I, vel per rectam AI.

Coroll. 9.

77. Si recta non fuerit perpendicularis plano dato, & per eam dueatur planum ipsi plano perpendiculare, efficiet ipsa recta cum communi intersectione angulum bino acutum, inde obtusum, & ille erit minimus, hic maximus omnium angulorum, quos ea efficit cum rectis in plano dato ductis per ejus occursum cum ipso
pla-

plano, ac quo magis recta ex occurſu ducta recedet hinc inde a recta minimum continente, ac accedet ad rectam continentem maximum, eo majorem angulum continebit cum recta illa data, & ſemper bini, ſed bini tantum hinc inde æquales erunt, iique recti ſient, ubi recta in plano dato jacens fuerit illi interſectioni perpendicularis.

78. Sit enim ejuſmodi recta AB (Fig. 11.) : interſectio plani perpendicularis plano dato cum ipſo plano dato ſit DBE in quam cadet perpendicularum AC per n. 66, eritque angulus ACB rectus, ac proinde ABC acutus, & ABE obtuſus.

79. Centro B ſit in plano dato circulus DGEF : & quoniam quævis CG erit major, quam CD, & minor quam CB (quod facile dem. per Coroll. 2. prop. 8. Geom.), recta autem AC communis eſt triangulis retriangulis ACD, ACG, ACE, ac proinde quadrata AG, AD, AE ſingula æqualia quadratis ſingulis CG, CD, CE conjunctis cum quadrato AC, erit AG major quam AD, & minor quam AE. Quare in triangulis ABG, ABD, ABE habentibus laſus AB commune, latera BG, BD, BE æqualia, angulus ABG erit major quam ABD, & minor quam ABE (per Coroll. 3. prop. 8.); ac proinde ille minimus, hic maximus omnium, quos recta BA continere poteſt cum rectis in plano dato ex B ductis.

80. Cum vero quo magis punctum G recedit a D, & accedit ad E, eo magis creſcat CG, adeoque AG, & binæ ſemper, ſed binæ ſolæ hinc inde CG, CF, adeoque & AG, AF inter ſe æquales haberi poſſint, etiam quo magis BG recedet a BD, vel accedet ad BE, eo magis creſcet angulus ABG, & bini ſemper, ſed bini ſoli hinc inde ABG, ABF æquales erunt inter ſe.

81. Demum ſi HBI fuerit perpendicularis ad DE, erunt anguli CBH, CBI recti, & BH, BI æquales, adeoque æquales etiam CH, CI, & proinde etiam AH, AI, ac anguli ABH, ABI, qui proinde recti erunt.

De Angulis Solidis.

82. Hinc de angulis solidis agendum esset, quinimum continentur pluribus angulis planis in apicem unicum coeuntibus. Sed quoniam minus necessaria sunt, & potissimus eorum usus est ad figuras regulares solidas determinandas, ac describendas, quæ inde exiguæ sunt usus, ea hic innuimus tantummodo.

83. Angulus solidus facile concipitur, si ex omnibus angulis B, C, D, E (Fig. 12.) polygoni cujuscunque rectilinei ad quodvis punctum A positum extra ejus planum ducantur rectæ. Confurget in A angulus solidus constans tot angulis planis, quot sunt polygoni latera.

84. Cavendum tamen illud, ut in polygono omnes anguli ex parte interna computati sint minores duobus rectis, nimirum ut nusquam latera CB, EB (Fig. 14.) introrsum inflectantur versus polygonum respectu rectæ jungentis angulos contiguos; eo enim casu etiam facies anguli solidi introrsum inflecterentur, ac ejusmodi, anguli solidi considerari non solent, ubi eorum proprietates generaliter demonstrantur, ut & ejusmodi polygoni pariter considerari non solent.

85. Generaliter de angulis solidis hæc demonstrantur. Omnes anguli plani angulum solidum constituentes simul sumpti minores sunt quatuor rectis. Id facile intelligitur hoc pacto. Si angulus ille solidus apprimendo verticem A versus polygonum DCBE (Fig. 12. 15.) debeat complanari, oporteret aperiri aliquod latus, ut AD, & figura 12 abiret in 15, in qua omnes anguli plani circa A pertinentes ad priorem angulum solidum simul cum apertura nova DAD constituent quatuor rectos, adeoque omnes simul sunt quatuor rectis minores. Id vero Tyronibus ope anguli solidi e charta efformati admodum facile ostenditur.

86. Ad datum punctum datæ rectæ potest efformari angulus solidus æqualis dato. Si enim sit ad (Fig. 12. 13.) recta data fiat angulus dae æqualis DAC, tum pla-

planum cab faciens cum cad angulum æqualem illi, quem CAB continet cum CAD per num. 59, & in eo angulus cab æqualis CAB , & ita porro, donec deveniatur ad rectam ae respondentem AE proximæ primæ illi AD , & reliquus angulus planus cad reliquo EAD , ac totus angulus solidus a angulo solido A æqualis erit.

87. Paret enim ex ipsa constructione debere & plana planis, & rectas rectis congruere, si superponantur.

88. Ex quocumque autem angulis planis poterit semper angulus solidus constitui, dummodo & omnes simul minores sint quatuor rectis & quivis ex iis minor sit reliquis simul sumptis.

89. Si enim (Fig. 15.) ducantur utcumque binæ rectæ AD , AD æquales, tum incipiendo ab altera semper versus eandem plagam ducantur rectæ AE , AB , AC , quocumque, & in quibuscunque angulis, qui nimirum omnes simul quatuor rectos non adæquabunt, facile concipitur elevari posse punctum A , inclinando eorum plana ita, ut demum rectæ AD , AD coelegant, & exurgat angulus solidus, præter casum, quo aliquis ex angulis illis planis major esset reliquis omnibus simul sumptis, vel iis æqualis; nam reliqui omnes applicarentur illi uni ita, ut in primo casu, rectæ AD , AD ad se invicem non pertingerent, in secundo pertingerent tantum in ipsa applicatione reliquorum ad illum unum.

90. Et quidem si anguli plani essent tantum tres, unus ex iis angulus solidus componi posset, ut ex tribus rectis unicum triangulum componitur. Si enim essent tres ejusmodi anguli; CAB , BAE , EAD , & immoto BAE converterentur reliqui CAB , EAD circa rectas BA , EA ; rectæ AC , AD in unico situ sibi invicem occurrerent, & angulum solidum constituerent. At ubi plures sunt anguli, immoto uno, ut CAB possunt reliqui moveri nihil mutatis magnitudine angulis planis ad A , sed mutata eorum positione, sive inclinationibus plagorum in rectis AC , AB , AE ; AD prorsus ut in quavis

Figura rectilinea pluribus, quam tribus lateribus constante immoto uno latere, possunt moveri reliqua, nihil mutata eorum magnitudine, sed mutatis solum inclinationibus, sive angulis.

91. Porro hæc omnia Geometrico rigore demonstrari non possunt sine fusiore apparatu: admodum autem facile ostenduntur Tyronibus ope angulorum solidorum & charta efformatorum. Sunt & alia quædam circa ipsarum inclinationes planorum in angulo solido multo difficiliora demonstratu, ut illud, omnes angulos, quos plana angulorum planorum continent cum planis contiguis esse simul minores totidem rectis, quos exprimit duplex angulorum planorum numerus, sed ab ea mensura semper minus deficere, quam quatuor rectis. Id autem in Trigonometria spherica maximum usum habere potest. Nam ubi consideratur triangulum sphericum, revera consideratur angulus solidus ad centrum spheræ constitutus, cujus anguli plani sunt ipsa latera trianguli spherici, & inclinationes planorum sunt anguli ejusdem trianguli spherici. Ac proinde hinc consequitur, in quovis triangulo spherico tres angulos simul & minores esse sex rectis, & majores duobus, ut e superioribus illud deducitur semper in eodem bina latera simul superare tertium.

92. Dixi usum angulorum solidorum maximum esse pro figuris solidis regularibus/clusis faciebus planis, quæ dicuntur *poliedra* regularia, seu corpora regularia. Regularia autem dicuntur, quotiescumque & facies omnes æquales habent rectilineas, ac regulares. Ea non posse esse plura quam quinque, sic e superioribus deducitur. Quivis angulus solidus debet constare angulis planis, qui simul sint minores duobus rectis: non potest autem constare paucioribus quam tribus. Jam vero trianguli æquilateri angulus quivis continet gradus 60, quadrati 90, pentagoni 108, exagoni 120, reliquorum polygonorum majores sunt. Porro tres anguli exagoni jam continent gradus 360, adeoque non possunt constituere angulum solidum, & multo minus ipsum constituent anguli poli-

notum plura latera habentium. Tres anguli pentagoni continent gradus 324, & quatuor 432, quadrati autem tres 270, quatuor 360. Quare utrobique e tribus ejusmodi angulis planis angulus solidus constare potest, e quatuor non potest. Trianguli vero æquilateri 6 anguli continent 360, adeoque e sex ejus angulis componi non potest angulus solidus, potest autem e quinque, quatuor, vel tribus. Quare angulorum solidorum pro poliedris regularibus quinque tantum species esse possunt, eorum nimirum, qui constituuntur tribus angulis pentagonorum, quatuor quadratorum, tribus, vel quatuor, vel quinque triangulorum æquilaterorum.

93. Porro demonstrarunt Veteres, & Euclides id libro 13 persequitur, poliedrum regulare componi e pentagonis 12, e quadratis sex, quo casu est cubus, e triangulis quatuor, ubi terni in apicem coeunt, quo casu est pyramis, vel octo, ubi coeunt quatuor, vel 20, ubi coeunt quinque, & cuivis ex iis corporibus sphaera inscribi potest, quæ omnes ejus facies contingat, vel circumscribi, quæ per omnes ejus angulos transeat. Sed ea minoris sunt usus, & hic innuisse suffecerit.

94. Def. 3. Figura solida habens pro basi figuram rectilineam, e cujus singulis angulis extra ejus planum consurgant lineæ æquales, & parallele terminantes ejus faciem rectilineam dicitur *Prisma*, quæ basis si fuerit parallelogrammum, prisma dicitur Parallelepipedum, ac si omnes facies fuerint quadratæ dicitur Cubus. Si autem rectæ illæ in apicem coeunt, solidum dicitur *Pyramis*.

95. Prisma super basi pentagona ABCDE exhibet Fig. 16. pyramidem Fig. 18.

Coroll. I.

96. Quævis sectio prismatis, vel pyramidis facta plano pasi parallelo est figura prorsus similis basi, & in prismate æqualis, in pyramide habens latera homologa minora in ratione distantie ipsius a vertice ad distantiam basis ab eodem.

97. Sit enim ejusmodi sectio LPONM (Fig. 16.) & per

num. 9. singula ejus latera erunt parallela singulis lateribus basis, cum sint intersectiones planorum parallelorum cum iisdem planis. Quare & singuli anguli LPO, PON &c. erunt æquales singulis ABC, BCD &c. per num. 41.

98. Præterea in prisma facies LABP, PBCO &c. erunt parallelogramma, & proinde latera LP, PO &c. æqualia lateribus AB, BC &c. adeoque sectio LPONM prorsus æqualis basi ABCDE.

99. In pyramide vero (Fig. 18.) similia erunt triangula LFP, AFB, & LP ad AB, ut FL ad FA, vel ut FP ad FB, & ita reliqua omnia latera PO ON &c. ad BC, CD &c. erunt in ratione FP ad FB, FO ad FC &c. (per Pr. 12. Geom.) quæ erit semper eadem ratio, aut FP ad FB est eadem ac FL ad FA. Quare sectio LPONM erit similis basi ABCDE, & ratio laterum eadem, ac ratio distantiarum a vertice F.

Coroll. 2.

100. Prisma terminatur altera basi parallela opposita, ac æquali priori, & faciebus lateralibus parallelogrammis.

101. Si enim planum sectionis parallele basi concipiatur transire per extremum punctum F rectæ AF (Fig. 16, in quod abeat L, reliqua sectionis puncta BCDE habebunt in KING cum omnes BP, CO &c. æquales sint AL, & omnes BK, CI &c. æquales AF. Erit igitur figura FKHG æqualis ABCDE, & ipsi parallela, ac facies ABKF, BCIK &c. erunt parallelogramma.

Coroll. 3.

102. Prismatis, cujus latera rectilinea sunt basi perpendicularia, superficies demptis basibus est productum ex perimetro basis in unum e lateribus rectilineis: pyramidis autem habentis omnia latera rectilinea æqualia, & latera basis pariter æqualia est dimidium productum ex perimetro basis ducta in perpendicularum demissum e vertice in quodvis latus perimetri ipsius basis.

103. Nam in prisma (Fig. 16.) singule facies, ut GEDH, sunt in eo casu rectangula contenta sub singulis la-

lis lateribus basis ut ED, & singulis lateribus rectilineis ut EG. Adeoque summa omnium ejusmodi rectangulorum est tota perimenter basis ducta in ejusmodi latus rectilineum.

104. At in pyramide (Fig. 18.) si omnia latera basis sunt æqualia inter se, & latera rectilinea ipsius pyramidis pariter inter se æqualia, erunt omnes facies triangula isoscelia æqualia, & singulorum mensura erit dimidium productum ex latere AE basis ducto in suum perpendicularum FZ, quæ perpendiculara erunt omnia æqualia. Quare pariter summa omnium æquabitur dimidio productum ex tota perimetro basis, & unoquoque ex ejusmodi perpendicularis.

Coroll. 4.

105. Pyramidis ejusmodi truncatae plano parallelo basi, superficies reliqua versus basim æquatur productum ex semisumma perimetrorum basis, & sectionis ducta in distantiam perpendiculararem laterum parallelorum basis, & sectionis earumdem.

106. Si enim eadem FZ occurrat lateri LM in Y, trapezii ALME, mensura erit semisumma LM, AE ducta in YZ, cum nimirum resolvatur in bina triangula ALM, AME, quorum bases ML, AE, & altitudo communis YZ distantia perpendiculararis ipsarum basium parallelarum, adeoque singulorum triangulorum mensura sit dimidium productum ex singulis basibus, & ipsa YZ.

Coroll. 5.

107. Omnia prismata collata inter se, ut & omnes pyramides inter se collatae, si super basibus æquales areas habentibus, & inter eadem plana parallela constituantur, æqualia spacia solida comprehendunt.

108. Secentur enim planis quocunque parallelis basibus (Fig. 16., 17., 18., & 19.), & sectiones LPONM, QRSTV unius prismatis, vel pyramidis, æquales erunt semper sectionibus respondentibus *lpo*, *qrs* alterius. Nam in prismatico omnes erunt æquales eidem basi, in pyramide erunt ipsi similes, & singula latera respondentia

LP,

LP, lp erunt ad latera homologa AB, *ab* in ratione eadem, nimirum in ratione FL ad FA, & *fl* ad *fa*, quæ rationes erunt eadem per num. 11., cum puncta F, *f* terminentur ad planum parallelum plano basium & sectionis. Ea autem solida concipi possunt composita ex iis omnibus superficiebus, quarum singula cum singulis æquales sint, erunt & ipsa solida æqualia.

Scholion.

De methodo indivisibilium, & infinitesimali.

109. Hæc ratio demonstrandi dicitur methodus indivisibilium Cavalleriana, quam nimirum Cavalierius invenit primus, eaque cum successu est usus, concipiendo lineas compositas e punctis, superficies e lineis, solida e superficiebus. Revera linea producitur motu continuo puncti, superficies motu continuo lineæ, solidum motu continuo superficiæ, & linea e lineolis, non e punctis, superficies ex areolis, non e lineis, solidum ex spatio-
lis solidis, non e superficiebus componitur. Hinc fieri potest, ut hæc methodus aliquando in errorem inducat. Sic si bina rectangula FAEG, *fAEg* (Fig. 20.) non in eodem plano posita terminarentur ad binas rectas Ff, Gg perpendiculares plano prioris; rectangulum posterius esset longius priore in ratione rectæ Eg subtendentis angulum rectum EGg ad EG latus trianguli rectanguli, cum nimirum communis altitudo esset EA, & tamen sectiones LM, *lm* essent æquales eidem AE, adeoque & inter se.

110. Eam Guldinus difficultatem Cavalierio objecit, qui respondit: in hoc casu lineas, a quibus eæ superficies veluti contextuntur, esse utrobique æquales, sed tertium ipsum rariorem in secundo rectangulo. Si enim fiat secunda sectio QV *q* admodum proxima priori, bina fila QV, *qv* erunt æqualia inter se, sed *qv* ab *lm* remotius, quam QV ab LM. Suam autem methodum tunc solum procedere, cum præter æqualitatem sectionum, e quibus figura constare concipitur, etiam bina-
rum

in quarumque inter se proximarum distantie æquales
sunt.

111. Et quidem si methodus cum hac animadversio-
ne adhibeatur nunquam in errorem inducet, & in quam-
libet casibus ejus ope inveniuntur æqualitates, quæ
ante per longissimas ambages methodo a veteribus adhi-
ta inveniuntur. Ut methodi fundamentum pateat,
incipiantur parallelogrammata AG, ag (Fig. 21.) con-
tinua in eodem plano super basibus æqualibus AE, ae ,
& inter easdem parallelas. Eorum æqualitas hac metho-
do ostenditur ex eo, quod sectiones LM, lm, QV, qu
parallelæ basibus AE, ae æquales sint iis, & inter se,
& lineæ illæ in ipsis superficiebus parallelogrammorum æ-
que inter se distent, licet earum distantie VM, vm
computatæ in directione laterum non sint æquales, si
æ directiones diversæ fuerint, adeoque ipsorum late-
rum æqualitas non habeatur. Sed jam superficies $AFGE$,
ante non componentur ex lineis LM, lm , sed ex arco-
lis $LMVQ, lmvq$, quæ inter lineas continentur, ut &
solida AF, af in Fig. 18, 19 ex spatiolis solidis LS ,
inter superficies contentis non ex superficiebus $LMNOP$,
10, in quibus nimirum areolis, & spatiolis bases, &
& crassitudines æquales erunt, ac numerus idem.

112. Ex basi & crassitudine æquali ita inferitur eo-
rum elementorum æqualitas, ut demonstratio, qua to-
torum æqualitas evincitur rite procedat, dummodo cras-
situdino ipsa elementorum concipiatur infinitè parva. Si
enim sectio utriusque divisa concipiatur in infinitum
numerum particularum æqualium, & similium, æqualis
semper assumi poterit utrobique earamdem numerus ita,
ut ubi sectiones sunt rectæ lineæ, ut in Fig. 21, utra-
que sectio in ejusmodi particulas accuratè dividatur,
ubi vero ex sunt areæ, ut in 16, 17, 18, 19, conti-
nuata in infinitum divisione, infinitè parva spatiola hinc
inde in angulis remaneant. Tum erectis lineis perpendi-
cularibus ad sectionem alteram, usque ad oppositam in-
finitè proximam, habebitur utrobique infinitus numerus
particularum æqualium, & similium inter illas sectiones
inf.

infinite proximas contentarum, & solum circa margines, ut in Fig. 21. circa LQ, VM, lq, *um* deesse poterunt aliqua ob laterum obliquitatem. Sed numerus earum, quæ defunt, respectu reliquarum minuetur in infinitum, ubi in infinitum minuatur crassitudo, & sectiones oppositæ ad se invicem accedant in infinitum. Quare ubi illorum elementorum, nimirum spatiorum, quæ binis sectionibus infinite proximis continentur, æqualitas assumitur, contemnitur aliquid infinite parvum respectu ipsius summæ.

113. Quoties autem in comparandis binis quantitatibus finitis contemnendo aliqua, quæ respectu earum sunt infinite parva, invenitur æqualitas, toties verâ æqualitas haberi debet, nec ullus ne infinitesimus quidem error inde oriri potest. Finitæ enim quantitates sunt eæ, quæ in se determinatæ sunt; infinitæ parvæ quantitates sunt eæ, quæ concipiuntur minui ad arbitrium ultra quoscunque limites in se determinatos. Porro contemptus quantitarum infinitesimarum in comparatione quantitarum finitarum nullum errorem parere potest ne infinitesimum quidem. Nam si illæ finitæ quantitates essent inæquales, haberent differentiam aliquam in se determinatam. Quoniam autem illæ quantitates infinitesimæ possunt minui ultra quoscunque limites in se determinatos, poterunt simul omnes esse minores, quam illa differentia supposita, quam idcirco compensare non possent, nec posset ex illarum contemptu derivari æqualitas quantitatis illius in se determinatæ, nimirum compensatio differentiæ suppositæ.

114. Id exemplo sequenti fiet magis manifestum. Sit in bilance hinc inde bini lapides inclusi cum liquoribus quibusdam, qui liquores perpetuo debeant effluere, vel evaporari, donec penitus evanescant. Concipiamus nos nescire utrum lapidum pondera æqualia sint, utrum liquores illis pondus addant, an auferant, utrum æque effluant; scire tamen hæc duo: donec aliquid liquorum supererit, haberi debere æquilibrium, & liquores debere imminui ultra quoscunque limites in se determinatos.

cum

tum nimirum debeant penitus evanescere. Ex his binis veritatibus inferre licebit, lapides æqualis ponderis esse, liquores vel æque augere, vel æque minuere ipsorum pondera, & æqualiter effluere. Si enim ii lapides non æque ponderarent, esset aliqua in ipsorum ponderibus differentia in se determinata. Quoniam igitur liquores debent minui ultra quoscunque limites in se determinatos, aliquando simul omnes addent, vel auferent minus ponderi, quam sit illa differentia supposita. Igitur tunc illam differentiam compensare non possent nec æquilibrium haberetur, quod est contra hypothesim. Si igitur, donec adsunt liquores, æquilibrium habetur, & in infinitum imminuuntur, oportet lapides ipsi æquales sint. Quare cum ipsi lapides, & liquores simul æque ponderent; ipsi liquores æqualia pondera vel addunt, vel demunt, adeoque & æque effluunt.

115. Jam vero lapides illi referunt quantitates finitas, siue in se determinatas, liquores illi referunt quantitates infinitesimas, quibus contemptis, si finitæ quantitates æquales inveniuntur, reipsa debent esse accurate æquales, & infinitesimæ illæ quantitates, quæ contemnuntur debent se mutuo compensare. Nam nisi illa finitarum quantitatum æqualitas haberetur, contemptus ipsarum decrecentium ultra quoscunque limites, non posset compensare ipsarum differentiam tum, cum infra ipsam eam differentiam imminuerentur.

116. In casu nostro binæ quantitates finitæ sunt bina prismata, vel pyramides, quantitates infinitesimæ sunt summæ particularum illarum omnium, quæ ob laterum obliquitatem defunt in angulis singulorum stratorum binis sectionibus inter se infinite proximis contentorum, ubi eadem in similes, & æquales particulares resolvuntur ad eorum æqualitatem evincendam. Cum his neglectis illa solida inveniantur æqualia; oportet, ipsa omnino æqualia sint, nec ullus error habebitur. Quod autem de binis quantitatibus æqualibus dictum est, facile traducitur ad quantitates quamcunque rationem habentes ad se invicem. Nam si eam rationem accurate non habe-

habere, addendum esset aliquid in se determinatum alteri, vel demendum alteri, ut eam assequerentur. Quæ autem contemnuntur, cum decrefcere possint infra id, quod addendum, vel demendum esset, non possunt ejus defectum supplere, & eam rationem ostendere, quæ ex ipsorum contemptu derivatur.

117. Atque hoc scholio continetur fundamentum tam methodi Cavalierianæ, quam methodi infinitesimalis passim adhiberi solitæ, quarum utraque investigationi est aptissima, utraque demonstrationes mirum in modum contrahit, & secunda multo latius patet, quam prima, utraque autem passim adhiberi solet, & utramque jam adhibebimus ubi opus fuerit. In priore autem illud generaliter moneri potest, eam semper habere locum, ubi areæ in eodem plano positæ per eandem secantur rectas datæ rectæ parallelas, vel ubi solida quævis secantur planis eidem dato plano parallelis; ejusmodi enim areæ vel solida erunt semper; ut sectiones, si sectiones ipsæ dant aliquam rationem habuerint ad se invicem. Habebit autem locum etiam ubicumque sectiones parallelas inter se fuerint, & æque utrobique distantes, ac numero æquali tam in solidis, quam in areis, sed non in lineis. In methodo autem infinitesimali cavendum, ne contemnatur aliquid, quod non decrescat ultra quoscunque limites in se determinatos respectu ejus, respectu cujus contemnitur, quod si caveatur, nullus error usquam committi poterit.

118. Veteres multo longiore ambitu utebantur adhibentes methodum, quam exhaustionum vocant. Concludebant singulas e binis quantitatibus comparandis inter alias binas ad se invicem accedentes magis, quam pro quavis data differentia, ac demonstrabant æqualitatem quantitarum concludendum inter se, tum inferebant propositarum quantitarum æqualitatem pariter inter se, reducendo semper demonstrationem ad absurdum. Ejusmodi methodus eodem fundamento innititur, quo methodus infinitesimalis, sed multo est implicatior, & longior. Eam apud Euclidis commentatores Tyro videre potest.

poterit, si velit, & ubi aliquanto plus profecerit, apud veteres ipsos, Archimedes in primis. Sed de his jam satis.

Coroll. 6.

119. Pyramides basium æqualium in eundem apicem desinentes, vel utcumque eandem altitudinem habentes, sunt æquales.

120. Potest enim per communem verticem duci planum plano basium parallelum, eruntque super æqualibus basibus, & in iisdem planis parallelis; & pariter si bases collocentur in eodem plano vertices ad eandem partem siti in eadem altitudine terminabuntur ad idem planum basibus parallelum.

Coroll. 7.

121. Pyramis est tertia pars prismatis habentis æqualem basim & altitudinem.

122. Collocentur enim (Fig. 22.) bases in eodem plano, & vertices terminabuntur ad planum ipsi parallelum, ob altitudines æquales. Concipiatur autem in eodem illo basium plano triangulum ACB æquale areæ basium; ac in eadem altitudine prisma terminatum ad DFE ipsi æquale, & parallelum. Tum concipiatur secari ipsum prisma plano CDB, & orientur binæ pyramides habentes verticem in D, & altera habeat pro basi triangulum CAB, altera parallelogrammum CFEB. Si hæc secunda secetur iterum plano CDE in binas pyramides habentes eundem verticem D, & bases FCE, BEC æquales; hæc binæ pyramides erunt inter se æquales (per n. 119.) Earum autem prior considerari potest tanquam habens basim DFE & verticem C, quæ pariter (per n. 119.) æqualis esse debet primæ illi habenti pro basi triangulum ABC, & pro vertice D, cum bases ipsæ sint inter se æquales, & altitudines pariter æquales eidem illorum triangulorum distantia perpendiculari a se invicem, adeoque & inter se. Erit igitur prima illa pyramis pars prismatis tertia. Cumque datum prisma huic triangulari prismati æquale sit, ac data pyramis huic pyrami-

ramidi (per num . 107) ; etiam data pyramis erit pars tertia dati prismatis .

Coroll. 8.

123. Mensura cujusvis prismatis est productum ex basi in altitudinem , pyramidis autem ejus producti triens .

124. Si enim capiaturs basis ABCD (Fig. 24.) rectangula æqualis basi dati prismatis , vel datæ pyramidis , & ductis per ejus latera planis perpendicularibus ejus plano in eadem altitudine construatur prisma AG habens facies basi perpendiculares ; hoc erit æquale dato prismati , ac triplum datæ pyramidis . Si autem hujus latera AD , DC , & altitudo DF dividantur in particulas æquales quocumque , quarum numerus , si forte ea recte incommensurabiles fuerint , augeatur , & magnitudo minuatur in infinitum , ut ea , quæ supersunt , & contemnuntur infinitè parva evadant , concipianturque per singula divisionum puncta plana parallela faciebz parallelepipedis ipsius , habebuntur tot strata , quot particule fuerint in altitudine DF , & in singulis stratis tot ordines particularum solidarum , quot particule lineares fuerint in AD , & tot particule solide omnes æquales , & cubice , quot particule lineares in latere DC . Quare multiplicando AD per DC habetur numerus particularum solidarum cujusvis strati , qui est idem ac numerus particularum superficialium basis BD . Hunc autem numerum multiplicando per numerum particularum linearium altitudinis DF , habebitur numerus particularum omnium solidarum contentarum eo parallelepipedo . Igitur id parallelepipedum , adeoque datum prisma , vel triplum datæ pyramidis est productum ex basi in altitudinem .

125. Ex. gr. Si basis habeat latus AB duorum palmorum , AD quatuor , constabit superficies ABCD palmis quadratis bis quator , sive octo . Si autem altitudo DF fuerit palmorum trium , habebuntur tria strata cuborum palmarum alia supra alia , quorum singula continebunt octo . Quare totum prisma continebit cubos ejusmodi ter octo , sive viginti quatuor .

Coroll. 9.

126. Prismata omnia; si inter se comparantur, ad pyramides omnes inter se; erunt ut producta ex basibus, & altitudinibus: & si bases fuerint æquales, erunt ut solæ altitudines: si altitudines fuerint æquales, erunt ut solæ bases: si ea solida fuerint æqualia; altitudines erunt reciprocè proportionales basibus: si bases fuerint reciprocè proportionales altitudinibus, erunt æqualia: si bases fuerint similes, & altitudines proportionales lateribus homologis basium, erunt in triplicata ratione laterum homologorum, vel altitudinum.

127. Patent omnia ex regulis proportionum, & postremum hoc deducitur ex iisdem, ac ex 20, quod basium similium aræ sunt in ratione duplicata laterum homologorum (per Coroll. 2. proposit. 12. Geom.), quibus cum accedat ratio altitudinum, evadit triplicata.

Coroll. 10.

128. Similium solidorum superficies sunt in duplicata ratione laterum homologorum; ipsa autem solida in triplicata.

129. Similia enim dicuntur ea; quæ resolvî possunt in similes pyramides; quarum bases sunt in duplicata ratione laterum, quibus accedit ratio simplex ipsorum laterum, dum in altitudines ducuntur.

130. Def. 4. Cylindrus est figura solida inclusa superficie genita motu parallelo rectæ radentis circulum positæ extra ipsius planum: Conus verò, motu rectæ radentis circulum, & transeuntis per punctum quoddam positum pariter extra ipsius planum: utriusque basis dicitur ille circulus, axis ejusmodi secta per centrum ipsius ducta, latus recta, quæ radit circulum, vertex in eorundem punctum illud immobile; & si axis sit perpendicularis basi, dicitur cylindrus, vel conus rectus; si ille fuerit obliquus, hic etiam dicitur obliquus. Si autem basis fuerit quævis alia curva linea, solidum dicitur Cylindricum, vel Gonoidicum.

131. Fig. 23. exprimit cylindrum, 25 conum: basis

est circulus AaE , axis FC , latus in cylindro BA , vel ED , in cono FA , vel FE , conī vertex F .

Coroll. 1.

132. Si basis prismatis, vel pyramidis multiplicato in infinitum numero laterum, & imminuta magnitudine, abeat in curvam continuam, satis patet prisma abire in solidum cylindricum, pyramidem in conoidicum, & prisma, cujus latera sunt perpendicularia basi, in cylindrum rectum, pyramidem vero, cujus basis latera aequalia, & distantia a vertice aequales in conum rectum, cujus latus rectilineum quodvis erit perpendicularare perimetro basis.

133. Cetera facile patent: ubi vero in pyramide (Fig. 18.) polygonum $ABCDE$ circulo cuidam inscriptum sit, & multiplicatis in infinitum lateribus, polygonum abit in circulum, rectae FA , FE , abeunt in ipsum perpendiculum FZ .

Coroll. 2.

134. Quamobrem quaecumque dicta sunt de prismate & pyramide in Corollariis defin. 3, locum habebunt in quovis solido cylindrico, vel conoidico, ac ea, quae ad superficiei mensuram pertinent, habebunt locum in cylindro, & cono rectis tantummodo ita, ut superficies conī recti truncati sit semi-summa peripheriarum binarum basium ductarum in earundem distantiam.

Coroll. 3.

135. In cono obliquo (Fig. 25.) si demisso perpendiculo FD in basim, ducatur per D diameter ACE , jacente A ad partes oppositas C , angulus FCA , & recta FA erunt maximi omnium angulorum FCa , & rectorum Fa , angulus FCE , & recta FE minimi: ipse autem angulus FCa , & recta Fa erunt eo minores, quo magis recedent ab A , & accedent ad E , ac binī tantum hinc inde aequales erunt.

136. Quod pertinet ad angulos patet ex Cor. 9. def. 2. Quod vero pertinet ad rectam patet ex ipso angulo, & ex eo, quod FC sit constans, & Ca semper aequalis CA , vel CE .

137. *Def. 5.* Sphæra est solidum unica superficie comprehensum, ad quam omnes rectæ e centro ductæ æquales sunt, cujus diameter dicitur recta quævis per centrum ducta, & utrinque terminata ad superficiem: recta autem a centro ad superficiem ducta dicitur radius.

Coroll. 1.

138. Omnes sphæaræ diametri æquales sunt inter se.

139. Sunt enim æquales omnes radii, quorum binos continet quævis diameter.

Coroll. 2.

140. Si semicirculus circa suam diametrum gyret, generat sphæram habentem idem centrum, & eandem diametrum.

141. Omnes enim rectæ CF, CI, CH (Fig. 26.) ductæ a centro immoto semicirculi C ad quævis superficiæ puncta erunt æquales eidem CA, vel CB immotæ.

Coroll. 3.

142. Si sphæra secetur quovis plano, sectio erit circulus, qui erit omnium maximus, si sectionis planum transeat per centrum sphæaræ, quo casu habebit diametrum, & centrum commune cum diametro, & centro sphæaræ, ac deinde erit major, vel minor, prout planum sectionis magis, vel minus accedet ad centrum sphæaræ, vel recedet.

143. Sit enim sectio FHH, & ad ejus planum ducatur (per num. 46.) perpendicularis diameter ACB, quæ ipsi occurrat in E; ac si punctum E congruat cum ipso centro C, patet omnes EI fore radios sphæaræ. Si autem cadat extra, in triangulis CEI, CEF anguli ad E erunt recti, latus CE idem, basis CI æqualis CF. Quare & quodvis latus EI æquale erit cuivis EF (prop. 7. Geom.), adeoque in utroque casu sectio erit circulus, cujus centrum in E, quod in primo casu cadet in ipsum sphæaræ centrum C, circulo maximo habente centrum, adeoque & diametrum, commune cum centro, ac diametro sphæaræ.

144. Patet autem ob angulum ad E rectum, radianti circuli EF fore semper minorem radio sphaerae CF, nisi congruant abeunte E in C, quo casu æquantur, & quo minor fuerit distantia CE, eo major erit chorda HF, nimirum circuli diameter.

Coroll. 4.

145. Si concipiatur (Fig. 27.) cylindrus rectus KOLM circumscriptus sphaerae habens pro axe diametrum AB, pro basi circulum æqualem circulo sphaerae maximo, quem sectio ipsi sphaerae AB perpendicularis ducta per E secet in RN, superficies segmenti sphaerae HAF erit æqualis superficiei cylindri QNRK, & area totius sphaerae area totius cylindri demptis basibus.

146. Concipiatur enim quævis particula Ff peripheriæ circuli genitoris ita parva, ut infinite accedat ad rectam lineam, & producta Ff usque ad BA in G, generabit recta FfG superficiem coni recti, ut patet, ac Ff superficiem coni recti truncati cujus mensura (per num. 134.) erit ipsa Ff ducta in semisummam peripheriarum habentium pro radiis EF, ef, nimirum (ducto radio CO, qui ipsam Ff secet bifariam in O & ad angulos rectos per Cor. 4. prop. 5. Geom., & demisso perpendicularo OP) in circumferentiam habentem pro radio OP, quæ erit æqualis illi semisummæ; nam EF . fe :: FG . fG, & componendo EF + fe . fe :: FG + fG . fG, & cum sit 2OG = FG + fG, erit etiam $\frac{EF + fe}{2} . fe :: OG . fG$; est autem OG . fG :: OP .

$\frac{EF + fe}{2}$ fe, ergo OP = $\frac{EF + fe}{2}$ & cum peripheriæ sint ut

radii, erit peripheria ipsius OP æqualis semisummæ peripheriarum habentium radios EF & fe. Jam vero ob similia triangula rectangula Gof, GEF, GPO, OPC, erit Es = Nz . ff :: GE . GF :: GP . GO :: PO . CO = EN. (ut facile intelligitur ex Pr. 12. Geom., ejusque Coroll. 4.) ergo Nz x EN = ff x PO, atque adeo (cum peripheriæ sint ut radii) erit factum ex Nz

in peripheriam descriptam radio EN æquale factæ ex ff
in peripheriam descriptam radio PQ, Primum illud est
area genita ab Nn , hoc secundum est area genita ab
 ff . Quare tota area genita a toto arcu Aff æquatur
totæ area genitæ a recta QN, & abeunte REN in MBL
tota sphaeræ superficies superficiæ totius cylindri demptis
basibus.

Coroll. 5.

147. Superficies segmenti sphaerici HAF æquatur area
circuli habentis pro radio chordam AF, superficies to-
tius sphaeræ area circuli habenti pro radio diametrum
ipsius sphaeræ, quæ proinde erit quadrupla circuli sphae-
ræ maximi.

148. Est enim ut AE, sive QN ad AF, ita AF ad
AB, adeoque ita semiperipheria radio AF, ad semipe-
ripheriam radio AB, sive peripheriam radio CB, vel
EN. Quare productum ex QN & peripheria descripta
radio EN, sive area cylindrica QNRK, vel area seg-
menti sphaerici HAF æquatur producto ex AF in dimi-
diam circumferentiam radio pariter AF, sive area cir-
culi habentis ipsam AF pro radio, quæ AF, abeunte F
in B, evadit diameter AB, ac proinde area totius sphae-
ræ æquatur area circuli habentis pro radio diametrum
ipsius sphaeræ; quæ idcirco quadrupla est area circuli
habentis pro radio radium ipsius sphaeræ, nimirum area
circuli sphaeræ maximi.

Coroll. 6.

149. Sector sphaeræ CHAFC æquatur cono habenti
pro basi circulum radio AF, & pro altitudine radium
ipsius sphaeræ, & soliditas totius sphaeræ cono habenti
pro basi circulum quadruplum circuli sphaeræ maximi,
ac eandem altitudinem, cujus mensura erit area ejus-
dem circuli ducta in binos tridentes diametri.

150. Si enim superficies sphaeræ concipiatur resoluta
in particulas ita parvas, ut infinitè accedant ad super-
ficiem planam, & a singulis earum perimetri punctis ad
centrum sphaeræ tendant rectæ, habebuntur totidem py-
ramides, quarum bases erunt illæ particulae superficiæ

sphæricæ, & altitudo communis radius sphære. Quare omnium summa æquabitur pyramidi vel cono habenti basim æqualem toti illi superficiæ sphæricæ, & altitudinem eandem. Porro cum (per n. 147.) totius sphære superficies sit quadrupla circuli sphære maximi, & conus (per num. 134. & 123.) triens producti ex basi & altitudine; erit soliditas sphære equalis trienti producti ex quadruplo circuli maximi, & radio, vel trienti producti ex duplo ipso circulo, & diametro, sive binis trientibus producti ex circulo ipso, & diametro.

Coroll. 7.

151. Si concipiatur conus MAL habens pro basi pariter circulum sphære maximum, ut cylindrus QLMK; erunt conus, sphæra, cylindrus ad se invicem ut numeri 1, 2, 3, & superficies sphære, ad superficiem cylindri, inclusis basibus, pariter ut 2 ad 3.

152. Nam cylindrus æquatur producto ex basi sua, sive area circuli sphære maximi, & diametro AB (per nu. 134, & 123) sphæra binis ejus producti trientibus (per n. 149), conus unī trienti (per n. 134, & 123).

Coroll. 8.

153. Sphærarum superficies sunt in duplicata ratione radiorum, sphære autem ipsę in triplicata.

154. Nam arcę circulorum maximorum sunt in duplicata ratione radiorum, quibus accedit ratio ipsorum radiorum, cum pro habenda sphæra eę ducuntur in diametros, vel radios, ac sit triplicata.

Scholion 1.

155. Si Archimedæis numeris uti libeat pro ratione circumferentię circuli ad radium, erit sphæra ad cubum diametri, ut 21 ad 11. Erit enim quadratum radii ad aream circuli, ut 7 ad 22. Quare quadratum diametri ad aream circuli, ut 28 ad 22, vel ut 14 ad 11. Si primus ducatur in diametrum, & secundus in $\frac{2}{1}$ diametri, fiunt cubus, & sphæra, quę solidæ proinde erunt ut 14 ad $\frac{2}{3} \times 11$, sive ut 3 \times 7 ad 11, vel ut 21 ad 11.

156. Data quavis ratione diametri ad circumferentiam adhuc propiore rationi verę, semper habebitur facile mensura spherę; ut & corporum omnium mensurę pyramides redactę haberi poterunt ex iis, quę dictę sunt.


157. Mechanica eorum mensura haberi potest, si corpora ejusdem formę minora immittantur in vas aquę plenum, & capiatur mensura aquę effluentis.

Scholion 2.

158. Subjiciemus indicem propositionum libri 11, & Euclidis, quas fere omnes accuratę demonstravimus, nonnullę ex demonstratis sponte fluunt. Omisimus alias, quas Euclides in gratiam sequentium demonstrat.



| Euclidi
Lib. XI | Nobis | Euclidi
Lib. XI | Nobis |
|--------------------|--------|--------------------|-------|
| Pr. 1 | num. 4 | 28) | |
| 2 | 7 | 29) | |
| 3 | 5 | 30) | |
| 4 | 18 | 31) | |
| 5 | 28 | 32) | 126 |
| 6 | 35 | 33) | |
| 7 | 7 | 34) | |
| 8 | 35 | 35) | |
| 9 | 39 | 36) | |
| 10 | 41 | 37) | |
| 11) | | 38 | 66 |
| 12) | 45 | | |
| 13) | | Lib. XII | |
| 14 | 16 | 5) | 126 |
| 15 | 54 | 6) | |
| 16 | 9 | 7 | 122 |
| 17 | 11 | 8) | |
| 18 | 64 | 9) | 126 |
| 19 | 70 | | |
| 20 | 85 | 10) | |
| 21) | | 11) | |
| 22) | 88 | 12) | (134 |
| 23) | | 13) | (122 |
| 24 | 98 | 14) | |
| 25 | 126 | 15) | |
| 26 | 86 | 18 | 453 |





TRIGONOMETRIA.

Trigonometria dicitur ars resolvendi triangula. Nimirum in quovis triangulo habentur tria latera, & tres anguli, ex quibus si dentur fere semper reliqua tria inveniri possunt. Ea cum capiuntur, triangulum resolvi dicitur, ac ejusmodi investigationem Trigonometria docet, quæ triangulorum extensionem græco vocabulo exprimit.

Porro triangula considerari solent vel in plano a rectis constituta lineis, vel in sphaeræ superficie ab arcibus circularum ejusdem sphaeræ maximorum. Quæ illarum resolutionem docet Trigonometria, *plana* dicitur, hæc horum, *spherica*. Id autem præstat ope quarundam, quæ dicuntur *functiones* arcuum circuli, vel arcuum eisdem arcus habentium pro mensura.

3. Quamobrem hunc tractatum dividemus in partes
1. Prima ager de arcuum functionibus, & earum tabulis,
2. secunda de Triangulis planis, tertia de sphaericis.

P A R S P R I M A.

De arcuum functionibus, & earum tabulis.

§. I.

De natura, & proprietatibus functionum.

Definitiones.

4. **N**omine *functionis* arcus cujuscumque hic intelligimus sinum rectum, sinum versum, tangentem, secantem, cosinum, cotangentem, cosecantem, quæ singula sunt exponenda.

5. Si ex altero extremo arcus circularis ducatur perpendicularum in diametrum ductam per alterum extremum;

138 TRIGONOMETRIA.

num; hoc perpendicularum dicitur *sinus rectus* ejus arcus; & pars diametri intercepta inter illud extremum arcus, & ipsum sinum rectum, dicitur *sinus versus*: In Fig. 1. DE est sinus rectus arcus AD; AE est sinus versus ejusdem:

6. Si ex altero extremo arcus ducatur tangens, donec occurrat rectæ ductæ per alterum extremum, & per centrum, ipsa dicitur *tangens* ejusdem arcus: AF est tangens arcus AD; Af arcus Ad.

7. Illud segmentum rectæ ductæ per centrum, & alterum extremum arcus, quod interjacet inter centrum, & tangentem ductam per alterum extremum, dicitur *secans* ejusdem arcus. CF est secans arcus AD; Cf arcus Ad.

8. Id quod arci cuiquam deest ad complendum semicirculū, dicitur ejus *complementum ad semicirculū*, vel ad 180 gradus: ejus differentia a quadrante, sive ipsum excedat, sive ab ipso deficiat, dicitur absolute *complementum*, ac sinus, tangens, secans complementi arcus; dicitur ejus *cosinus*, *cotangens*, *cosecans*: DB est respectu AD complementum ad semicirculū, dB respectu Ad: GD; Gd sunt complementa AD, Ad: DH, dH sunt ipsorum cosinus: GI; Gi ipsorum cotangentes: CI; Ci ipsorum cosecantes, cum sint sinus tangentes secantes complementorum GD, Gd.

Coroll. 1.

9. Bini arcus, qui simul sumpti semicirculū complent, habent omnes functiones æquales.

10. Sine AD, Ad simul æquales semicirculo ADB: erit dB æqualis AD, ac proinde etiam complementum GD æquale Gd; eritque angulus DCd bifariam sectus per rectam CG (per Schol. def. 7. Geom.); adeoque (per pr. 3. Geom., & ejus Cor. 4.) chorda Dd sectabitur, & ad angulos rectos in H. Quare etiam cosinus DH, dH erunt æquales, & sinus DE, de æquales eidem CH (per Cor. 4. pr. 3. Geom.) erunt æquales inter se. Cumque angulus ACf sit æqualis dCe ad verticem opposito (per Cor. 4. def. 8. Geom.), adeoque

que angulo DCA, ob arcus dB , DA æquales; etiam in triangulis ACF, ACf erunt (per pr. 3. Geom.) æquales tangentes AF, Af, & secantes CF, Cf, ut pariteret ob æqualitatem angulorum GCI, GCi erunt æquales cotangentes GI, Gi, & cosecantes CI, Ci.

Coroll. 2.

11. Chorda dupli arcus est dupla sinus ejusdem.

12. Nam Dd chorda DGD est (per num. 10.) dupla DH sinus DG, ac arcus DGD est duplus arcus DG.

Coroll. 3.

13. Quadratum radii æquatur summæ quadratorum sinus, & cosinus arcus cujusvis, ac differentię quadratorum secantis, & tangentis. Quadratum vero secantis summæ quadratorum tangentis, & radii.

14. Nam ob angulum CHD rectum, est (per pr. 7. Geom.) $CD^2 = CH^2 + HD^2 = DE^2 + DH^2$, & ob angulum CAF rectum, $CA^2 = CF^2 - FA^2$, & $CF^2 = FA^2 + CA^2$.

Coroll. 4.

15. Idem quadratum radii æquatur rectangulo sub cosinu, & secante, ac rectangulo sub tangente, & cotangente.

16. Est enim (per prop. 12. Geom.^e) ob triangula CED, CAF similia, CE. CD :: CA. CF; adeoque (per pr. 13. Geom.) $CE \times CF = CA \times CD = CA^2$. Præterea cum sit angulus ICG æqualis (per Coroll. 1. def. 17. Geom.) alterno CFA; ac proinde similia triangula rectangula CAF, ICG; est AF. AC :: CG. GI, adeoque $AF \times GI = AC \times CG = CA^2$.

Coroll. 5.

17. Binorum arcuum quorumcunque tangentes sunt in ratione reciproca cotangentium.

18. Nam (per num. 15.) rectangulum sub tangente, & cotangente primi æquatur rectangulo sub tangente, & cotangente secundi; cum utrumque æquetur quadrato radii; ac proinde (per pr. 10. Geom.) illius tangens ad tangentem hujus est, ut cotangens hujus ad cotangentem illius.

Coroll. 6.

19. In quovis arcu est cosinus ad finum, ut radius ad tangentem, ac est sinus ad radium, ut tangens ad secantem.

20. Est enim CE, five DH. $ED :: CA. AF, \& ED, DC :: AF. FC.$

Coroll. 7.

21. Sinus versus arcus quadrante minoris est differentia radii a cosinu, & arcus majoris summa.

22. Nam $AE = AC - CE, \& Ae = AC + Ce.$

Coroll. 8.

23. Mutato utcumque radio functiones omnes arcuum similium, vel angulorum æqualium mutantur in eadem ratione, & inter se rationem constantem servant.

24. Nam figura 1, aucto utcumque, vel imminuto radio CA, erit semper sibi similis, & omnia triangula habebunt eodum angulos, quos prius; ac proinde ratio radii CA ad omnes alias lineas, & ratio earundem inter se, erit eadem ac prius.

Coroll. 9.

25. In quovis triangulo rectangulo si basis (cujus nimirum nomine in triangulis rectangulis solet intelligi latus recto angulo oppositum, quod etiam hypothenusa dicitur) habeatur pro radio, latera erunt sinus angulorum oppositorum, & cosinus adiacentium; ac si latus alterum habeatur pro radio, alterum latus erit tangens, basis vero secans anguli adjacentis illi primo lateri, & oppositi huic secundo, ac illud cotangens, hæc cosecans alterius anguli oppositi primo lateri, & adjacentis secundo.

26. Sit enim quodvis triangulum CED rectangulum in E, & concipiatur circulus radio CD. In eo erit DE sinus arcus DA, vel anguli DCA, adeoque cosinus arcus DG, & anguli DCG æqualis alterno CDE.

27. Sit vero quodvis triangulum CAF rectangulum in A, & concipiatur circulus radio CA. In eo erit latus AF tangens, basis CF secans arcus AD, vel anguli ACF adjacentis AC, & oppositi AF; adeoque illud cotan-

TRIGONOMETRIA: 241

tangens, hæc cosecans anguli DCG, nimirum anguli FA alteri, adeoque æqualis ipsi.

LEMMA GENERALE.

28. Binarum quantitatum semidifferentia addita semisumma efficit majorem, subtracta relinquit minorem: si semidifferentia sit major quam semisumma, altera quantitas negativa erit, quæ hic semper pro minori habetur, cum habeatur ut minor etiam nihilo.

29. Sint in fig. 2. binæ quantitates AD, DB. Secetur AB bifariam in C, sumaturque CE = CD, ut relinquatur AE = DB; eritque AC, vel CB semisumma, CD differentia, cujus dimidium CD additum semisumma AC exhibet majorem AD, at idem ablatum a semisumma CB relinquit minorem DB.

30. Si vero earum quantitatum altera sit Ad, & altera habita pro negativa Bd, summa negativæ & positivæ majorem minuit, adeoque erit AB summa, CB, vel CA semisumma, & facta Ae ex parte opposita Bd ipsi æquali, erit ad differentia, ejusque dimidium Cd majus ipsa semisumma CB. Adhuc tamen AC + Cd = Ad, & CB - Cd = - Bd, sive parti alteri negativæ.

THEOREMA.

31. In binis arcibus quibuscumque summa sinuum ad differentiam est, ut tangens semisummae eorundem arcuum ad tangentem semidifferentiæ, & summa cosinuum ad differentiam, ut cotangens semisummae ad tangentem semidifferentiæ.

32. Sint enim in fig. 3. binii arcus AD, DB, & secetur AB bifariam in E: erit AB summa eorum arcuum, AE semisumma, & (per num. 28.) DE semidifferentia. Ductis autem CD, CE, quibus AB occurrat in G, I, ac (per pt. 5. Geom., & ejus cor. 4.) secetur bifariam, & ad angulos rectos in I, erit AI semisumma, GI semidifferentia binarum AG, GB, ac tandem ducantur AP, BQ perpendiculares CD, quæ erunt sinus arcuum AD, DB.

33. Jam vero ob triangula similia AGP, BGQ, quæ præter angulos rectos in P, & Q, habent angulos in G ad

33. ad verticem oppositos equales, erunt ii sinus, ut AG, GB, adeoque eorum semisumma ad eorum semidifferentiam ut AD. Hauriunt semisumma ad semidifferentiam IG, At habendo CI pro radio, in triangulis CIG, CIA re-
 ctangulis sunt IG, IA tangentes angulorum ICG, ICA (per num. 25.). Sunt igitur etiam tangentes arcuum qui eos metiuntur, ut eodem recte IG, IA. Quare semisumma sinuum arcuum AD, DB, ad eorum semidifferentiam, adeoque & eorum summa ad differentiam erit, ut tangens AE semisumme ipsorum arcuum ad tangentem ED eorum semidifferentie.

34. Completa jam diametro ACK, secetur bisariam etiam KB in M, & capiatur MN = ED versus eandem plagam. Erit EM dimidium totius semicirculi, adeoque quadrans. Quare etiam DN erit quadrans, adeoque DB complementum BN: cumque relinquantur AD, NK equales alteri quadranti; erit AD complementum NK, & ipsorum BN, NK erit BM semisumma, BE, seu AE complementum semisumme, MN = ED semidifferentia.

35. Cum igitur summa sinuum arcuum AD, DB ad eorum differentiam sit, ut tangens eorum semisumme AE ad tangentem eorum semidifferentie ED; erit summa cosinuum binorum arcuum KN, NB ad eorum differentiam, ut cotangens eorum semisumme ad tangentem eorum semidifferentie.

Scholion.

36. Multa alia theorematum possunt facile demonstrari circa hasce arcuum functiones: sed hec ad usus, qui communiter occurrunt, abunde sunt. Ut autem ea ad usum deduci possint, ostendendum est, quo pacto diviso radio in quemlibet partium numerum invenire liceat, quot earum partium contineat quavis functio cujusvis arcus, saltem eorum omnium, qui constant gradibus, & minutis, ut in tabulas ordinentur, & ubi opus fuerit preesto sint.

37. Radius dividi potest in quocunque partes libuerit, plerumque autem assumitur unitas cum quopiam nume-

numero cyphrarum 0, ut 100000, 1000000, 10000000, vel alius aliquis ejusmodi numerus; ac si inventis functionibus pro aliquo majore radio, querantur eodem pro minore, habebuntur facile ope numeri 23. Sic si constructis tabulis pro radio 10000000, querantur pro radio 100000, satis est ex inventis functionibus rejicere postremas duas notas, & eas habere pro decimalibus; ita enim erit ille primus radius ad hunc novum, & illa prima functio ad hanc novam.

38. Ut habeantur ejusmodi tabule, satis erit eas construere usque ad 90 gradus; quoniam (per n. 9.) post gradus 90 eadem functiones redeunt. Porro inferius illud etiam ostendemus, quo pacto ordinande sint, ut complementa sibi e regione respondeant.

39. Interea notetur illud: evanescente in fig. 1. arcu AD, ubi punctum D congruat cum A, sinus rectus ED, & tangens AF evanescent; sed secans CF evadit equalis radio CA. Crescente arcu, crescant omnes tres, donec facto AD \perp 90°, ubi punctum D abit in G, sinus DE sit equalis radio CG. Quamobrem radius appellatur etiam *sinus totus*, nimirum sinus totius quadrantis: tangens vero AF, & secans CF evadunt infinite, cum fiant parallele, adeoque punctum F in infinitum recedat. Crescente vero arcu ita, ut quadrantem excedat, quemadmodum eum excedit Ad, quo magis ipse augebitur, eo magis decrescet ejus sinus de, tangens Af, secans Cf; donec illo abeunte in semicirculum, evanescat sinus, & tangens, ac secans fiat equalis radio.

40. Sinus autem versus AE, arcu evanescente, evanescit, crescente vero arcu, crescit, donec in arcu equali quadranti equetur radio, & in semicirculo fiat equalis diametro AB.

S. II.

De constructione tabularum.

41. **S**I describeretur circulus ita magnus; ut radius haberet palmorum 1000000; dividi posset in gradus, & minuta, ac ductis sinibus, tangentibus, & secantibus, liceret earum mensuras capere, & invento in singulis palmorum numero, tabulas ita construere. Sed id & mechanicum esset; & ferme factu impossibile, potissimum ob immanem posteriarum tangentium, ac secantium longitudinem. Computandæ sunt igitur ope Geometriæ; & Arithmeticæ ejusmodi functiones, quæ tamen ob quantitates radicales, in quas inciditur, accuratæ haberi non possunt; sed tantummodo veris proximæ quantum libuerit. Multæ methodi ad contrahendum calculi laborem inventæ sunt; verum cum ita multæ jam computatæ sint tabulæ, non id agitur; ut immani sanè, ac inutili jam prorsum labore iterum computentur, sed ut Tyroni innotescat; quæ ratione computari possint. Trademus igitur methodum, quæ & capta facillima sit, & scopum attingat, ac licet in praxi non omnium expeditissima, nec justo tamen sit operosior.

P R O B L E M.

42. Data tangente invenire secantem, & sinum.

43. Ex summa quadratorum radii, & tangentis extrahatur radix, & habebitur secans (per n. 13). Fiat ut secans ad tangentem, ita radius ad sinum quaesitum (per n. 19). Et erit factum.

P R O B L E M.

44. Datis tangentibus binorum arcuum non majorum quadrante invenire tangentem arcus medii arithmetice proportionalis.

45. Ex datis tangentibus inveniantur secantes (per num. 41.): tum fiat ut summa secantium ad secantem minorem, ita differentia tangentium, ad quantitatem, quæ

ut addita tangenti minori, exhibebit tangentem quæ-
tam.

46. Sint enim in fig. 4. arcus dati AB, AE, medius
Arithmetice proportionalis AD, tangentes datæ AF,
AH, quarum differentia erit HF, ac secantes inventæ
CF, CH, tangens vero quæsitæ sit AG. Ob arcum
AD = DE recta CG bifariam secat angulum FCH. Igi-
tur (per Cor. 4. pr. 12. Geom.) erit CH. CF :: GH.
CF. Quare componendo CH + CF, CF :: HF. FG.
Habetur autem AF + FC = AG.

Coroll. 1.

47. Si alter e binis arcubus esset = 0, abeunte B in
tangens AF, evanesceret, secans CF fieret æqualis ra-
dio, & AG ipsi FG. Quare problema mutaretur in hoc
aliud. *Data tangente arcus, invenire tangentem ejus di-
vidi, & solutio huc rediret: Inventa dati arcus secan-
te, fiat, ut summa radii, & secantis ad radium, ita tan-
gens data ad quæsitam.*

48. Si alter e binis arcubus fieret quadranti æqualis,
abeunte E in I, CH, FH abirent in infinitum, & ratio
summæ FC, CH ad FH abiret in rationem æqualitatis.
Quare etiam esset FC = FG. In eo igitur casu solutio
huc redit: *Secans arcus minoris addatur tangenti ejus-
dem, & invenietur quæsitæ tangens.* Porro ejusmodi so-
lutio pro eo casu sic etiam immediate demonstratur.
Angulus FGC æquatur alterno GCI, cum quo in eo
casu congruit GCH, cui æqualis est FCG. Quare in eo
casu FGC = FCG, & FC = FG.

Coroll. 3.

49. Si utrumque simul contingeret, altero arcu exi-
stente = 0, altero = 90; tangens AF arcus minoris
evanesceret, ac secans FC evaderet æqualis radio, adeo-
que ipsi radio æqualis etiam quæsitæ tangens, arcus ve-
ro ille medius arithmeticus evaderet = 45°. Quare so-
lutio problematis in eo casu huc redit: *Tangens arcus
45° æquatur radio.* Id autem etiam immediate constat.
Si enim angulus ACG est semirectus, erit (per pr. 1. Geom.)

K

femi-

semirectus etiam AGC ob angulum GAC rectum, adeoque triangulum CAG isoscele.

P R O B L. III.

50. Datis functionibus binorum arcuum, qui inter se parum admodum differant, invenire functionem cujuscumque intermediarii arcus dati veræ proximam.

51. Fiat ut differentia arcus minoris a majori, ad differentiam minoris ab intermedio, ita differentia datarum functionum ad quartum addendum functioni, quæ responder arcui minori, vel ab ea auferendum, prout crescentibus arcubus functio crescit vel decrescit, ut habeatur functio quæsitæ.

52. Exprimantur enim in Fig. 5. & 6. segmentis AB cuspidiam rectæ arcus, & rectis BF ipsi perpendicularibus tangentibus eorundem. Omnia puncta F erunt in quadam linea continua MN, quæ si curva sit, exigui arcus ejusdem haberi poterunt pro rectis lineis. Exprimantur jam bini arcus inter se proximi rectis AB, AC, intermedius recta AD, functiones autem datæ rectis BF, CE, quæsitæ functio recta DG, ac ipsas DG, CE secet in H, & I recta FI parallela BC. Habita FE pro recta linea erunt similia triangula EFI, GFH, eritque FI ad FH, sive BC ad BD, ut EI ad GH, nimirum differentiarum arcuum circuli ut differentiarum functionum. Porro GH erit addenda ipsi HD, vel FB in Fig. 5, de-menda ab eadem in Fig. 6, ut habeatur DG; quia ibi crescentibus arcubus functiones crescunt, hic decre-scunt.

Scholium

53. Hac methodo utimur in quovis tabularum genere, in quibus bina quantitatum genera a se invicem pendent, quarum nimirum exiguæ differentiarum habentur pro proportionalibus inter se, ac eadem usi sumus in arithmetica (cap. 3. num. 36.) ad eruendos logarithmos numerorum intermediarum inter integros a tabula exhibitos: ac eadem utemur infra ad eruendos arcus, ope functionum intermediarum inter eas, quas tabulæ exhibent; uti satis erit considerare functiones

ut expositas segmentis AB, arcus vero rectis BF.

54. Pertinet hæc methodus ad methodum generaliorē, quam interpolationis dicunt: Semper autem rite procedit; ubi quantitates assumuntur ita inter se proximæ, ut differentiæ sint inter se proportionales, quod ex ipsis tabulis; cognoscitur; & quidem admodum facile in iis tabulis, in quibus alterius generis quantitates æquæ se excedunt; ut in tabula logarithmorum numeri naturales. Tunc enim satis est assumere differentias quantitatum iis respondentium; & si binæ hujusmodi differentiæ sint inter se proximè æquales; invenietur pariter quæsitā quantitas proximè æqualis veræ: Differentia logarithmorum numeri 832; & 833 est 5217, numeri 833; & 834 est 5210 proximè æqualis priori, ac proinde multo propiores proportionalitati erunt differentiæ intermediæ inter ipsos numeros 832; 833.

55. Quod si plus æquo inæquales differentiæ deprehenderentur, tunc ad interpolationem non binæ tantum quantitates adhibendæ essent altera major, altera minor quæsitā, sed plures; lege quadam, quam alibi exponemus; nam ad usus trigonometricos, methodus tradita sufficit fere semper.

PROBL. IV.

56. Dato arcu quovis, qui quadrante sit minor, invenire ejus tangentem, secantem, sinum.

57. Arcus datus vel erit inter 0, & 45°; vel inter 45°; & 90°. Inveniat per Probl. 2, & ejus Corollaria tangens arcus medii arithmetice proportionalis inter eos; inter quos arcus datus jacet. Idem arcus datus jacebit inter hunc novum, & alterum e prioribus binis extremis. Habeantur igitur hi duo pro extremis, & inveniat tangens arcus medii arithmetice proportionalis inter ipsos, ac ita fiat semper; donec deveniat ad arcum datum, vel ad arcum dato proximū; quantum libet. Devenietur autem, quia differentia inter eos, qui assumuntur pro extremis & datum concludunt; semper duplo minor evadet, ac proinde continuata operatione minuetur ultra quoscunque limites.

58. Inventa tangente invenietur secans, & sinus (per
num. 42.

Scholium 1.

59. Methodus hic exposita inveniendi tangentem arcus dati est admodum similis methodo indicata Arithmeticae cap. 3 num. 31, inveniendi Logarithmum dati numeri. Potest autem hac methodo ope solius problematis secundi, nec ferius, quam par est inveniri tangens, utcumque veræ proxima: nam in prima operatione distabunt arcus extremi per 45° , in 2^a per 22° . $30'$, in 3 per $11'$. $15'$, in 4 per 5° . $37' \frac{1}{2}$ in 5 per 2° . $48'$. $\frac{3}{4}$ in 6 per 1° . $24'$. $\frac{3}{8}$ in 7 per $42' \frac{3}{16}$ & ita porro.

60. At ubi jam devenit ad binos arcus factis inter se proximis, potest plurimum contrahi labor ope Problematis tertii, inveniendo tangentem pro intermedio illo dato per differentias habitas pro proportionalibus, quod ipsum in Logarithmorum investigatione liceret. Licebit autem tuto, ubi differentiae extremarum a recens inventa in postrema operatione obvenerint inter se æquales.

61. Tacquetus in sua Trigonometria habet pro proportionalibus sinus arcus $45'$. Hac nostra methodo post sextam operationem institutam per propositionem 2, posset septima institui per prop. 3, cum extremorum differentia jam sit $42'$. $\frac{3}{16}$ tantummodo. Sed non solum pro radio = 10000000, sed etiam pro 100000, adhuc plus æquo inæquales sunt differentiae in tanto intervallo.

62. Plerumque pro radio 100000, instituendæ erunt 9 operationes pro radio vero 10000000, saltem 12. Notandum tamen, cum in singulis operationibus contemnantur minores fractiones, assumendas esse saltem binas præterea decimalium notas, ne error in postremis integrorum notis committatur.

63. Porro ut methodus exemplo illustretur, quaeratur tangens 27° . $43'$. In tabella sequenti operatio distincta

TRIGONOMETRIA: 749

acta est in 12 spatia, in quorum singulis habentur
 arcus cum tangentibus jam inventis, ac inter eos
 medius Arithmetice proportionalis cum sua, præter po-
 timum, in quo non medius Arithmetice proportiona-
 adeft, sed ipse arcus datus. Binæ decimales fractio-
 adhibitz ad inveniendos integros minus accuratæ
 ; integrorum notæ accuratissimæ.

| Arcus | Tangentes. | Arcus | Tangentes |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| L | | II. | |
| 0° 0'. | 00000000.00 | 45° 0'. | 10000000.00 |
| 1. 30. | 4142135.62 | 35. 45. | 6681786.37 |
| 0. 0. | 0. | 22. 30. | 4142135.62 |
| III. | | IV. | |
| 33. 45. | 6681786.37 | 28. $7\frac{1}{2}$ | 5345111.35 |
| 28. $7\frac{1}{2}$ | 5345111.35 | 25. $18\frac{3}{4}$ | 4729647.75 |
| 22. 30. | 4142135.62 | 22. 30. | 4142135.62 |
| V. | | VI. | |
| 28. $7\frac{1}{2}$ | 5345111.35 | 28. $7\frac{1}{2}$ | 5345111.35 |
| 26. $43\frac{1}{8}$ | 5033577.98 | 27. $25\frac{5}{16}$ | 5188352.84 |
| 25. $18\frac{3}{4}$ | 4729647.75 | 26. $43\frac{1}{8}$ | 5033577.98 |

750 TRIGONOMETRIA.

| Arcus | | Tangentes | | Arcus | | Tangentes | |
|-------|---------------------|------------|--|-------|---------------------|------------|--|
| VII. | | | | VIII. | | | |
| 28. | $7\frac{1}{2}$ | 5345111.35 | | 27. | $46\frac{13}{32}$ | 5266478.81 | |
| 27. | $46\frac{13}{32}$ | 6266478.81 | | 27. | $35\frac{55}{64}$ | 5227353.18 | |
| 27. | $25\frac{5}{16}$ | 5188352.84 | | 27. | $25\frac{5}{16}$ | 5188352.84 | |
| IX. | | | | X. | | | |
| 27. | $46\frac{13}{32}$ | 5266478.81 | | 27. | $46\frac{13}{32}$ | 5266478.81 | |
| 27. | $41\frac{17}{128}$ | 5246900.25 | | 27. | $43\frac{197}{256}$ | 5256685.58 | |
| 27. | $35\frac{55}{64}$ | 5227353.18 | | 27. | $41\frac{17}{128}$ | 5246900.25 | |
| XI. | | | | XII. | | | |
| 27. | $43\frac{197}{256}$ | 5256685.58 | | 27. | $43\frac{197}{256}$ | 5256685.58 | |
| 27. | $42\frac{231}{512}$ | 5251791.92 | | 27. | $43\frac{197}{256}$ | 5253829.13 | |
| 27. | $41\frac{17}{128}$ | 5246900.25 | | 27. | $42\frac{231}{512}$ | 5251791.92 | |

64. In computandis tabulis integris labor plurimum minueretur, cum operationes pro uno arcu institutæ, pro pluribus aliis usui esse debeant, ut patet. Quin immo inventis tangentibus, & secantibus arcuum minorum gradibus 45, admodum facile reliquorum omnium tangentes inveniuntur. Nam (per num. 15.) divisio quadrato radii per tangentem, habetur cotangens, & (per num. 48.) tangens arcus $45^\circ - \frac{1}{2}^\circ$, qui nimirum

TRIGONOMETRIA. 151

nistrum est medius arithmetice proportionalis inter 24, & 90°, est = tang. 24 — sec. 24; ac multa ejusmodi compendia haberi possunt.

Scholion 2.

65. Computatis sinibus, tangentibus, ac secantibus, possunt etiam earum functionum logarithmi computari methodo, exposita in Arithmetica (cap. 3. num. 31, & 38). Adfunt autem plures methodi computandi logarithmos functionum ipsarum immediate. Sed hic satis est indicare rationem aliquam, qua inveniri possint. Porro ipsos quoque earum functionum logarithmos appellabimus, in posterum pariter functiones.

P R O B L. V.

66. Functionum computatarum tabulas ordinare.

67. Tabula sex columnas contineat. In prima scribantur arcus, nimirum gradus, vel graduum minuta, in secunda sinus, in tertia tangentes, in quarta secantes iis respondentes, in quinta logarithmi sinuum, in sexta logarithmi tangentium. Porro arcus ipsi in pagina sinistra incipiant a 0, & descendendo perpetuo crescant, & in pagina dextra incipiant a 90°, & perpetuo crescant; & erit factum.

Coroll.

68. Civis arcui existenti in altera pagina respondebit e regione in altera ejus complementum, adeoque & cosinus, corangens &c.

69. Nam initio 90, & 0 quadrantem complent, ac deinde semper quantum in altera pagina additur, tantundem in altera detrahatur.

Scholion.

70. Logarithmi in tabulis aptari solent radio 10000000000; ut nimirum logarithmus radii, qui in calculis trigonometricis sapissime occurrit, sit 10. 00 &c., ac proinde facile & addi possit, & detrahi.

71. Secantium Logarithmi adscribi non solent, cum iidem admodum facile eruantur ex Logarithmis cosinum. Cum enim (per num. 15.) quadratum radii divisum per cosinum exhibeat secantem; satis erit e

K 4 duplo

duplo Logarithmo radii, five ex 20.000 &c. subtrahere Logarithmum cosinus.

72. Ut exempla deinceps aliqua dati possint, adjecimus ad calcem hujus tractatus binas tabulas alteram Logarithmorum numerorum naturalium usque ad 1000, alteram harum functionum pro solis gradibus, ex quibus per num. 50, & 51) inveniri poterunt etiam functiones pro minutis. Aptati autem sunt sinus, tangentes, secantes radio 100000. 00, Logarithmi autem Logarithmo radii 10. 000 &c., five radio continenti cyphas nullitatis decem.

§. III.

De usu tabularum

73. **U**sus tabularum, quem hic exponimus, reducitur ad bina Problemata, quorum altero ex datis arcubus querantur functiones, altero contra arcus e functionibus.

P R O B L. I.

74. Dato quovis arcu, eruere e tabulis functionem ipsi respondentem.

75. Si arcus datus non sit quadrante major, & solos gradus contineat; invenietur in prima columna paginae sinistrae, vel dextrae, prout fuerit minor vel major 45° , ac e regione ipsius in eadem pagina respondebit in secunda columna sinus, in tertia tangens &c., ac in altera pagina complementum cosinus, cotangens &c.

76. Si praeterea contineat minuta; inveniantur functiones arcus proximè majoris, & proximè minoris ac capiat eorum differentia: arcuum autem differentia erit 1° , vel $60'$. Fiar igitur ut $60'$ ad numerum minutorum, qui in arcu dato continentur supra numerum graduum, ita differentia functionum erunt e tabulis ad quartum, qui addatur functioni respondententi arcui minori, si queritur sinus, tangens &c., quae crescente arcu crescunt, vel demantur, si queritur cosinus, cotangens &c., quae illo crescente

ſcēntē contra decreſcunt ; & habebitur [quæſita functio (per num. 50. & 51).

77. Quod ſi arcu quadrantem excedat , ſubtrahatur à 180° , ac reſidui inveniatur functio , quæ erit functio arcus dati (per n. 9).

Scholion.

78. Hac methodo habebunt functiones etiam pro minutis ita accuratæ , ut nullus in minutis ipsis committatur error , prorsus ut in vulgaribus tabulis continentibus gradus , & minuta eadem prorsus methodo eruuntur pro minutis secundis , sine ullo in ipsis secundis errore , atque id ubique præter arcus quadranti nimis proximos , in quibus differentia multo magis inæquales sunt , & error committitur aliquanto major .

79. Et quidem in sinibus , tangentibus , ac ſecantibus plerumque vix ullus , vel admodum exiguus aderit error in nota integrarum poſtrema ; at decimales illæ fractiones hand accuratæ proveniunt ; quas idcirco in ſequentibus exemplis omitemus , vel pro unitate computabimus : ut etiam in Logarithmis rejiciemus poſtremas binas notas , quæ a veris abluderent . In vulgaribus tabulis , ſi arcus non ſint nimis proximi quadranti , aſſumpto radio cum ſeptem cyphris 0 , omnes pro minutis etiam ſecundis accuratæ obveniunt .

80. At ſublimiore illa interpolationis methodo , de qua mentionem fecimus num. 55 , ternis adhibitis functionibus , vel quaternis , poſſunt haberi accuratæ etiam pro minutis , & ſecundis , omnes harum quoque tabularum functiones . Sed ea ſublimior eſt , quam ut hic proponenda videatur . Præbebitur igitur exemplum methodi expoſitæ num. 75 .

81. Detur arcus 27° . 43' , & quæratür tangens . In tabulis tangens 28° = 53171 . , tang. 27° = 50953 , quarum differentia 2218 . Fiat igitur ut 60 ad 43 , ita 2218 , ad quartum : prodiit 1590 , quo addito tangenti 50953 , habebitur tangens quæſita 52543 . Porro eam num. 63 invenimus 5253829 , pro radio 10000000 , adeoque 52538 . pro radio 100000 . , quæ ab hîc inventa

venta differt per 5. Cum veto differentia debita minis 60 inventa sit 2218, adeoque uni minuto 37; hinc 5 particularum errore, ne septima quidem partibus minuti error committitur.

P R O B L. II.

82. Data functione invenire arcum, cui responder

83. Si functio data inveniat in tabulis; invenietur etiam arcus ipsi e regione respondens. Si vero ea in tabulis non habeatur; inveniat in iisdem functio proxime minor, & proxime major, ac fiat ut harum differentia ad differentiam proxime minoris a proposita, in 60' ad numerum minutorum addendum arcui respondentis functioni minori, si ea sit sinus, tangens &c., de mendum ab eo si sit cosinus, cotangens &c. Porro tantus arcus ita inventus erit is, qui habebit functionem illam datam (per num. 53), quam is qui proveniet eo ablatus 90° (per n. 9).

Scholion.

84. Detur Logarithmus tangentis 9. 87343, & quærat arcus. In tabulis logarithmus tangentis proxime major, omissis postremis binis notis, est graduum 30 = 9. 87711, proxime minor graduum 36 = 9. 86126. Differentia secundi a primo est 1585, secundi a proposito 1217. Fiat igitur ut 1585 ad 1210, ita 60 ad quartum, & prodit 46' omissis fractionibus. Arcus igitur quæsitus est 36°. 46'.

TRIGONOMETRIA. 155

PARS SECUNDA.

De resolutione triangulorum planorum.

§. I.

De Triangulis reſtanguſis.

85. PRO resolutione triangulorum reſtangularum adhibebimus ſequentes tres canones, quos ubi demonſtraverimus, proponemus unicum problema, quo omnes caſus triangulorum reſtangularum complectemur, ac ſingulis caſibus apponemus exempla, pro quibus eruemus e tabulis hic adjectis functiones ex arcubus, & arcus e functionibus, licet functiones ita erutæ non nihil discrepabunt a veris, ita tamen, ut nec in angulis error minuti primi, nec in baſibus error integre partis occurrat.

86. I. *In triangulo reſtanguſo angulorum obliquorum alter eſt complementum alterius; ac proinde dato altero datur etiam alter.*

87. Patet ex prop. 1. Geom.

88. II. *Baſis ad latus eſt ut radius ad ſinum angulæ oppoſiti ipſi lateri, vel ut ſecans angulæ ipſi adjacentis, ad radium, vel ut ſecans angulæ ipſi oppoſiti ad ejus tangentem.*

89. Patet ex num. 29, ſi habeatur pro radio prius baſis, tum ipſum latus, ac demum latus alterum.

90. III. *Alterum latus eſt ad alterum, ut radius ad tangentem angulæ adjacentis primo, vel ut tangens angulæ ipſi oppoſiti ad radium, vel ut ſinus angulæ ipſi oppoſiti, ad ſinum adjacentis.*

91. Patet ex eodem numero, habendo pro radio prius primum latus, tum latus ſecundum, ac demum baſim.

P R O B L E M A.

92. *Datis in triangulo reſtanguſo plano præter angulum*

gulum rectum binis aliis ad ipsum triangulum, pertinentibus, reliqua invenire.

93. *Casus 1.* Si dentur bini anguli, perinde erit, ac si daretur unicus; cum alter innotescat per canon. I. in eo casu solum habebitur ratio, quæ intercedit inter latera, & basim, ope canon. II, & III. ex gr: sumpto radio, & binis angulorum finibus, ii per can. II. expriment rationem, quæ intercedit inter basim, & latera ipsis angulis opposita.

94. Sint in fig. 7. $A = 57^\circ$ erit $C = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$; eruntque AC; BC, AB, ut 100000. 00.83867. 06, 54463.49.

95. *Casus 2.* Detur basis, & alter angulus. Invenietur angulus alter per canon. I., latus oppositum utrilibet angulo per can. II, adhibita quavis ex tribus proportionibus ejusdem canonis.

96. Sit $AC = 875$, $A = 57^\circ$ erit $C = 33^\circ$. Fiet autem ut radius 100000 ad sin. $A = \sin. 57^\circ = 83867$, ita $AC = 875$ ad $BC = 733.8$ &c., sive 734.

97. Quod si habeantur Logarithmi, facilius invenietur summamdo Logarithmum sinus $57^\circ = 9.92359$, ac Log. $AC = \text{Log. } 875. = 2.94201$, & demendo Logarithmum radii $= 10.00000$. Erit nimirum Log. $BC = 9.92359 - 2.94201 - 10.00000 = 2.86560$, cui Logarithmo numerus proximus in tabulis est 734.

98. *Casus 3.* Detur basis, & alterum latus. Invenietur alter angulus per can. II. adhibita altera, e prioribus bins proportionibus. Hinc alter angulus innotescet per can. I, ac deinde latus alterum, adhibita quavis e tribus proportionibus, sive canonis II., sive III.

99. Sit $AC = 627$, $AB = 356$. Erit per can. II, Log. sin. $C = \text{Log. } AB - \text{Log. radii} - \text{Log. } AC = \text{Log. } 356 - \text{Log. radii} - \text{Log. } 627 = 2.55145 - 10.00000 - 2.79727 = 9.75418$. Adeoque $C = 34^\circ. 36'$, qui nimirum angulus invenitur per num. 83. Hinc angulus $A = 90^\circ - 34^\circ. 36' = 55^\circ. 24'$ per can. I, & Log. $BC = \text{Log. sin. } A - \text{Log. } AC - \text{Log. rad.} = 9.91544 - 2.79727 - 10.00000 = 2.71271$, adeoque $BC = 516$. 100.

100. *Casus* 4. Dentur bina latera. Invenietur alter angulus ope utriuslibet e binis prioribus proportionibus canonis III. tum alter angulus per can. I, ac demum basis per quamvis e tribus proportionibus canonis II.

101. Sit $AB = 476$, $BC = 595$, erit per can. III $\text{Log. tang. } A = \text{Log. } BC + \text{Log. rad.} - \text{Log. } AB = \text{Log. } 595 + \text{Log. rad.} - \text{Log. } 476 = 2.77452 + 10.00000 - 2.67761 = 10.09691$. Adeoque $A = 51^\circ 20'$. Quare, per can. I, $B = 38^\circ 40'$, &, per can. II, $\text{Log. } AC = \text{Log. } BC + \text{Log. rad.} - \text{Log. sin. } A = \text{Log. } 595 + \text{Log. rad.} - \text{Log. sin. } 51^\circ 20' = 2.77452 + 10.00000 - 9.89251 = 2.88201$, adeoque $AC = 762$.

Scholion.

102. Sic omnes reſtangularum ſolvuntur caſus. In caſu quarto, poteſt etiam ſine Trigonometria obtineri baſis AC, extrahendo radicem e ſumma quadratorum laterum, & in caſu tertio latus BC extrahendo radicem ex differentia quadrati baſis AC, & quadrati lateris AB. Nimirum ibi eſt $AC = \sqrt{(226576 + 354025)} = \sqrt{580601} = 762$, hic $BC = \sqrt{(393129 - 126736)} = \sqrt{266393} = 516$. Immo quia facile deducitur ex demonſtratione corol. 2. pr. 13. Geom. differentiam quadratorum binarum quantitatum quarumcumque æquari producto ex earum ſumma & differentia, facilius eruetur latus, ducendo in ſe invicem ſummam baſis, & lateris dati, ac differentiam, & extrahendo radicem, quo pacto & Logarithmi adhiberi poſſunt. Sic in ipſo caſu tertio cum ſit $AC + AB = 983$, $AC - AB = 271$; erit $BC = \sqrt{271 \times 983} = \sqrt{266393} = 516$, & $\text{Log. } BC = \frac{1}{2} (\text{Log. } 271 + \text{Log. } 983) = \frac{1}{2} (2.43297 + 2.99255) = \frac{1}{2} \times 5.42552 = 2.71276$, adeoque $BC = 516$, ut prius.

103. Superſt monendum tantummodo in caſu 3, ſi baſis non fuerit major latere, caſum fore impoſſibilem, ut patet ex eo, quod baſis debeat habere quadratum æquale

quale summæ quadratorum laterum. Sed id ipsum calculus quoque indicaret. Nam si assumeretur basis AC æqualis lateri AB; sinus anguli C obveniret æqualis radio, & proinde angulus ipse rectus; ac angulus A nullus. Si autem assumeretur basis minor latere; sinus ille prodiret radio major; quod est absurdum.

§. II.

De triangulis obliquangulis.

104. **T**Res alii canones exhibebunt solutionem triangulorum obliquangulorum. At primum in quovis triangulo obliquangulo ACB (fig. 8, & 9) habito quovis latere, ut AB, pro basi; concipiatur demissum ab angulo ipsi opposito C perpendicularum CI in ipsum latus, quod cadet intra basim, si uterque angulus ad basim acutus fuerit, ut in fig. 8; & extra ipsam, si alter fuerit obtusus, ut in fig. 9.

105. Binas rectas AI, BI dicimus segmenta basis etiam in casu figuræ 9, in quo I cadit extra basim ad partes B; quo casu segmentum BI consideramus, ut negativum. Quamobrem si sumatur ID æqualis, & opposita BI; in utroque casu dicimus AB summam; AD differentiam ipsorum segmentorum; quæ differentia in casu figuræ 9 erit major quam summa. Segmentum AI dicimus adiacens lateri AC; & angulo A; ac oppositum lateri BC; & angulo C; contra vero segmentum BI adiacens his, oppositum illis.

106. Patet vero hoc Theorema. *Segmentum majus lateri majori adjacet.* Quadratum enim segmenti cum quadrato perpendiculari CI utrobique communi æquatur quadrato lateris adiacentis; ob angulos ad I rectos. En autem ipsos canones.

107. IV. *In quovis triangulo latera sunt; ut sinus angulorum oppositorum:*

108. Nam in triangulo rectangulo AIC, per cant. II., est AC ad IC, ut radius ad sinum anguli CAI, vel CAB,

CAB, ac in triangulo BIC est IC ad BC, ut sinus anguli CBI, qui etiam in fig. 9. est idem ac sinus CBA (per num. 9.) ad radium. Quare ex æqualitate perturbata est (per num. 21, cap. 2. Arith.) latus AC ad latus BC, ut sinus anguli CBA oppositi primo ad sinum CAB oppositi secundo.

109. V. *In quovis triangulo summa binorum laterum ad differentiam est, ut tangens semisumme angulorum ad basim, quæ æquatur complemento dimidii anguli lateribus intercepti, ad tangentem semidifferentiæ.*

110. Cum enim sint ea latera, ut sinus angulorum oppositorum; erit eorum summa ad differentiam, ut summa eorum sinuum ad differentiam, nimirum (per num. 31) ut tangens semisumme eorum angulorum, ad tangentem semidifferentiæ. Cum vero omnes simul anguli conficiant 180° , binorum dimidium, cum dimidio tertii continent 90° ; ac proinde binorum semisumma, est complementum dimidii tertii.

111. VI. *In quovis triangulo summa segmentorum basis, sive basis ipsa est ad summam laterum, ut horum differentia ad differentiam illorum.*

112. Nam ob $DI = BI$, & CI communem triangulis rectangulis CID, CIB, erit (per pr. 2. Geom.) etiam $CD = CB$. Quare circulus centro C, & radio CB descriptus transibit per D. Secabit autem AC productam, quantum opus fuerit, in E versus A, & in F ad partes oppositas, eritque AF summa, AE differentia laterum AC, CB, ac erit AB, AE :: AF, AD (per pr. 13. & 10. Geom.)

PROBLEMA.

113. Tribus datis in triangulo obliquangulo, reliqua invenire.

114. *Casus 1.* Si dentur tres anguli; perinde erit, ac si dentur bini tantum; tertius enim invenitur, si eorum summa auferatur a 180 . Porro in eo casu solum invenitur ratio laterum, quæ per can. IV est eadem, ac ratio sinuum angulorum oppositorum.

115. *Casus 2.* Dentur bini anguli, & unum latus.

Ter-

Tertius angulus invenitur per num. 114. Tum utrumvis e reliquis lateribus invenitur per can. IV, si fiat, ut sinus anguli oppositi lateri dato ad sinum anguli oppositi lateri quæsito, ita latus datum ad quæsitum.

116. *Casus 3.* Dentur bina latera cum angulo alteri eorum opposito. Invenietur per can. IV, sinus anguli oppositi alteri lateri dato, factis ut primum illud latus ad hoc secundum, ita sinus anguli dati ad sinum anguli quæsitum. Invento sinu, eruentur e tabulis (per num. 83) bini anguli ipsi respondentes, alter acutus alter obtusus, complementum acuti ad 180° .

117. Hinc binas hic casus solutiones habere poterit, & ambiguus sæpe erit, quod in ipsa Fig. 8 est manifestum, in qua triangula ACB, ACD, habent eandem magnitudinem laterum AC; CB & AC, CD, ac eundem angulum A oppositum lateri CB. Angulus autem acutus CBD, cum æquetur (per Cor. 2. prop. 2. Geom.) angulo CDB, est complementum ad duos rectos anguli CDA.

118. Quare aliunde definienda erit species alterius anguli oppositi alteri e lateribus datis, nimirum an is debeat esse acutus, an obtusus, & si forte latus oppositum angulo dato fuerit majus altero latere, constabit assumendum esse angulum acutum. Si enim is obtusus esset, multo magis deberet esse obtusus alter angulus lateri majori oppositus, & in triangulo bini anguli binos rectos excederent.

Invento autem secundo angulo, invenietur tertius, & ejus ope tertium latus (per num. 115).

119. *Casus 4.* Dentur bina latera cum angulo intercepto. Invenietur utervis reliquorum angulorum factis, per can. V, ut summa datorum laterum ad differentiam, ita cotangens dimidii anguli dati ad tangentem anguli, qui, ubi inventus fuerit, additus complemento dimidii anguli dati exhibebit angulum oppositum lateri majori, ablatu exhibebit oppositum minori. Inventis autem angulis invenietur latus tertium, ut in casu II.

120. *Casus 5.* Dentur tria latera. Invenietur quivis angulus

TRIGONOMETRIA: 161

angulus, habendo pro basi alterum e lateribus, quibus concluditur. Factis enim prius per can. VI, ut ea basis ad summam reliquorum laterum, ita eorumdem differentia, ad differentiam segmentorum basis, ac hujus dimidio additò semisummæ segmentorum basis, sive dimidiæ basi (per n. 105), vel ab ea ablato, habebitur (per num. 28) segmentum basis majus, vel minus; ac assumendum erit illud, vel hoc (per num. 106), prout latus adjacens angulo quæsito erit majus, vel minus opposito. Tum vero, per can. I, fiat ut latus adjacens ad hoc segmentum, ita radius ad cosinum anguli quæsiti.

121. Porro invento cosinu invenientur bini anguli ipsi respondentes alter acutus, alter obtusus. Assumendus autem erit acutus semper præter casum, in quo segmentum ex subtractione proveniens fuerit adhibitum, & existente semidifferentia majore, quam semisumma, evaserit negativum.

122. Invento angulo opposito uni e lateribus, ope can. IV admodum facile invenitur angulus oppositus cuilibet e binis reliquis.

Scholion.

123. Exempla sibi quisque facile assumet. Unicum asseremus casus quarti. Sint tria latera 745, 647, 421, & quæratür angulus oppositus primo. Fiat basis secundum ex iis 647, & reliquorum summa erit 1166, differentia 324. Factis igitur ut 647 ad 1166, ita 324 ad quartum, prodit 584, cujus dimidium 292 additum, ac ablatum dimidiæ basi 323, exhibet bina segmenta 615, ac 31. Quoniam vero latus adjacens angulo quæsito 421 est minus opposito 745, adhibendum est segmentum minus, nempe 31; ac faciendum, ut latus adjacens 421 ad 31, ita radius ad cosinum anguli quæsiti, cujus cosinus logarithmus erit idcirco $\equiv \text{Log. } 31 - \text{Log. rad.} - \text{Log. } 421 \equiv 1.49136 - 10.00000 - 2.62428 \equiv 8.86708$, adeoque angulus respondens tam $85^{\circ}.47'$, erit e tabulis, quam ejus complementum ad duos rectos: sed assumendus est ipse $85^{\circ}.47'$; cum differentia seg-

L

men

162 TRIGONOMETRIA.

mentorum 384 obveniet minor, quam summa, sive quam basis 647.

124. Notandum autem, aliquando problema posse evadere impossibile: nimirum in casu 1, & 2, si bini anguli dati simul non sint minores duobus rectis: in casu 4 si latus oppositum angulo dato sit nimis exiguum, nimirum minus perpendicularo CI: in casu 5, si bina latera data simul tertio majora non sint. At in omnibus iis casibus impossibilitatem manifestabit ipse calculus; vel enim sinus aliquis obveniet radio non minor, vel aliqua secans eodem non major, vel aliquod segmentum non minus latere adjacente. In solo casu 4 problema est semper possibile.

P A R S T E R T I A.

De resolutione triangulorum sphericorum.

§. I.

De angulorum, & triangulorum sphericorum natura, & proprietatibus quibusdam.

Definitio 1.

125. **C**irculi, quorum plana transeunt per centrum sphaerae, dicuntur circuli sphaerae maximi.

126. Maximos revera esse patet ex num. 142 Solid.

Coroll. 1.

127. Circuli maximi se omnes mutuo bifariam secant, & communis intersectio planorum eorumdem est diameter sphaerae.

128. Cum enim omnium plana per centrum transeant; sibi occurrunt in ipso centro; ac proinde parallela non sunt; adeoque se invicem secant in aliqua recta, quae cum transeat, per centrum sphaerae quod ipsis commune est (per num. 142. Solid.) ; ipsa eorum planorum intersectio, & erit diameter eorum circulorum,

Iosum, quos ptoinde secabit bifariam, & erit diameter sphaeræ.

Coroll. 2.

129. Per quævis bina puncta assumpta in superficie sphaeræ potest duci circulus maximus, & per quodvis punctum potest duci circulus maximus, cujus planum sit perpendiculare plano dati circuli maximi.

130. Patet primum, quia per data duo puncta, & centrum potest duci planum (per n. 7. Solid.) cujus sectio cum superficie sphaeræ erit circulus (per num. 142. Solid.); & maximus (per num. 124.); ac transibit per data puncta.

131. Patet secundum, quia ex illo dato puncto potest demitti perpendiculum in planum dati circuli maximi, (per n. 45. Solid.) & per ipsum, ac centrum potest duci planum (per n. 73. Solid.); cujus sectio erit circulus maximus, ac ejus planum erit perpendiculare plano dati circuli maximi (per n. 64. Solid.).

Definitio 2.

132. Diameter sphaeræ perpendicularis plano circuli orti ex sectione sphaeræ in ipsius sphaeræ superficie, dicitur ejus axis, & extrema axis puncta dicuntur poli.

133. In fig. 10. Pp est axis circulorum EFH , ABD , quorum plana perturrit in G , & C ad angulos rectos: P , p sunt eorundem poli.

Coroll. 1.

134. Axis transit per centrum circuli, cujus est axis.

135. Si circulus sit maximus, patet; cum axis transeat per centrum sphaeræ (per n. 132.); cum quo quivis circulus maximus commune centrum habet (per n. 142. Solid.).

136. Si autem circulus non sit maximus, ductis ad bina quævis ejus puncta F , H rectis ex C , & ex occurso axis G cum ejus plano, erunt recti anguli CGF , CGH (per n. 13. Solid.); cum nimirum axis sit perpendicularis plano FGH (per n. 131.). Quare quadrata GF , GH , erunt (per prop. 7. Geom.) excessus qua-

drorum æqualium CF , CH supra quadratum CG , adeoque æqualia; & proinde quævis GF æqualis eidem GH , & G centrum circuli.

Coroll. 2.

137. Omnia puncta peripheriæ cujuscunque circuli in superficie sphæræ distant per æquales arcus circulorum maximorum ab eodem suo polo.

138. Si enim assumantur bina ejusmodi puncta quæcunque H , & F , & per ea, ac polum P ducantur circuli maximi (per num. 129) PHp , PFp , & radii HC , FC , HG , FG , patet ex demonstratione præcedentis collarij fore æqualia triangula GCH , GCF , adeoque & eorum angulos ad C , & proinde etiam arcus PH , PF æquales fore.

Coroll. 3.

139. Circulus maximus ab utrolibet suo polo distat quaquaversus per quadrantem circuli maximi, & circulus, cujus aliquod punctum distat a polo suo per quadrantem circuli maximi, est maximus.

140. Si enim circulus fuerit maximus, ut ABD , transibit per centrum C , & radii CB , CD , qui erunt ejus intersectiones cum planis PFp , PHp , erunt perpendiculares axi PCp , qui toti plano BCD perpendicularis est; ac proinde tam arcus PB , PD , quam pB , pD erunt quadrantes.

141. Si autem circulus non fuerit maximus ut EFH ; non transibit ejus planum per centrum; ac proinde secta (per n. 50. Solid.) sphæra per centrum plano ABD parallelo ipsi EFH , erunt PB , PD , pB , pD quadrantes: adeoque PF , PH minores iis, & pF , pH majores erunt. Nullum igitur punctum circuli non maximi distat per quadrantem a suo polo; adeoque is, cujus aliquod punctum ita distat, maximus est.

Definitio 3.

142. Angulus sphericus dicitur is, quem in superficie spheræ continent bini arcus circulorum maximorum, ubi concurrunt, pro cujus mensura ipsi equali consideratur angulus rectilineus, quem continent recte jacentes

tes cum iisdem arcubus in iisdem planis, & ad easdem partes, ac eos tangentes in ipso concursu.

143. EPH est angulus sphericus, cui substituitur pro ejus mensura angulus rectilineus fPh , quem continent tangentes fP , hP in P.

Coroll. 1.

144. Si arcus supra arcum cadit, duos angulos facit aut rectos, aut simul duobus rectis æquales.

145. Nam tangens fP cum tangente eh duos angulos facit, aut rectos, aut duobus rectis æquales (per cor. 2. def. 10. Geom.).

Coroll. 2.

146. Si bina anguli latera ultra verticem producantur; angulos ad verticem oppositos æquales continebunt.

147. Si enim tangentes fP , hP producantur ultra verticem P, continebunt angulos ad verticem P æquales (per cor. 4. def. 10. Geom.).

Coroll. 3.

148. Si plana laterum fuerint sibi invicem perpendicularia; angulus erit rectus: & si angulus fuerit rectus; plana laterum erunt sibi invicem perpendicularia.

149. Si enim planum FPh fuerit perpendiculare plano HPh ; tangens fP , quæ est perpendicularis diametro Pp (per cor. 5. & 6. prop. 8. Geom.) communi intersectioni eorum planorum, erit (per n. 66. Solid.) perpendicularis toti plano HPh , adeoque & tangenti Pb .

150. Si autem tangens fP fuerit perpendicularis tangenti Pb , cum etiam sit perpendicularis diametro Pp (per cor. 5. pr. 8. Geom.), erit (per num. 18. Solid.) perpendicularis toti plano HPh , ac proinde & planum FPh erit (per n. 64. Solid.) perpendiculare eidem.

Coroll. 4.

151. Si è quovis puncto diametri transeuntis per verticem anguli exeant in planis arcuum, quibus continentur, binæ rectæ ipsi perpendiculares; angulum continebunt rectilineum spherico æqualem.

152. Si enim ejusmodi rectæ fuerint GF , GH , erunt æ (per Cor. 1. def. 17. Geom.) parallele rectis Pf , Pb

166 TRIGONOMETRIA.

perpendicularibus eidem diametro Pp ; ac proinde angulus FGH erit (per n. 41. Solid.) equalis angulo fPb

Coroll. 5.

153. Angulus sphericus est equalis angulo, quem continent plana arcuum continentium ipsum angulum sphericum.

154. Nam eorum planorum angulum, sive inclinationem plani ad planum exhibet idem angulus rectus FGH (per n. 57. Solid.).

Coroll. 6.

155. Mensura equalis angulo spherico erit arcus circuli cujuscumque habentis polum in ejus vertice interceptus inter ejus crura.

156. Secta enim sphaera plano quovis ABD , vel EF perpendiculari ad diametrum Pp , communem intersectionem planorum arcuum PF , PH , sectio erit circuli habens polum in P (per n. 132) cujus arcus BD , vel FH interceptus cruribus PF , PH erit mensura equalis angulo BCD , vel FGH , qui cum contineatur radiis BC , DC , vel FG , HG perpendicularibus axi Pp , equatur angulo spherico FPH (per n. 151).

Coroll. 7.

157. Si anguli spherici crura producantur; iterum concurrent ita, ut singula semicirculum compleant, & angulum sphericum contineant priori equalem.

158. Cum enim PCp sit diameter utriusque arcus PF , PH ; debet uterque productus transire per p ; eruntque PFp , PHp semicirculi, & angulorum FpH , FPH mensura erit idem arcus BD , vel FH (per n. 155).

Coroll. 8.

159. Circulus maximus circulo maximo perpendicularis transit per ejus polos, & si circulus maximus transit per polum circuli maximi, est ipsi perpendicularis.

160. Sit enim circulus maximus PBp perpendiculari circulo maximo ABD ; erit planum PBp perpendiculari plano ABD (per num. 149). Quare in eo jacebit axis circuli ABD (per n. 66. Solid.), cum sit perpendicularis plano ABD (per n. 133) & transeat per BC inter

TRIGONOMETRIA. 167

tionem planorum ABD, PBp. Ac proinde poli, qui at extrema axis puncta (per n. 133) jacebunt in ip- peripheria circuli PBp.

Defin. 4.

161. Triangulum sphericum dicitur, quod continetur superficie spherę tribus arcubus circulorum maximo- ni, qui dicuntur ejus latera.

Coroll. 1.

162. Si in triangulo spherico bini anguli fuerint re- ti; latera iis opposita erunt quadrantes: & si bina la- ti fuerint quadrantes, anguli iis oppositi erunt recti; in utroque casu tertium latus erit mensura equalis lo angulo sibi opposito.

163. Si enim sint anguli PBD, PDB recti, polus cir- li ABD, qui debet jacere in utroque circulo BP, DP (per n. 159), cadet in ipsam eorum intersectionem, et in anguli verticem P; ac proinde PB, PD quadran- ti erunt (per n. 139).

164. Si autem arcus PB, PD fuerint quadrantes; anguli BCP, DCP erunt recti; ac proinde recta CP perpendicularis plano BCD (per n. 18. Solid.): & id- eoque plana arcuum PB, PD perpendicularia erunt plano tius BD, & anguli PBD, PDB recti (per n. 148).

165. In utroque casu, cum P sit polus circuli BD, tius BD est mensura equalis angulo BPD (per num. 155).

Coroll. 2.

166. Si omnes anguli fuerint recti; omnia latera, e- runt quadrantes, & si omnia latera fuerint quadrantes, omnes anguli erunt recti.

167. Si enim etiam tertius angulus fuerit rectus, etiam tertium latus erit quadrans, & viceversa (per n. 165).

Scholion 1.

168. Hinc pater resolutio trianguli habentis omnes angulos, vel saltem binos rectos, in quibus nullum opus est tabulis functionum. Superest igitur ut agamus de triangulis, in quibus unus angulus est rectus, que di-

cuntur rectangula, ac de iis, in quibus rectus est nullus, quæ obliquangula appellantur. Ac in illis quidem appellantur basis latus illud, quod recto angulo opponitur; in his latus quodcumque pro basi assumi potest.

Scholion 2.

169. Consideratio trianguli sphericæ eodem recidit cum consideratione anguli solidi constituti a tribus angulis planis ut innuimus n. 91. Solid. Consideretur enim in fig. 11. angulus solidus, quem continent tres anguli plani BCD, BCA, ACD, & concipiatur radio CB spheræ occurrens eorum angulorum planis in BD, AD, AB. Hi tres arcus continebunt triangulum sphericum BAD, cujus latera mensurabunt angulos illos planos ad C, anguli vero ad B, D, A, erunt æquales inclinationibus, seu angulis, quæ plana eorundem angulorum continent cum planis contiguis (per n. 153). Quare, quæ demonstrantur de eo angulo solido pertinent ad triangulum sphericum, & viceversa.

170. Porro hinc, & ex iis, quæ in Solidis a num. 82. de angulo solido vel demonstravimus, vel innuimus inferuntur juxta n. 91 ipsorum solidorum sequentes triangulorum sphericorum proprietates.

171. In quovis triangulo spherico, tria latera simul circulo minora sunt; potest autem eorum summa in infinitum minui: at bina quævis tertio majora sunt.

172. Nam anguli plani, ex quibus angulus solidus constat, & simul minores sunt quatuor rectis, (per n. 85. Solid.), & possunt esse magnitudinis cujuscunque dummodo quivis ex iis sit minor reliquis simul sumptis.

173. Ex tribus lateribus, quibuscunque potest semper constare triangulum sphericum, idque unicum; dummodo & omnia simul circulo minora sint, & quodvis ex iis minus reliquis simul sumptis.

174. Id enim ostendimus num. 90. Solid. de angulis planis constituentibus solidum.

175. Trianguli sphericæ tres anguli simul & minores sunt sex rectis, & majores binis.

176. Id constat ex n. 91. Solid. Id ipsum autem, ut etiam a tribus angulis eas condiciones implentibus unicuique triangulum constitui posse, ac superiora omnia hic accurate demonstrari possent; sed ea omnia, utpote ad resolutionem non necessaria, innuisse sufficit.

§. II.

De resolutione triangulorum rectangulorum.

177. **R**esolutionem triangulorum rectangulorum planorum docuimus ope trium canonum. Pro phæricis duplò plures requiruntur, quos omnes exhibeat consideratio solius figur. 11.

178. In ea sit jam triangulum BAD rectangulum ad A. Circulus lateris AD sit ADEFL cuius planum concipiatur congruens cum plano ipsius chartæ. Latus AB insistens peripheriæ ADEF verticaliter, & basis DB oblique, si producantur, occurrent ipsi alicubi in E, & F ita, ut AE, DF sint diametri, & ABE, DBF semicirculi (per n. 137).

179. Concipiatur BC, tum BI perpendicularis plano ADE, quæ cadet in ipsam diametrum AE (per n. 66. Solid.) alicubi in I ad angulos rectos, tum IG perpendicularis diametro DF, ac BG, quæ pariter erit perpendicularis ipsi DF. Nam planum BIG transiens per IB perpendicularem plano ADE erit eidem perpendicularis (per n. 64. Solid.). Quare recta GC perpendicularis eorum intersectioni IG jacens in posteriore erit (per n. 66. Solid.) perpendicularis priori, nimirum ipsi BIG, adeoque & rectæ BG.

180. Demum sectis semicirculis DAF, DBF bifariam in L, & H, transeat per ipsa puncta L, H arcus circuli maximi (per nu. 129.) occurrens semicirculo ABE alicubi in P; eruntque anguli DLH, DHL recti (per n. 162); ac proinde D polus circuli LHP (per num. 159), & LH mensura æqualis angulo ADB (per nu. 162). Ob angulos vero ALP, LAP rectos, erit P polus circuli AL, & PA, PL quadrantes (per n. 139.);
ac

ac AL mensura æqualis angulo HPB (per num. 162)

181. Jam vero omnis triangulorum sphaericorum resolutio profuit a consideratione pyramidis BIGC, & comparatione triangulorum rectangulorum BAD, BHP. Illa exhibebit tres canones, hæc alios tres, quibus continebuntur omnes casus triangulorum rectangulorum.

182. Primum igitur desigenda mentis acies in pyramidem ipsam. Illa in situ erecto considerata haberet basim IGC in plano chartæ, & verticem in B, at nos jacentem considerabimus ita, ut C sit vertex, basis autem vertici opposita BIG, a qua ad verticem C tendunt tria latera BC, IC, GC, quibus concluduntur tres facies BCI, BCG, ICG.

183. Porro tam illa basis, quam hæ facies sunt triangula plana rectangula. Nam anguli BIG, BIC sunt recti ob BI perpendicularem plano CIG, & anguli CGB, CGI ob CG perpendicularem plano BGI. Angulorum autem rectilineorum, quos illæ tres facies continent in C, nimirum angulorum BCI, BCG, ICG mensuræ ipsis æquales sunt arcus BA, AD, BD; angulus vero rectilineus BGI pertinet ad basim illam pyramidis est (per n. 152) æqualis sphaerico BDA.

184. Comparando autem inter se bina triangula sphaerica BAD, BHP rectangula ad A, & H, cuivis velle lateri, vel angulo alterius, respondet aliquid in altero vel ipsi æquale, vel ejus complementum. Angulo BAD recto primi æqualis est angulus BHP rectus secundi; angulo ABD primi æqualis est (per n. 146) angulus HBP secundi ad verticem oppositus. Angulus ADB primi; quem exhibet LH (per n. 180) habet pro complemento latus HP secundi; latus AB primi habet pro complemento basim BP secundi; latus DA primi habet pro complemento arcum AL, adeoque angulum BPH, quem is exhibet (per n. 180): basis demum BD primi habet pro complemento latus BH secundi.

185. Jam vero priores tres canones eruemus considerando, juxta num. 25, qui hic consulendus, & habendus semper præ oculis, tamquam radium prius CB, tum CG,

IG; ac demum CI. Ex prima consideratione orietur in triangulis CIB, CGB, quibus CB communis est, ratio rectarum BG, BI, & alteram earum rationem exhibebit basis BIG, quæ rationes inter se combinatæ præbent primum canonem: secundum secunda præbebit ope rectarum BG, IG; tertium tertiâ ope rectarum GI, BI; sed jam aggrediamur rem ipsam.

186. Habita BC pro radio in triangulis rectangulis CGB, CIB, erunt BG, BI sinus angulorum BCG, BCI; sive sinus basis BD, & lateris BA oppositi angulo sphærico D. At in triangulo BIG rectangulo ad I, eadem IG, BI referunt radium, & sinum anguli rectilinei BGI, seu sphærici D. Quare

187. I. *Radius ad sinum anguli, ut sinus basis ad sinum lateris oppositi.*

188. Habita CG pro radio in triangulis rectangulis CGB, CGI, erunt GB, GI tangentibus angulorum GCB, GCI, sive basis BD, & lateris DA adjacentis angulo D. At in triangulo BIG, eadem GB, GI referunt radium, & cosinum anguli rectilinei BGI, vel sphærici D. Quare

189. II. *Radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis.*

190. Habita CI pro radio in triangulis rectangulis CIB, CGI, erunt IG, IB illa sinus anguli ICG, seu lateris AD adjacentis angulo D, hæc tangens anguli ICB, seu lateri AB eidem oppositi. At in triangulo BIG eadem IG, IB referunt radium, & tangentem anguli rectilinei BGI, seu sphærici D. Quare

191. III. *Radius ad tangentem anguli, ut sinus lateris adjacentis ad tangentem oppositi.*

192. Hæc ex pyramide: jam applicando hosce canones ad triangulum BHP, & ipsum comparando cum triangulo BAD orientur tres alii,

193. Ex can. I radius ad sinum anguli BPH, sive acus AL, nempe ad cosinum lateris AD, ut sinus BP, nempe cosinus lateris AB ad sinum BH, nempe cosinum basis BD. Quare

172 TRIGONOMETRIA.

194. IV. *Radius ad cosinum unius lateris, ut cosinus alterius ad cosinum basis.*

195. Ex eodem can. I radius ad sinum anguli PBH, sive ABD, ut sinus BP, nempe cosinus lateris AB adjacentis ipsi angulo ABD, ad sinum PH, nempe cosinum HL, sive cosinum anguli sphaerici D, quem is exhibet, & qui opponitur lateri AB. Quare

196. V. *Radius ad sinum anguli adjacentis, ut cosinus lateris ad cosinum anguli oppositi.*

197. Ex can. III Radius ad tangentem anguli B, ut sinus BH, seu cosinus basis BD ad tangentem HP, nempe cotangentem HL, sive anguli D. Quare

198. VI. *Radius ad tangentem unius anguli, ut cosinus basis ad cotangentem alterius.*

199. In hisce 6 canonibus continentur combinationes omnes, quæ haberi possunt, sumendo tria ex iis quinque, quæ præter angulum rectum continet quodvis triangulum rectangulum, nimirum binis angulis, binis lateribus, ac basi, ut paulò inferius patebit. Possent applicando canonem III etiam ad angulum P, & canonem II tam ad P, quam ad B, erui alii tres canones, qui tamen easdem combinationes iterum redderent, ac ad canones præcedentes facile reducerentur, ac idcirco eos omisimus.

200. Potro in triangulorum resolutione ope horum canonum invenietur semper aliqua functio basis, vel lateris, vel anguli quæsitæ, ut jam videbimus. At quoniam (per num. 9) functiones eadem communes sunt binis arcibus semicirculum complentibus, quorum alter est quadrante minor, alter major, necessariae sunt quædam Regulæ, quæ ostendant, utram speciem habere debeant anguli, & arcus quæsitæ, nimirum acuti debeant esse, an obtusi, sive minores, an majores quadrante. Binas autem ejusmodi regulas, quæ semper speciem indicabunt, quotiescunque in se determinata erit, ex fig. 12. admodum facile eruemus.

201. Manentibus in ea punctis ABPDE, ut in fig. 11. per polum P, & punctum D ducatur arcus circuli maxi-

TRIGONOMETRIA. 173

rimi (per num. 129), qui erit perpendicularis ad ADE (per num. 159), & semicirculo ADE secto bifariam in I, quod punctum erit polus circuli ABE, cum poli ejus circuli debeant esse in circulo ADE (per num. 159), ac debeant per quadrantem distare ab eodem ABE (per num. 139), ducatur arcus BI, qui erit quadrans (per n. B39). Ducatur demum arcus Bd per quodvis punctum semicirculi ADE jacens respectu I ad partes oppositas D, & polo B sit arcus circuli FIf occurrens arcibus BD, Bd in F, f, qui ob BI quadrantem erit circulus maximus (per num. 139), & (per eundem) abscindet BF, Bf quadrantes, ac constituet angulos BIF, BIf rectos (per num. 159).

202. Jam vero si latus AB sit minus quadrante AP; erit angulus ADB minor semper recto ADP, cujus est pars: si autem illud sit majus, erit major & hic, utcumque se habuerit alterum latus AD. Quare

203. Reg. 1. *Latera sunt ejusdem speciei cum angulis oppositis.*

204. Si latus AB sit minus quadrante AB, erit angulus BIA, sive (existente etiam AD minore quadrante AI) BID minor recto per Reg. 1, adeoque minor angulo BIF, angulus vero BId major, recto BIf, & propterea basis BD minor quadrante BF, & basis Bd major quadrante Bf. In triangulis igitur BAD, BED, ubi latera sunt ejusdem speciei, basis est quadrante minor: in triangulis BAd, BEd, ubi ea sunt diversæ speciei, basis est quadrante major. Quoniam vero per reg. 1. anguli sunt ejusdem speciei cum lateribus oppositis, possunt pro illis substitui, ubi agitur de eorum specie. Quare

205. Reg. 2. *Si duo latera, vel duo anguli, vel latus cum angulo adjacente fuerint ejusdem speciei; basis erit quadrante minor; si diversa, major, & viceversa.*

P R O B L E M A.

206. In triangulo rectangulo spherico datis aliis binis præter angulum rectum reliqua invenire.

207. Ut questioni satisfiat, oportet arcus, vel anguli quæ-

quæſiti invenire functionem aliquam, tum noſſe utrius ſpeciei ſit.

208. Primum ſemper obtinebitur ope canonum. Nam in triangulo rectangulo præter angulum rectum habentur hæc quinque, baſis, bina latera, bini anguli: Ea quinque ſex tantum combinationes habent, quarum ſingulis tria ex iis contineantur; videlicet: 1.^a continetur baſis cum utroque latere: 2.^a baſis cum utroque angulo: 3.^a baſis cum latere, & angulo adjacente: 4.^a baſis cum latere, & angulo oppoſito: 5.^a utrumque latus cum altero angulo: 6.^a uterque angulus cum altero latere: Quotieſcunque autem dantur bina quævis, & quæritur quodvis tertium, ſemper ea data, & id quæſitum erunt ſimul in una ex iis combinationibus; ut ſi detur baſis cum altero latere, & quæſatur angulus illi lateri adjacens; ea tria ſunt ſimul in combinatione 3. Porro ſingulæ ejuſmodi combinationes ſingulis canonibus continentur; ſic illa combinatio tertia continetur in canone ſecundo: *Radius ad ſinum anguli, ut tangens baſis ad tangentem lateris adjacentis*, ac in eo canone, in quo ea combinatio continetur, habebitur radius, & binæ functiones binorum, quæ dantur, ut in allato exemplo habebitur tangens baſis, & ſinus anguli, ac ſimul aderit aliqua ejus functio, quod quæritur, ut ibidem tangens lateris adjacentis. Quare dabuntur tres termini proportionis eo canone incluſæ; ac proinde eruetur & quaſtus terminus, ſive functio quæſiti arcus, vel anguli, (per num. 10. cap. 1. Arithm.), dividendo nimirum, ſi quæſita functio fuerit in uno ex terminis extremis, productum medioꝝum per alterum extremum, vel ſi ea fuerit in uno e mediis, productum extremorum per alterum e mediis, & ubi logarithmi adhibeantur, ſubſtituendo multiplicationi, ac diviſioni additionem, & ſubtractionem.

209. Secundum ſemper obtinebitur per regulas, præter caſum, in quo dantur alterum latus cum angulo oppoſito, & quæſatur quodvis ex reliquis tribus. Is enim caſus ſemper ambiguus erit, & binas ſolutiones admittet, ac quidvis e reliquis tribus eſſe poterit, vel majus, vel

vel minus quadrante. Nam in triangulis BAD, BAF (Fig. 11) reſtāngulis ad A, quamcunque magnitudinem habeat, latus AB eſt commune utrique, & angulus ADB ipſi oppoſitus in primo æquatur angulo AFB eodem oppoſito in ſecundo: baſis autem BF, alterum latus AF, & alter angulus ABF poſterioris ſunt complementa ad duos reſtos baſis BD, lateris AD, anguli ABD prioris; ac proinde ſi detur latus AB, & angulus ipſi oppoſitus, ſi eorum tantummodo, ambiguum erit, uter e binis illis triangulis ſumendus ſit. Porro ſolum in iis caſibus, in quibus detur latus cum angulo oppoſito illæ regulæ nos deſtituunt, nec determinant ſpeciem anguli: vel arcus quaſiti, quam determinant in cæteris omnibus. Si enim ex. gr. datis binis lateribus, quaeratur angulus alteri oppoſitus; ejus ſpecies innoteſcet per reg. 1, cum debeat eſſe eadem, ac ſpecies data lateris oppoſiti dati. At ſi quaeratur baſis; ejus ſpecies invenietur per reg. 1, cum debeat deficere a quadrante, vel illum excedere, prout bina latera data fuerint ejusdem ſpeciei, vel diverſæ.

Scholion 1.

210. Ut pateat illud ſemper haberi per Canones, hoc ſemper per regulas; ſubjiciemus indicem combinatorum, & canonum, quibus ipſæ combinationes continentur, ac regularum, quarum ope in ſingulis combinationibus invenietur ſpecies: & quoniam ſecunda regula tres habet partes; earum ſingulas exprimemus.

- | | |
|--|--|
| 1. Baſis cum utroque latere. | Can. 4. Reg. 2. pars 1. |
| 2. Baſis cum utroque angulo. | Can. 6. Reg. 2. pars 2. |
| 3. Baſis cum latere, & angulo adjacente. | Can. 2. Reg. 2. pars 3. |
| 4. Baſis cum latere, & angulo oppoſito. | Can. 1. Reg. 1, vel nulla in caſu ambiguo. |
| 5. Utrumque latus cum altero angulo. | Can. 3. Reg. 1, vel nulla in caſu ambiguo. |
| | 6. Uter- |

6. *Uterque angulus cum altero latere. Can. 5. Reg. 1, vel nulla in casu ambiguo.*

211. Ut methodus resolvendi casum quemlibet illustretur exemplo, detur basis = $57^{\circ} . 25'$. cum latere = $41^{\circ} . 16'$, & quærat^r angulus adjacens ipsi lateri . Tria, quæ hic combinantur sunt basis cum latere, & angulo adjacente , quorum priora duo dantur , tertium quæritur . Huic combinationi , quæ est tertia , responder^t Canon secundus , & regulæ secundæ pars tertia . In eo canone habetur *Radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis* . Quare $\text{Log. cosinus anguli} = \text{Log. rad.} + \text{Log. tang. } 41^{\circ} . 16' - \text{Log. tang. } 57^{\circ} . 25' . = 10.00000 + 9.94323 - 10.19445 = 8.74878$, cum responder^t in tabulis $55^{\circ} . 54'$. Quoniam autem eidem combinationi responder^t Reg. 2. pars 3., inde species determinabitur . Ibi enim habetur: *si latus cum angulo adjacente fuerint ejusdem speciei, basis erit quadrante minor, & viceversa* . Nimirum cum hic basis $57^{\circ} . 25'$ sit minor quadrante; latus cum angulo adjacente erunt ejusdem speciei . Est autem latus $41^{\circ} . 16'$ quadrante minus . Erit igitur recto minor & angulus quæsitus ; adeoque sumendus erit ille ipse $55^{\circ} . 54'$, quem exhibent tabulæ , non ejus complementum ad duos rectos .

212. Singulæ combinationes continent terna Problemata , cum nimirum quodlibet ex iis tribus possit quæri, datis reliquis binis . Sic in combinatione , qua in exemplo allato usi sumus, posset potius quæri latus data basi & angulo adjacente, vel quæri basis , dato latere, & angulo adjacente . Eo pacto cum habeantur sex combinationes, Problemata essent 18. Sed bina Problemata primæ, & secundæ combinationis , coincidunt inter se; ac ejusmodi combinationes bina singulæ Problemata inter se diversa complectuntur . Nam in prima utrumlibet latus quærat^rur data basi , & altero latere , eodem res redit, ut in secunda idem dicendum de angulis; ac proinde omnis triangulorum rectangulorum resolu-

Solutio continetur 16 Problematis, quæ iis combinationibus includuntur. Postremæ tres combinationes habent singulos singulæ casus ambiguos, cum nimirum dato latere & angulo opposito possit quæri basis in 4^a , latus alterum in 5^a , alter angulus in 6^a , in quibus tantum, ut supra monuimus desermur ab iis regulis ceteros omnes complectentibus.

Scholion 2.

213. Addemus hoc secundo scholio quædam, quæ facile eruuntur è canonibus, & ostendunt, qui casus possint involvere impossibilitatem, quæ tamen, ut minus necessaria, omittere etiam Tyro poterit, si li-
nerit.

214. Basis in triangulo rectangulo non potest distare a quadrante magis quam latus utrumlibet.

215. Infertur e primo canone, in quo Radius ad sinum anguli, ut sinus basis ad sinum lateris oppositi. Cum enim radius non possit esse minor sinu ullius anguli (per num. 39.); sinus basis non potest esse minor sinu lateris oppositi: æque autem facile infertur ex canone 2, vel 4.

216. At basis ipsa respectu anguli utriuslibet potest habere magnitudinem quamcumque.

217. Infertur ex can. 6, in quo radius ad tangentem unius anguli, ut cosinus basis ad cotangentem alterius. Cum enim radius possit habere (per num. 39) quamcumque rationem ad tangentem unius anguli, potest, & cosinus basis habere pariter quamcumque ad cotangentem alterius.

218. Patet autem etiam ex eo, quod capta utcumque basi DB, & facto utcumque angulo BDA, possit semper (per num. 129) duci ex B circulus perpendicularis circulo DAF, qui ubi semicirculum DAF secabit in A, constituat triangulum rectangulum.

219. Angulus non potest distare a quadrante minus, quam latus oppositum.

220. Infertur ex canone 1. ubi alternando est radius ad sinum basis, ut sinus lateris, ad sinum anguli oppositi.

positi. Patet enim simul lateris non posse esse minorem sinu anguli oppositi, ut radius non potest esse minor sinu basis. Idem æque facile deducitur ex can. 3. pariter alternando, vel ex can. 5.

221. Bini anguli simul debent esse majores uno recto.

222. Inferitur ex can. 5. ubi alternando est radius ad cosinum lateris ut sinus anguli adjacentis ad cosinum oppositi. Cum enim radius debeat esse major cosinu lateris, etiam sinus unius anguli debebit esse major cosinu alterius. Quare si uterque sit acutus alter debebit esse major complemento alterius; adeoque ambo simul rectum excedent. Si vero neuter acutus est; patet utrumque simul debere rectum excedere. Idem inferri posset ex can. 6, pariter alternando: & idem inferitur etiam ex num. 175. Cum nimirum omnes tres anguli simul debeant duobus rectis majores esse, & unus jam rectus sit; non possunt reliqui duo simul non esse majores recto.

223. Angulus respectu lateris adjacentis potest habere magnitudinem quamcunque.

224. Inferitur ex can. 2, in quo est radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis. Assumptis enim utcumque basi, & angulo; invenietur tangens lateris adjacentis; & nulla tangens est impossibilis utcumque magna, vel parva.

225. Patet autem etiam ex eo, quod capto utcumque latere AB, & facto quovis angulo ABD, semper arcus BD occurrat arcui ADE alicubi in D, & triangulum constituet.

226. Angulum autem respectu basis posse habere magnitudinem quamcumque diximus num. 216.

227. Latus non potest distare a quadrante minus quam basis, nec magis quam angulus oppositus; respectu vero anguli adjacentis & alterius lateris potest habere magnitudinem quamcumque.

228. Patet primum ex num. 214, secundum ex num. 219, tertium ex num. 223, quantum inferitur ex can. 3, in quo quicumque fuerit sinus alterius lateris, invenietur

tut tangens alterius, quæ impossibilis esse non potest, ac ex can. 5, in quo cosinus lateris utriuslibet semper proveniet minor radiò adeoque possibilis.

229. Ex his paretur, qui casus possint impossibilitatem involvere qui semper possibiles sint. Id vero obtinebitur percuttendo alias sex combinationes, quæ contineant binâ quævis, quæ dari possunt ex illis quinque.

230. Datâ basi, & altero latere, Problema erit impossibile, si basis datâ distet à quadrante magis, quam latus (per num. 214.)

231. Datâ basi & altero angulo, Problema erit semper possibile (per num. 216.)

232. Datâ binis angulis, erit impossibile, si eorum summa rectum non superet (per num. 221.)

233. Dato angulo, & latere opposito, erit impossibile si angulus distet à quadrante minus, quam latus oppositum (per num. 219.)

234. Dato angulo, & latere adjacentē, erit semper possibile (per num. 223.)

235. Datâ binis lateribus, erit semper possibile (per num. 227.)

236. Atque in omnibus hisce combinationibus continentur iterum illa eadem Problemata, quæ in prioribus: nam singulæ terna continent, cum datâ iis binis, quæti possit quodlibet e tribus reliquis, ac in tertia & sexta coincidunt binâ Problemata, ubi datâ binis angulis quæritur latus utrumlibet, vel datâ binis lateribus, quæritur uterlibet angulus.

237. Quoniam autem in omnibus Problematis invenitur functio per canones, & species per regulas præter combinationem quartam numeri 233, in qua datur latus cum angulo opposito, quæ speciem indeterminatam relinquit juxta num. 209, omnia ejusmodi problemata unicam admittunt solutionem, ac angulum, vel arcum determinant, præter illâ triâ in ea quarta combinatione inclusa, quæ non determinat speciem, & proinde binas singulâ solutiones admittunt.

238. Porro quotiescumque Problema erit impossibile;

180 TRIGONOMETRIA:

id ipsum calculus etiam trigonometricus ostendet, ut monuimus num. 123. Detur ex. gr. basis $57^{\circ} . 0'$, latus vero $76^{\circ} . 0'$, & queratur angulus illi lateri oppositus. Tria quæ hic combinantur sunt basis cum latere, & angulo opposito, quæ in indice combinationum numeri 310 est quarta, & ipsi respondet canon 1, in quo habetur: *Radius ad sinum anguli, ut sinus basis ad sinum lateris oppositi*. Quare erit Logarithmus sinus anguli quaesiti \equiv Log. rad. $-\frac{1}{4}$ Log. sin. $76^{\circ} . 0'$ $-\text{Log. sin. } 57^{\circ} . 0' \equiv 10.00000 - 9.98690 - 9.92359 \equiv 10.06331$, qui Logarithmus est major quovis sinuum Logarithmo in tabulis, cum sit major quam 10. 00000 Logarithmus radii, adeoque requirit sinum radio majorem, qui est impossibilis, & problematis impossibilitatem evincit. Eam autem facile erat deprehendere ex num. 230; cum nimirum basis data $57^{\circ} . 0'$. magis distet a quadrante, quam latus oppositum $76^{\circ} . 0'$.

Scholion 3.

239. Idem canones exhibent alia quoque theorematâ sanè multa, in quibus eruendis Tyronem poterit exercere Præceptor, ut ea omnia, quæ de triangulis habentibus plusquam unum angulum rectum diximus, & alia, quæ addi possent. At iis omissis addemus pauca quædam usui futura in consideratione casuum quorundam ambiguum, vel impossibilium in triangulis obliquangulis.

240. In fig. 12. si ex polo P circuli ADE ducatur ad quodvis punctum D arcus PD circuli maximi; is semper erit quadrantæ æqualis (per num. 139.), & cum eo angulum rectum constituet (per num. 159.) ac proinde mutato utcumque loco puncti D per totum circulum AIEA, & magnitudo arcus PD, & angulus cum peripheria AIEA manebunt semper magnitudinis ejusdem $\equiv 90^{\circ}$. At si sumatur quodcumque aliud superficiæ sphericæ punctum B, & ducatur arcus BD; mutato situ puncti D mutatur & magnitudo arcus ejusdem, & ejus inclinatio ad circulum ADE. Non erit abs re contemplari mutationes omnes, quæ accidunt illi arcui, & angulo.

241. Si per B, & P ducatur arcus circuli maximus, qui occurrerit circulo AIEi alicubi in A, & E ad angulos rectos (per n. 159.), existente A ad partes B respectu P, ac bini semicirculi AIE, AIE secentur bifariam I, & i, qui erunt poli ipsius circuli APE, juxta num. 139; puncto D abeunte in A, arcus BD erit æqualis ipsi BA, & omnium minimus, tum puncto D recedente utralibet ex parte versus E, perpetuo crescet, donec abeunte D in I, vel i fiet quadrans, ac demum abeunte D in E fiet æqualis ipsi BE, & omnium maximus.

242. Id facile deducitur ex can. 4. Nam in triangulo BAD ex eo can. erit radius ad cosinum lateris BA, & cosinus lateris AD ad cosinum basis BD. Quare stante latere BA, & mutato latere AD, ita mutabitur basis BD, ut cosinum ratio sit semper eadem; ac proinde decrescente complemento arcus AD per ejus continuum incrementum, usque ad I, vel i decrescet etiam complementum basis BD, quæ proinde perpetuo crescet: ac complementis simul evanescentibus ibidem simul fient quadrantes, tum crescente perpetuo ab I, & i usque ad E complemento arcus AD, crescet perpetuo etiam complementum arcus BD, qui proinde pariter crescet.

243. Patet autem ex eadem demonstratione, tam versus I, quam versus i æque crescere arcum BD in æqualibus distantis puncti D, hinc inde ab A.

244. Quare omnium arcuum, qui ex puncto B assumpto in superficie sphaeræ applicari possunt ad peripheriam circuli AIEi, cui hemisphaerium insistit, maximus est BPE qui transit per polum P, minimus BA ipsi oppositus, reliqui eo minores, quo magis ad minimum accedunt, ac bini tantum hinc, inde in æquali distantia a puncto A, vel E inter se æquales applicari possunt.

245. Si igitur ex puncto dato B oporteat applicare arcum datum, is applicari non poterit, si fuerit minor, quam AB, vel major, quam BE, nimirum si distiterit a quadrante magis, quam utervis ex arcibus AB, BE: poterit applicari in unica positione, si æque disti-

terit, in binis hinc inde a perpendiculari, si distiterit minus, & eo propius punctus I, i , quo fuerit quadranti propior.

246. At angulus quem arcus ED continebit cum circulo ADE, puncto D abeunte in A erit utrinque rektus; tum abeunte D versus I vel i , erit semper BDA acutus versus A, BDE obtusus versus E, & ille perpetuo crescet, hic decrescet donec in I vel i fiat ille minimus, hic maximus, existente illius mensura AB, hujus BPE; deinde vero usque ad E ille iterum crescet, hic decrescet, ac abeunte D in E, iterum uterque fiet rektus.

247. Id facile deducitur ex can. 3. Nam ex eo erit radius ad tangentem anguli ADB, ut sinus lateris AD, ad tangentem lateris AB. Quare mutato utrunque puncto D, productum ex sinu lateris AD, & tangente anguli BDA erit semper idem; adeoque illius sinu crescente, vel decrescente, hujus tangens contra decrescet, vel crescet. Sinus autem illius perpetuo crescet donec ipse fiat in I vel i quadrans, tum decrescet, adeoque e contrario hujus tangens decrescet usque ad I, vel i tum crescet. Quare etiam angulus ex ea parte, ex qua erit acutus decrescet usque ad I, vel i , tum crescet, & ex altera parte, ex qua erit obtusus crescet, tum decrescet. Facto autem AD in I, vel i quadrante, ejus sinus æquatur radio; adeoque hoc ipso canone tangens ejus anguli æquabitur tangenti arcus AB, vel BE, & ipsi arcus AB, BE erunt mensura angulorum BDA, BDE in illo casu, quod etiam constat ex n. 155, cum D in eo casu abeat in I polum circuli ABE.

248. Patet autem etiam in æquali distantia punctorum D, d hinc inde ab I, vel ab i angulos hinc BDA, Bda, inde BDE, Bde æquales fore. Bini enim arcus, AD, Ad æquabuntur duplo quadrantis AI, sive semicirculo, adeoque sinus arcuum AD, Ad æquales erunt; ac proinde & tangentes angulorum BDA, Bda eandem habebunt magnitudinem.

249. Quare omnium angulorum, qui ad circulum AIE

AE² fieri possunt per arcus ductos ex B, minimum versus A metitur AB, maximum versus E metitur BE & uterque ab eo limite ita recedit, ut in rectum desinat.

250. Si igitur ex puncto dato B oporteat applicare arcum, qui contineat angulum BDA, vel BDE datum; is applicari non poterit, nisi, qua parte respicit perpendicularum minus AB, sit acutus, ex parte perpendiculari majoris obtusus: nec pariter applicati poterit, si distet a recto magis, quam uterque arcuum BA, BE a quadrante: poterit autem in I, & i tantum, si æque distiterit: ac in binis positionibus æque remotis hinc inde ab I, quam ab i, si distiterit minus, eoque propius punctis A, E, quo fuerit propior recto.

§. III.

De resolutione triangulorum obliquangulorum.

251. **T**riangula obliquangula reducuntur ad rectangula ope perpendiculari demissi ex angulo aliquo in latus oppositum habitum pro basi, ut in triangulis planis. Sit ejusmodi triangulum (in fig. 13.) ABD: Assumpto pro basi latere AD, occurrant ejus circulo in a, & d semicirculi arcuum AB, DB productorum. Per punctum B ducatur circulus perpendicularis circulo AD ad (per num. 129), qui ei occurrerit in binis punctis e diametro oppositis, adeoque jacebit altera intersectio E in semicirculo ADa, altera e in adA. Secentur demum semicirculi Eae, altera e in adA. Secentur demum semicirculi Eae, Eae bifariam in I, i.

252. Triangulum ABD, ope perpendiculari BE reducitur ad bina triangula rectangula ABE, DBE, ubi sive ipsum perpendicularum BE cadat intra basim, ut figura exhibet, sive extra, ut in triangulo ABd, dicimus AE, ED segmenta basis, ABE, DBE, segmenta verticis, & AE, ABE adjacentia lateri AB, & angulo A, ac opposita lateri BD, & angulo D, contra vero DE, DBE illis opposita, his adjacentia.

184 TRIGONOMETRIA:

253. Porro ope priorum sex canonum eruemus alios 7 pertinentes ad hæc segmenta, latera, & angulos, ubi quidquid dicemus de triangulo ABD, habet locum in reliquis tribus triangulis *Abd*, *aBD*, *aBd*, dummodo majoribus litteris apte substituantur minores.

254. Ex can. 1. Radius ad sinum anguli A, ut sinus AB ad sinum BE. Ex eodem alternando, est sinus anguli D ad radium, ut sinus BE ad sinum DB. Igitur ex æqualitate perturbata sinus D ad sinum A, ut sinus AB ad sinum BE. Quare.

255. VII. *Sinus angulorum, ut sinus laterum oppositorum.*

256. Ex can. 2. Radius ad cosinum anguli ABE, ut tangens AB ad tangentem BE. Ex eodem alternando cosinus DBE ad radium, ut tangens BE ad tangentem DB, Igitur ex æqualitate perturbata cosinus DBE ad cosinum ABE, ut tangens AB ad tangentem DB. Quare.

257. VIII. *Cosinus segmentorum verticis, ut tangentes laterum oppositorum.*

258. Ex can. 3. Radius ad tangentem A, ut sinus AE ad sinum BE. Ex eodem alternando tangens D ad radium, ut sinus BE ad sinum DE. Igitur ex æqualitate perturbata tangens D ad tangentem A, ut sinus AE, ad sinum DE. Quare.

259. IX. *Sinus segmentorum basis, ut tangentes angulorum oppositorum.*

260. Ex can. 4. Radius ad cosinum BE, ut cosinus AE ad cosinum AB, & ut cosinus DE ad cosinum BD. Ergo alternando cosinus AE ad cosinum DE, ut cosinus AB ad cosinum DB. Quare.

261. X. *Cosinus segmentorum basis, ut cosinus laterum adjacentium.*

262. Ex can. 5. alternando, radius ad cosinum BE, ut sinus ABE ad cosinum A, & ut sinus DBE ad cosinum D. Igitur alternando, sinus ABE ad sinum DBE, ut cosinus A ad cosinum D. Quare.

263. XI. *Sinus segmentorum verticis, ut cosinus angulorum adjacentium.*

264. In hisce novis 5 canonibus habentur alie quinque

TRIGONOMETRIA: 185

que combinationes laterum, angulorum, segmentorum tam basis, quam verticis, nimirum in combinatione.

- | | |
|---|----------|
| 7. <i>Latera, & anguli inter se.</i> | Can. 7. |
| 8. <i>Latera, & segmenta verticis</i> | Can. 8. |
| 9. <i>Latera, & segmenta basis.</i> | Can. 10. |
| 10. <i>Anguli, & segmenta verticis.</i> | Can. 11. |
| 11. <i>Anguli, & segmenta basis.</i> | Can. 9. |

265. Superest combinatio segmentorum verticis, cum segmentis basis, pro qua admodum facile canon eruitur ex can. 3. Est enim ex eo alternando, Radius ad sinum BE, ut tangens anguli ABE ad sinum AE, & ut tangens anguli BDE ad sinum DE. Igitur alternando; tangens ABE ad tangentem DBE, ut sinus AE ad sinum DE. Quare *Tangentes segmentorum verticis, ut sinus segmentorum basis adjacentium*. Sed hic canon hic nobis usui non erit, adeoque cum in hac serie canonum non ponimus.

266. Porro hi canones inventis jam ope triangulorum rectangulorum segmentis usui erunt, ut infra patebit; at ex iis binos alios deducemus, ex quibus ipsa etiam in binis casibus segmenta inveniantur.

267. Ex can. 10. sumendo summas & differentias terminorum, erit summa cosinum segmentorum basis ad differentiam, ut summa cosinum laterum ad differentiam. Quare (per num. 31.)

268. XII. *Cotangens semisumma segmentorum basis, sive cotangens dimidia basis, ad tangentem semidifferentia, ut cotangens semisumma laterum ad tangentem semidifferentia.*

269. Ex can. 11. pariter summa sinuum segmentorum verticis ad differentiam, ut summa cosinum angulorum ad differentiam. Quare (per n. 31.)

270. XIII. *Tangens semisumma segmentorum verticis, sive tangens dimidii anguli verticalis, ad tangentem semidifferentia, ut cotangens semisumma reliquorum angulorum ad tangentem semidifferentia.*

271. Neperus, & alii passim pro can. 12. proponunt hunc

hunc. *Tangens semisumma segmentorum basis, sive tangens dimidia basis, ad tangentem semisummam laterum, ut tangens semidifferentia ipsorum ad tangentem semidifferentia segmentorum basis*; ac ipsum demonstrant ex principiis Conicis. Nos cum facile admodum deducere possumus ex nostro canone 12. Prius enim alternando fit: *Cotangens dimidia basis ad cotangentem semisummam laterum, ut tangens semidifferentia segmentorum basis ad tangentem semidifferentia laterum*. Tum pro ratione cotangentis dimidia basis, ad cotangentem semisummam laterum, ponendo (per n. 17.), rationem tangentis huius ad tangentem illius habetur: *Tangens semisumma laterum ad tangentem dimidia basis, ut tangens semidifferentia segmentorum ipsius basis ad tangentem semidifferentia laterum*. Demum invertendo habetur ipsum Neperianum theorema. Sed quoniam hic noster idem prorsus officium præstat; eo, qui sponte propemodum profuit, utemur potius, quam Neperiano.

272. Præter hosce canones erit ad resolutionem necessaria etiam tertia regula, quæ determinet, quandonam perpendicularum cadat intra basim, quando vero extra. Eruetur autem sic.

273. Ex reg. 1. tam angulus BAE, quam BDE sunt ejusdem speciei cum arcu BE. Igitur si anguli BAD, BDA fuerint ejusdem speciei; jacebit punctum E intra basim AD, congruentibus angulis BDA, BDE, ac angulis BAD, BAE. Si vero fuerint diversæ speciei; cadet extra, ut in triangulo ABd, ubi cadit in E, vel e extra basim Ad ita, ut angulo BAd non habente eandem speciem cum BdA, tam stAE, quam BdE eandem habeant, ac pariter tam BAe, quam Bde eandem. Quare.

274. Reg. 3. Si duo anguli ad basim fuerint ejusdem speciei, perpendicularum intra basim cadet; si diverse, extra.

P R O B L E M A.

275. In triangulo sphaerico obliquangulo tribus datis reliqua invenire.

276. Sex casus complectitur hoc Problema, 1., in quo
dentur

dentur bina latera angulo intercepto, 2. Bina latera cum angulo alteri eorum opposito, 3. Bini anguli cum latere intercepto, 4. Bini anguli cum latere alteri eorum opposito, 5. tria latera, 6. Tres anguli. Omnium solutio habebitur ope canonum, quos demonstravimus, excurrendo per casus singulos.

277. Ante tamen notandum est, in primo, & tertio casu Problema semper esse possibile, ac ita determinatum, ut unicam solutionem admittat. Facto enim utcumque angulo A , & assumptis, ut libuerit lateribus AB , AD , poterit per B , & D duci circulus maximus (per n. 129), qui erit unicus, cum planum transiens per puncta B , D , & centrum sphaerae non in directum iacentia sit unicum (per num. 7. Solid.), ac id ipsum ejus circuli sit planum (per num. 130). Pariter facto quovis angulo ad A , assumpto quovis latere AD , quod sit minus semicirculo AD , & facto in D quovis angulo ope semicirculi DBd , hic semicirculo ABd occurreret alicubi necessario in B , & triangulum absolveret.

278. Secundus, & quartus casus possunt habere, vel binas solutiones, vel unicam vel nullam: Sit enim datus angulus BAE , & datum latus AB : ut habeatur propositum triangulum oportet ex B ita applicare arcum BD , ut in secundo casu ipse sit aequalis alteri dato lateri, in quarto vero casu efficiat angulum BDA aequalem dato. Porro ex nu. 245, & 250 facile eruitur id aliquando esse impossibile, aliquando unicam solutionem habere posse, aliquando vero binas.

279. Si latus datum vel datus angulus distet a quadrante magis quam arcus BE , qui ex datis angulo A & arcus AB facile invenitur (per combin. 4.); casus erit prorsus impossibilis, & in resolutione ejus trianguli, methodo, quam trademus infra, obveniet aliquis finis radio major,

280. Si aequae, vel minus distiterit applicabitur quidem arcus BD in una vel pluribus positionibus; sed ad hoc ut triangulum propositum sit possibile, oportet punctum D cadat in semicirculum AE , & binorum angu-

angulorum, qui sunt ad D is, qui respicit A , æque-
tur dato.

281. Quæ ad id condiciones requirantur facile erit
determinare considerando ipsos numeros 245, & 250,
pro varia specie arcus AB & anguli A . Sit angulus BAE
acutus, & arcus AB quadrante minor ut figura exhibet;
eritque per reg. 1. etiam BE quadrante minor ac (per num.
241) arcuum omnium, qui ex B applicari possunt, mi-
nimus, & (per reg. 2.) AE pariter quadrante minor, a-
deoque assumptis quadrantibus EI , Ez , cadet punctum
 I in semicirculum AE , punctum z in Aa .

282. Hinc in secundo casu, si latus datum sit æquale
 BE ; solutio erit unica puncto D abeunte in E ; si idem
sit majus, quam BE , sed adhuc minus, quam BA ; so-
lutio erit duplex: nam poterit arcus BD applicari vel
citra E versus A , vel ut exhibet figura, ultra E versus
 a . Si sit æquale BA , vel eo majus; sed adhuc minus
quam Ba , non poterit BD applicari versus A , poterit
autem versus a , & solutio erit unica. Si demum sit
æqualis Ba , vel adhuc major, applicari jam non po-
terit, nec versus A , nec versus a , & casus iterum erit
impossibilis.

283. At in casu quarto, si anguli dati fuerit mensu-
ra arcus BE ; poterit applicari BD , abeunte D in I , & z ,
sed sola applicatio in I Problemati inserviet, adeoque so-
lutio erit unica. Si angulus sit aliquanto major, sed ad-
huc minor angulo BaE , sive dato BAE ; binæ erunt so-
lutiones, puncto D cadente in arcum IA , vel ut figura ex-
hibet in IA . Si is æqualis fuerit ipsi BaE nimirum BAE ;
vel etiam major eodem, sed adhuc minor angulo BAa
ejus complemento ad duos rectos; solutio erit unica, pun-
cto D cadente in arcum IA , cadet enim in arcum IE , si
fuerit acutus, in punctum E si rectus, in arcum EA , si
obtusus. Quod si ipsi angulo BaE fuerit æqualis, vel eum
excesserit; iterum casus fiet impossibilis.

284. Eodem pacto facile est ex iisdem principiis de-
rivare (quando in iis casibus nulla solutio habeatur quan-
do unica, quando binæ; sive arcus AB quadrantem ex-
cesse-

fuerit, vel angulus BAE excefferit rectum, vel conti-
 nerit utrumque simul. Verum solutio ipsa idem præbe-
 bit semper; nam in casu, in quo applicari non poterit
 arcus BD ullo pacto, obveniet sinus aliquis radii major:
 in casu vero, in quo is quidem applicari poterit, sed
 punctum D cadet extra semicirculum AE, binorum seg-
 mentorum AE, ED, vel ABE, DBE summa excedet gra-
 dus 180, puncto D abeunte ultra e, vel differentia e-
 raderet negativa, eodem cadente citra A.

285. In quinto casu Problema erit semper possibile
 quomodo bina quævis latera tertio majora sint, & in
 octavo dummodo angulorum summa sit minor sex re-
 ctis, & major binis, ac in utroque casu Problema
 erit determinatum, & unicam solutionem admittere ut
 colligitur ex num. 173, 176, & ex ipsa solutione pa-
 rebit.

286. Sed jam aggrediamur solutionem ipsam percur-
 rendo singulos casus. In primis autem quatuor semper
 pro A sumendus est angulus datus, & pro AB latus da-
 tum, ex quibus segmentum AE, vel ABE eruetur resol-
 vendo triangulum rectangulum AEB, In reliquis seg-
 menta invenientur per canones postremos.

287. *Casus 1.* Dentur bina latera cum angulo inter-
 cepto: duo queri possunt, 1.^o latus tertium, 2.^o an-
 gulus utrilibet lateri dato oppositus.

288. Queratur 1.^o latus tertium. Sume pro A an-
 gulum datum; eruatque data latera AB, AD, & que-
 retur BD. Ex datis in triangulo rectangulo AEB basi
 AB, & angulo A quære AE (per combin. 3) & si for-
 te id evaserit æquale arcui AD; abibit D in E, & tri-
 angulum erit rectangulum ad D: si minus; perpendi-
 culum BE cadet intra basim AD: si majus, extra. In-
 vento segmento AE, habebis & ED ob datum arcum
 AD. Ex segmentis AE, ED, & latere AB invenies co-
 sinum BD (per combin. 9, & can. 10): Ex dato A ha-
 bes speciem BE (per reg. 1.). Ex ipsa, & specie ED ha-
 bes speciem BD (per reg. 2.).

289. Queratur 2.^o angulus utervis. Assume pro AB
 latus

latus ipsi oppositum, pro AD alterum latus datum ipsi adjacens, eritque A datum, D quæsitus angulus. Quære segmenta AE, ED ut prius. Ex iis & angulo A (per combin. 11. can. 9) invenies tangentem D. Species autem anguli D erit eadem ac A, vel diversa (per reg. 3), prout segmentum AE obvenierit majus, vel minus basi AD.

290. *Casus 2.* Dantur bina latera cum angulo opposito alteri ex iis: tria quæri possunt, 1.^o tertium latus, 2.^o angulus datis lateribus interceptus, 3.^o angulus alteri lateri oppositus.

291. Quærat^{ur} 1.^o tertium latus. Sume pro A angulum datum, pro AB latus ipsi adjacens: eritque datum & latus BD, ac quæsetur AD. Invenies AE, ut num. 288: Ex datis lateribus AB, BD, & segmento AE, invenies (per combin. 9, can. 10) cosinum ED, qui cosinus si obvenierit æqualis radio, erit $ED = 0$, & punctus D abeunte in E, triangulum rectangulum ad D. Ex specie BE, (quæ est eadem ac BAE), & BD invenies speciem ED (per reg. 2.). Sed quoniam aliquando haberi poterit duplex solutio hinc inde ab E, subtrahæ ED ab EA, & habebis primam, adde & habebis secundam. Si forte AD ex subtractione evaserit $= 0$, vel negativa ob AE æqualem ipsi ED vel minorem, vel ex additione evaserit æqualis, vel major semicirculo ob ED æqualem vel majorem EA; eam solutionem rejice abibit enim in primo casu D in A vel citra ipsum, in secundo in a vel ultra ipsum, juxta num. 284.

292. Quærat^{ur} 2.^o angulus ABD interceptus. Ex datis AB, & A quære segmentum verticis ABE (per combin. 2.). Ex lateribus AB, BD, & segmento verticis ABE invenies (per combin. 8, can. 8.) cosinum EBD, qui cosinus si fuerit æqualis radio, erit pariter DBE $= 0$, & triangulum rectangulum ad D. Ex BD dato, & specie BE communi angulo dato BAE invenies speciem DBE (per reg. 2.). Subduc. DBE, ab ABE, & habebis primam solutionem; adde, & habebis alteram: Si angulus ABD, ex subtractione evaserit $= 0$, vel negativus, vel ex additione æqualis, aut major duobus rectis, eam solutionem rejice, ut prius.

293. Quærat^{ur} 3.^o angulus D oppositus lateri AB. E lateribus AB, BD & angulo A invenies (per combin. 7. can. 7.) sinum D: species in secundâ solutione erit eadem ac A, in primâ diversa, (per reg. 3.).

294. *Casus* 3. Dantur bini anguli tum latere intercepto: duo quæri possunt, 1.^o tertius angulus, 2.^o latus utrilibet angulo oppositum.

295. Quærat^{ur} 1.^o tertius angulus. Sume pro latere AB latus datum, eruntque dati anguli A, & B, ac quæretur D. Ex datis AB, & A quære segmentum verticis ABE, (per combin. 2.), quod segmentum si evaserit æquale angulo ABD, punctum D abibit in E, & triangulum erit rectangulum ad D, si minus, perpendicularum BE cadet intra basim BD; si majus, extra. Invento segmento ABE, habebis est DBE ob datum totum ABD. E segmentis ABE, DBE, & angulo A invenies (per comb. 10. can. 11.) cosinum D. Is erit ejusdem speciei cum A, si ABE fuerit minor, quam ABD, perpendicularum BE cadente intra basim, diversæ, si major.

296. Quærat^{ur} secundo latus utrumvis. Assume pro A angulum ipsi oppositum, pro ABD alterum angulum ipsi adjacentem; eritque AB latus datum, BD quæsitum. Quære segmenta ABE, DBE, ut prius. Ex iis, & latere AB, (per combin. 8. can. 8.), invenies tangentem BD. Ejus speciem invenies (per reg. 2), e specie DBE inventa, & specie BE, quæ est eadem, ac anguli dati A.

297. *Casus* 4. Dantur bini anguli cum latere opposito alteri ex iis: tria quæri possunt, 1.^o tertius angulus, 2.^o latus datis angulis interceptum, 3.^o latus alteri angulo oppositum.

298. Quærat^{ur} 1.^o tertius angulus. Sume pro AB latus datum, pro A angulum datum ipsi adjacentem; eritque datus etiam angulus D, & quæretur ABD. Invenies ABE, ut num. 295. Ex datis angulis A, D, & segmento ABE invenies (per combin. 10. can. 11.) sinum DBE, qui in eo casu non poterit evadere 0, existente angulo D obliquo. Ejus autem species erit indeter-

determinata, cum solum detur species lateris BE eadem, ac anguli A; & species anguli D oppositi ipsi lateri BE in triangulo BDE, qui est casus ambiguus trianguli rectanguli (per num. 209.). Inde autem colligitur posse aliquando haberi duplicem solutionem, puncto D cadente hinc, vel inde ab I, vel 2. Quare poterit assumi segmentum DBE tam acutum, quam obtusum. Si autem angulus D fuerit ejusdem speciei cum A, debet ad habendos pro binis solutionibus binos angulos ABD, utrumque addi segmento ABE, ut (juxta reg. 3.), perpendiculum intra basim cadat. Si verò D fuerit diversæ speciei, debet utrumque subtrahi. Si ex additione non obvenierit angulus minor binis rectis, vel ex subtractione positivus; ex solutiones rejiciendæ erunt; abibit enim punctum D in ∞ , vel ultra ipsum, aut in A, vel citra ipsum, ut num. 291.

299. Quærat 1.^o latus AD interceptum. Ex datis AB, & A quære segmentum AE (per combin. 3.). Ex angulis A, D, & segmento AE invenies (per combin. 11. can. 9.) sinum ED. Species ipsius erit pariter indeterminata: assume valorem tam minorem, quam majorem quadrante, & adde segmento AE, vel subtrahes, prout angulus D habuerit eandem speciem, ac A, vel diversam, & habebis binas bases AD pro binis solutionibus. Sed si basis ipsa ex additione non obvenierit semicirculo minor, vel e subtractione non manserit positiva, eam solutionem rejice, ut prius.

300. Quærat 3.^o latus BD oppositum angulo A. Ex angulis A, D, & latere AB invenies (per combin. 7. can. 7.) sinum BD. Species altera adhibenda erit in altera e solutionibus, quam in triangulo rectangulo BED definit (per reg. 2) species BE cognita, nimirum eadem ac species A, una cum specie assumpta segmenti ED, sive segmenti EBD.

301. Casus 3. Dantur tria latera; potest quæri angulus quivis.

302. Sume pro A angulum quæsum, pro basi AD utrumvis latus ipsi adjacens. Ex datis AB, BD, & dimidia

midia basi AD invenies (per can. 12.) tangentem semidifferentiæ segmentorum AE, ED, quam semidifferentiam sumes quadrante minorem. Eam adde dimidiæ basi, & subtrahæ, & cum dimidia basis sit semisumma eorundem segmentorum, habebis (per num. 28.) bina segmenta AE, DE. Sed pro AE assumes segmentum illud, quod magis vel minus distet a quadrante, prout latus adjacens AB distabit pariter magis vel minus; cum nimirum (per can. 10.) sint: *Cosinus segmentorum basis*, ut *cosinus laterum adjacentium*, & arcus propioris quadranti cosinus sit minor (per n. 39.) Jam in triangulo rectangulo AEB ex AB, & AE invenies angulum BAE (per combin. 3. . Sed si AE habitum fuerit per subtractionem, & obvenerit negativum, perpendicularo BE cadente citra A, Angulus quæsitus BAD non erit idem, ac BAE, sed ejus complementum ad duos rectos.

303. *Casus 6.* Dentur tres anguli: potest quæri latus quodvis.

304. Sume pro AB latus quæsitum, pro vertice ABD utrumvis angulum ipsi adjacentem. Ex datis A, D & dimidio angulo verticali ABD invenies (per can. 13.) tangentem semidifferentiæ segmentorum ABE, EBD, quam semidifferentiam sumes quadrante minorem. Eam adde dimidio angulo verticali & subtrahæ, & cum dimidijs angulus verticalis sit semisumma eorundem segmentorum, habebis (per num. 28.) bina segmenta ABE, DBE. Sed pro ABE assumes segmentum illud, quod magis, vel minus distet ab angulo recto, prout e contrario angulus A adjacens distabit minus, vel magis; cum nimirum (per can. 11.) sint sinus segmentorum verticis, ut cosinus angulorum adjacentium, & arcus propioris quadranti cosinus sit minor, sinus major (per num. 39.) . Jam in triangulo rectangulo AEB ex AB, & ABE invenies angulum BAE (per combin. 2.) . Sed si ABE habitum fuerit per subtractionem, & obvenerit negativum, perpendicularo BE cadente citra A, angulus quæsitus BAD non erit idem, ac BAE, sed ejus complementum ad duos rectos.

Scholion 1.

305. Licebit inter se conferre solutiones casus 1, 3, 5, cum 2, 4, 6, quæ ita sibi respondent, ut sæpe eadem prorsus verba adhibeantur. Plerumque solent demonstrare insignem proprietatem triangulorum sphaericorum ac eam in solutione adhibere. Si nimirum in quovis triangulo latera mutantur in angulos, anguli viceversa mutantur in latera, & e contrario. Sed in ea mutatione in novo triangulo angulis quibusdam, vel lateribus substituenda sunt eorum complementa ad duos rectos. Hinc expositis casibus 1, 3, 5, ad eos reducant reliquos tres ope ejusmodi transformationis. Sed quoniam & transformationis ipsius demonstratio, & determinatio casuum, in quibus lateri, vel angulo transformato substitui debeat ejus complementum ad duos rectos, est aliquanto operosior, & per nostros canones æque facile immediate solvuntur posteriores tres casus, ac priores tres; libuit potius hanc aliam adhibere methodum, quæ multo & expeditior est visa, & magis concinna.

306. Pariter cum secantium Logarithmi in tabulis adscribi non soleant, consulto ubique secantes vitavimus, per solos sinus, & tangentes re perfecta.

307. In quinti & sexti casus solutione semidifferentiam ex tangente deduximus minorem 90° . Potuisset assumi etiam major, & solutio eadem prorsus obvenisset. Secto enim arcu AD bifariam in L, si in casu quinto pro semidifferentia LE, assumptum fuisset ejus complementum ad duos rectos, nimirum L^c ; pro segmentis AE, DE obvenissent segmenta AE, DE, & in triangulo quidem rectangulo BAe inventus fuisset angulus BAe, complementum ad duos rectos anguli BAE; sed angulus BAD obvenisset idem. Præstat tamen adhibere semidifferentiam minorem 90° ; tum quia immediate eruitur e tabulis, tum quia ob AL quoque minorem quadrante numquam segmentum ex additione proveniens semicirculum excedet, qui aliquando excederetur, ut in ipso casu hujus figuræ segmentum DEa

pro-

proveniret semicirculo majus, pro quo, ad conferenda ipsa segmenta inter se, sumendum esset De ejus complementum ad circulum, cum in vulgari Trigonometria, nec anguli, nec arcus semicirculo majores considerari soleant, ac eadem est ratio pro casu 6.

Scholion 2.

308. In quibusdam casibus solutiones aliquando faciliores haberi possunt. Si bina latera BA, BD essent inter se æqualia, vel bini anguli A, D æquales; perpendicularum BE secaret bisariam basim AD, & angulum ABD. Nam (per num. 244) bini arcus AB, BD possunt esse æquales solum in æquali hinc inde distantia a puncto E, & ibi anguli EBD, EBA, quorum species debet (per reg. 1.) esse eadem ac species EA, ED, erunt ejusdem speciei; functiones vero æquales habebunt (per can. 8.); adeoque & inter se æquales erunt. Si autem assumatur $ID = Ia$, erit angulus BDE = BAE (per num. 248), adeoque = BAE, per n. 157), nec usquam alibi in semicirculo AEa constitui poterit angulus ipsi BAE æqualis. Cum autem quadrans EI sit æqualis dimidio semicirculo ADa, & arcus DI dimidio Da, erit DE æqualis dimidio AD, adeoque æqualis AE, & inde eodem argumento etiam ABE = DBE. Porro satis patet, quanto facilius inde solutio debeat profluere in hujusmodi triangulis Isosceliis.

309. Quod si aliquo triangulo derur latus quadranti æquale admodum facile dato triangulo substituitur aliud, quod rectangulum sit, & quo resolutio, illud etiam resolvitur. Capto enim quadrante AE, & per B, & E ducto circulo maximo, erunt (per n. 162) anguli AEB, ABE recti, & latus BE mensura anguli A; ac proinde arcus ED, & angulus EBD erunt complementa arcus AD, & anguli ABD. Datis igitur iis, quæ pertinent ad triangulum ABD, dantur ea, quæ pertinent ad BED, & hoc resolutio illud resolvitur.

Scholion.

Ut unico conspectu pateant, omnia, quæ ad usum

spectant, apponemus hic canones, cum combinationibus, & regulas,

Pro triangulis rectangulis

- I. Radius ad sinum anguli, at sinus basis ad sinum lateris oppositi.
 - II. Radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis.
 - III. Radius ad tangentem anguli, ut sinus lateris adjacentis ad tangentem oppositi.
 - IV. Radius ad cosinum unius lateris, ut cosinus alterius ad cosinum basis.
 - V. Radius ad sinum anguli adjacentis, ut cosinus lateris ad cosinum anguli oppositi.
 - VI. Radius ad tangentem unius anguli, ut cosinus basis ad cotangentem alterius.
- Reg. I. Latera sunt ejusdem speciei cum angulis oppositis.
- Reg. II. Si duo latera vel duo anguli, vel latus cum angulo adjacente fuerint ejusdem speciei; basis erit quadrante minor, si diversa, major, & viceversa.

| | | |
|---------|--|-----------------------------|
| | 1. Basis cum utroque latere: | Can. 4. Reg. 2. pars 1. |
| Combin. | 2. Basis cum utroque angulo: | Can. 6. Reg. 2. pars 2. |
| | 3. Basis cum latere, & angulo adjacente: | Can. 2. Reg. 2. pars 3. |
| | 4. Basis cum latere, & angulo opposito: | Can. 1.) |
| | |) Reg. 1. |
| Combin. | 5. Utrumque latus cum altero angulo: | Can. 3.) vel nullum in casu |
| | 6. Uterque angulus cum altero latere: | Can. 5.) si ambiguo. |

Pro obliquangulis.

VII. Sinus angulorum, ut sinus laterum oppositorum.

VIII. Cosinus segmentorum verticis, ut tangentes laterum oppositum.

IX. Sinus segmentorum basis ut tangentes angulorum oppositorum.

X. Cosinus segmentorum basis, ut cosinus laterum adjacentium.

XI. Sinus segmentorum verticis, ut cosinus angulorum adjacentium.

Reg. III. Si duo anguli ad basim fuerint ejusdem speciei perpendicularum intra basim cadet; si diversa, extra.

7. Latera, & anguli. can. 7.

8. Latera, & segmenta verticis can. 8.

Combin. 9. Latera, & segmenta basis. can. 10.

10. Anguli, & segmenta verticis. can. 11.

11. Anguli, & segmenta basis. can. 9.

Pro inveniendis segmentis in casu datorum
laterum, vel angulorum.

XII. Cotangens dimidia basis ad tangente in semidifferentia segmentorum, ut cotangens semisumma laterum ad tangentem semidifferentia.

XIII. Tangens dimidii anguli verticalis ad tangentem semidifferentia segmentorum, ut cotangens semisumma angulorum ad basim ad tangentem semidifferentia.

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

| Gr. | Sinus | Tangen. | Secantes | Log. Sin. | Log. Tang. |
|-----|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 100000.00 | —Infin. | —Infin. |
| 1 | 1745.24 | 1745.51 | 100015.23 | 8.2418553 | 8.2419215 |
| 2 | 3489.95 | 3492.08 | 100060.95 | 8.5428192 | 8.5430838 |
| 3 | 5233.60 | 5240.78 | 100137.23 | 8.7188002 | 8.7193958 |
| 4 | 6975.65 | 6992.68 | 100244.19 | 8.8435845 | 8.8446437 |
| 5 | 8715.57 | 8748.87 | 100381.28 | 8.9402960 | 8.9419518 |
| 6 | 10452.85 | 10510.42 | 100550.82 | 9.0192346 | 9.0216202 |
| 7 | 12186.93 | 12278.46 | 100750.99 | 9.0818945 | 9.0891438 |
| 8 | 13917.31 | 14054.08 | 100982.76 | 9.1435553 | 9.1478025 |
| 9 | 15643.45 | 15837.44 | 101246.51 | 9.1943324 | 9.1997125 |
| 10 | 17364.82 | 17632.70 | 101542.67 | 9.2396702 | 9.2463188 |
| 11 | 19080.90 | 19438.03 | 101871.68 | 9.2805988 | 9.2886523 |
| 12 | 20791.17 | 21255.65 | 102234.07 | 9.3178789 | 9.3274745 |
| 13 | 22495.11 | 23086.82 | 102630.39 | 9.3520880 | 9.3633641 |
| 14 | 24192.19 | 24932.80 | 103061.35 | 9.3836752 | 9.3967711 |
| 15 | 25881.90 | 26794.92 | 103527.62 | 9.4129962 | 9.4280525 |
| 16 | 27563.74 | 28974.54 | 104029.94 | 9.4403381 | 9.4574964 |
| 17 | 29237.17 | 30573.07 | 104569.18 | 9.4658353 | 9.4853390 |
| 18 | 30901.70 | 32491.97 | 105146.22 | 9.4899824 | 9.5117766 |
| 19 | 32556.82 | 34452.26 | 105762.07 | 9.5126419 | 9.5369719 |
| 20 | 34202.02 | 36397.02 | 106417.78 | 9.5340519 | 9.5610659 |
| 21 | 35836.79 | 38386.40 | 107114.50 | 9.5543294 | 9.5841774 |
| 22 | 37460.66 | 40402.62 | 107853.47 | 9.5735754 | 9.6064096 |
| 23 | 39073.11 | 42447.49 | 108636.04 | 9.5918780 | 9.6278519 |
| 24 | 40673.66 | 44522.87 | 109463.63 | 9.6093133 | 9.6485831 |
| 25 | 42261.83 | 46630.77 | 110337.79 | 9.6259483 | 9.6686725 |

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

| Gr. | Sinus. | Tangen. | Secantes | Log. Sin. | Log. Tang. |
|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 90 | 100000.00 | Infin. | Infin. | 10.0000000 | Infin. |
| 89 | 99984.77 | 5718996.16 | 5719868.85 | 9.9999338 | 11.7580785 |
| 88 | 99939.08 | 2563625.33 | 1865370.83 | 9.9998354 | 11.4569162 |
| 87 | 99862.95 | 1908113.67 | 1910732.26 | 9.9994044 | 11.2806042 |
| 86 | 99756.40 | 1430066.63 | 1433558.70 | 9.9989408 | 11.1553563 |
| 85 | 99619.47 | 1143005.23 | 1147371.22 | 9.9983442 | 11.0580482 |
| 84 | 99452.18 | 951436.45 | 956677.22 | 9.9976143 | 10.9783798 |
| 83 | 99254.62 | 814434.64 | 820550.90 | 9.9967507 | 10.9108562 |
| 82 | 99026.80 | 711536.97 | 718429.65 | 9.9957528 | 10.8521975 |
| 81 | 98768.83 | 631375.15 | 639245.32 | 9.9946199 | 10.8002875 |
| 80 | 98480.77 | 567128.18 | 575877.05 | 9.9933515 | 10.7536812 |
| 79 | 98162.71 | 514455.40 | 524084.31 | 9.9919466 | 10.7113477 |
| 78 | 97814.76 | 470463.01 | 480973.48 | 9.9904044 | 10.6725255 |
| 77 | 97437.01 | 433147.59 | 444541.15 | 9.9887239 | 10.6366359 |
| 76 | 97029.57 | 401078.09 | 413356.55 | 9.9869008 | 10.6032289 |
| 75 | 96592.58 | 372205.08 | 386320.33 | 9.9849438 | 10.5719475 |
| 74 | 96126.17 | 348741.44 | 362795.53 | 9.9828416 | 10.5425036 |
| 73 | 95630.48 | 328075.26 | 342030.36 | 9.9805963 | 10.5146610 |
| 72 | 95105.65 | 307768.35 | 323606.80 | 9.9782063 | 10.4882240 |
| 71 | 94551.85 | 290421.09 | 307155.35 | 9.9756701 | 10.4630281 |
| 70 | 93969.26 | 274747.74 | 292380.44 | 9.9729858 | 10.4389341 |
| 69 | 93358.04 | 260508.21 | 279041.82 | 9.9701517 | 10.4158226 |
| 68 | 92718.39 | 247508.69 | 266946.72 | 9.9671659 | 10.3935904 |
| 67 | 92050.49 | 235585.24 | 255930.47 | 9.9640261 | 10.3721481 |
| 66 | 91354.54 | 224603.68 | 245859.33 | 9.9607302 | 10.3514169 |
| 65 | 90630.78 | 214450.69 | 236620.16 | 9.9572757 | 10.3313275 |

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUM.

| Gr. | Sinus | Tangen. | Secantes | Log. Sin. | Log. Tang. |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 26 | 43837.12 | 48773.26 | 111260.19 | 9.6418420 | 9.6881818 |
| 27 | 45399.05 | 50952.54 | 112232.62 | 9.6570468 | 9.7071659 |
| 28 | 46947.16 | 53170.94 | 113257.01 | 9.6716093 | 9.7256744 |
| 29 | 48480.96 | 55430.09 | 114335.41 | 9.6855712 | 9.7437520 |
| 30 | 50000.00 | 57735.03 | 117735.05 | 9.6989700 | 9.7614394 |
| 31 | 51503.81 | 60086.08 | 116663.34 | 9.7118393 | 9.7787737 |
| 32 | 52991.93 | 62486.94 | 117917.84 | 9.7242097 | 9.7957892 |
| 33 | 54463.90 | 64940.76 | 119236.33 | 9.7361088 | 9.8125174 |
| 34 | 55919.29 | 67450.85 | 120621.80 | 9.7475617 | 9.8289874 |
| 35 | 57357.64 | 70020.75 | 122077.46 | 9.7585913 | 9.8452268 |
| 36 | 58778.53 | 72654.26 | 123606.80 | 9.7692187 | 9.8612610 |
| 37 | 60181.50 | 75355.40 | 125213.57 | 9.7794630 | 9.8771144 |
| 38 | 61566.15 | 78128.56 | 126901.82 | 9.7893420 | 9.8928698 |
| 39 | 62938.04 | 80978.40 | 128675.96 | 9.7988718 | 9.9083692 |
| 40 | 64278.76 | 83909.96 | 130540.73 | 9.8080975 | 9.9238135 |
| 41 | 65605.90 | 86928.68 | 131501.30 | 9.8169429 | 9.9391631 |
| 42 | 66913.06 | 90040.41 | 134563.27 | 9.8255109 | 9.9544374 |
| 43 | 68199.84 | 93257.51 | 136732.75 | 9.8337833 | 9.9696559 |
| 44 | 69465.84 | 96568.88 | 139016.36 | 9.8417713 | 9.9848371 |
| 45 | 70710.68 | 100000.00 | 141421.36 | 9.8494850 | 10.0000000 |

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

| Gr. | Sinus | Tangen. | Secantes | Log. Sin. | Log. Tang. |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 64 | 89879.40 | 205030.38 | 218117.20 | 9.9536602 | 10.3118481 |
| 63 | 89100.65 | 196261.05 | 220268.93 | 9.9498809 | 10.2928341 |
| 62 | 88294.76 | 188072.65 | 213005.45 | 9.9459349 | 10.2743256 |
| 61 | 87461.97 | 180404.78 | 206266.53 | 9.9418193 | 10.2562480 |
| 60 | 86602.54 | 173205.08 | 200000.00 | 9.9375306 | 10.2385606 |
| 59 | 85716.73 | 166427.95 | 194160.40 | 9.9330646 | 10.2212263 |
| 58 | 84804.81 | 160033.45 | 188707.99 | 9.9284205 | 10.2042108 |
| 57 | 83867.06 | 153986.50 | 183607.84 | 9.9235914 | 10.1874826 |
| 56 | 82903.76 | 148256.10 | 178829.16 | 9.9185742 | 10.1710126 |
| 55 | 81915.21 | 142814.80 | 174344.68 | 9.9133645 | 10.1547732 |
| 54 | 80901.70 | 137638.19 | 170130.16 | 9.9079576 | 10.1387390 |
| 53 | 79863.55 | 132704.48 | 166164.01 | 9.9023486 | 10.1228556 |
| 52 | 78801.08 | 127994.16 | 162426.92 | 9.8965321 | 10.1071902 |
| 51 | 77714.60 | 123489.72 | 158901.57 | 9.8905026 | 10.0916308 |
| 50 | 76604.44 | 119175.36 | 155572.38 | 9.8843540 | 10.0761865 |
| 49 | 75470.56 | 115036.84 | 152425.31 | 9.8777799 | 10.0608369 |
| 48 | 74314.48 | 111061.25 | 149447.65 | 9.8710735 | 10.0455626 |
| 47 | 73135.37 | 107236.87 | 146627.92 | 9.8641275 | 10.0303441 |
| 46 | 71933.98 | 103553.03 | 143955.65 | 9.8569341 | 10.0151628 |
| 45 | 70710.68 | 100000.00 | 141421.36 | 9.8494850 | 10.0000000 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 1 | 0.0000000 | 34 | 1.5314789 | 67 | 1.8260748 |
| 2 | 0.3010300 | 35 | 1.5440680 | 68 | 1.8325089 |
| 3 | 0.4771213 | 36 | 1.5563025 | 69 | 1.8388491 |
| 4 | 0.6020600 | 37 | 1.5682017 | 70 | 1.8450980 |
| 5 | 0.6989700 | 38 | 1.5797836 | 71 | 1.8512583 |
| 6 | 0.7781512 | 39 | 1.5910646 | 72 | 1.8573325 |
| 7 | 0.8450980 | 40 | 1.6020600 | 73 | 1.8633225 |
| 8 | 0.9030900 | 41 | 1.6127839 | 74 | 1.8692347 |
| 9 | 0.9542425 | 42 | 1.6232493 | 75 | 1.8750613 |
| 10 | 1.0000000 | 43 | 1.6334685 | 76 | 1.8808136 |
| 11 | 1.0413927 | 44 | 1.6434527 | 77 | 1.8864907 |
| 12 | 1.0791812 | 45 | 1.6532125 | 78 | 1.8920946 |
| 13 | 1.1139433 | 46 | 1.6627578 | 79 | 1.8976271 |
| 14 | 1.1461280 | 47 | 1.6720979 | 80 | 1.9030900 |
| 15 | 1.1760913 | 48 | 1.6812412 | 81 | 1.9084850 |
| 16 | 1.2041200 | 49 | 1.6901961 | 82 | 1.9138138 |
| 17 | 1.2304489 | 50 | 1.6989700 | 83 | 1.9190788 |
| 18 | 1.2552725 | 51 | 1.7075702 | 84 | 1.9242793 |
| 19 | 1.2787536 | 52 | 1.7160033 | 85 | 1.9294189 |
| 20 | 1.3010300 | 53 | 1.7242752 | 86 | 1.9344984 |
| 21 | 1.3222193 | 54 | 1.7323938 | 87 | 1.9395192 |
| 22 | 1.3424227 | 55 | 1.7403627 | 88 | 1.9444827 |
| 23 | 1.3617278 | 56 | 1.7481880 | 89 | 1.9493900 |
| 24 | 1.3802112 | 57 | 1.7558749 | 90 | 1.9542425 |
| 25 | 1.3979400 | 58 | 1.7634280 | 91 | 1.9590414 |
| 26 | 1.4149733 | 59 | 1.7708520 | 92 | 1.9637878 |
| 27 | 1.4313638 | 60 | 1.7781512 | 93 | 1.9684829 |
| 28 | 1.4471580 | 61 | 1.7853298 | 94 | 1.9731279 |
| 29 | 1.4623980 | 62 | 1.7923917 | 95 | 1.9777236 |
| 30 | 1.4771213 | 63 | 1.7993405 | 96 | 1.9822712 |
| 31 | 1.4913617 | 64 | 1.8061800 | 97 | 1.9867717 |
| 32 | 1.5051500 | 65 | 1.8129134 | 98 | 1.9912261 |
| 33 | 1.5185139 | 66 | 1.8195439 | 99 | 1.9956352 |
| 34 | 1.5314789 | 67 | 1.8260748 | 100 | 1.0000000 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 101 | 2.0043214 | 134 | 2.1271048 | 167 | 2.2227165 |
| 102 | 2.0086002 | 135 | 2.1303338 | 168 | 2.2253093 |
| 103 | 2.0128372 | 136 | 2.1335389 | 169 | 2.2278867 |
| 104 | 2.0170333 | 137 | 2.1367206 | 170 | 2.2304489 |
| 105 | 2.0211893 | 138 | 2.1398791 | 171 | 2.2329961 |
| 106 | 2.0253059 | 139 | 2.1430148 | 172 | 2.2355284 |
| 107 | 2.0293838 | 140 | 2.1461280 | 173 | 2.2380461 |
| 108 | 2.0334238 | 141 | 2.1492191 | 174 | 2.2405492 |
| 109 | 2.0374265 | 142 | 2.1522883 | 175 | 2.2430380 |
| 110 | 2.0413927 | 143 | 2.1553360 | 176 | 2.2455127 |
| 111 | 2.0453230 | 144 | 2.1583625 | 177 | 2.2479733 |
| 112 | 2.0492180 | 145 | 2.1613680 | 178 | 2.2504200 |
| 113 | 2.0530784 | 146 | 2.1643529 | 179 | 2.2528530 |
| 114 | 2.0569049 | 147 | 2.1672173 | 180 | 2.2552725 |
| 115 | 2.0606976 | 148 | 2.1702617 | 181 | 2.2576786 |
| 116 | 2.0644580 | 149 | 2.1731863 | 182 | 2.2600714 |
| 117 | 2.0681859 | 150 | 2.1760913 | 183 | 2.2624511 |
| 118 | 2.0718820 | 151 | 2.1789769 | 184 | 2.2648178 |
| 119 | 2.0755470 | 152 | 2.1818436 | 185 | 2.2671717 |
| 120 | 2.0791812 | 153 | 2.1846914 | 186 | 2.2695129 |
| 121 | 2.0827854 | 154 | 2.1875207 | 187 | 2.2718416 |
| 122 | 2.0863598 | 155 | 2.1903317 | 188 | 2.2741578 |
| 123 | 2.0899051 | 156 | 2.1931246 | 189 | 2.2764618 |
| 124 | 2.0934217 | 157 | 2.1958996 | 190 | 2.2787536 |
| 125 | 2.0969100 | 158 | 2.1986571 | 191 | 2.2810334 |
| 126 | 2.1003705 | 159 | 2.2013971 | 192 | 2.2833012 |
| 127 | 2.1038037 | 160 | 2.2041200 | 193 | 2.2855573 |
| 128 | 2.1072100 | 161 | 2.2068259 | 194 | 2.2878017 |
| 129 | 2.1105897 | 162 | 2.2095150 | 195 | 2.2900346 |
| 130 | 2.1139433 | 163 | 2.2121876 | 196 | 2.2922561 |
| 131 | 2.1172713 | 164 | 2.2148438 | 197 | 2.2944662 |
| 132 | 2.1205739 | 165 | 2.2174839 | 198 | 2.2966652 |
| 133 | 2.1238516 | 166 | 2.2201081 | 199 | 2.2988531 |
| 134 | 2.1271048 | 167 | 2.2227165 | 200 | 2.3010300 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 201 | 2.3031961 | 234 | 2.3692159 | 267 | 2.4265113 |
| 202 | 2.3053541 | 235 | 2.3710679 | 268 | 2.4281346 |
| 203 | 2.3074960 | 236 | 2.3729120 | 269 | 2.4297523 |
| 204 | 2.3096302 | 237 | 2.3747483 | 270 | 2.4313638 |
| 205 | 2.3117539 | 238 | 2.3765770 | 271 | 2.4329693 |
| 206 | 2.3138672 | 239 | 2.3783979 | 272 | 2.4345699 |
| 207 | 2.3159703 | 240 | 2.3802112 | 273 | 2.4361646 |
| 208 | 2.3180633 | 241 | 2.3820170 | 274 | 2.4377506 |
| 209 | 2.3201463 | 242 | 2.3838154 | 275 | 2.4393327 |
| 210 | 2.3222193 | 243 | 2.3856063 | 276 | 2.4409091 |
| 211 | 2.3242825 | 244 | 2.3873898 | 277 | 2.4424798 |
| 212 | 2.3263359 | 245 | 2.3891661 | 278 | 2.4440448 |
| 213 | 2.3283790 | 246 | 2.3909351 | 279 | 2.4456042 |
| 214 | 2.3304138 | 247 | 2.3926970 | 280 | 2.4471580 |
| 215 | 2.3324385 | 248 | 2.3944517 | 281 | 2.4487063 |
| 216 | 2.3344537 | 249 | 2.3961993 | 282 | 2.4502491 |
| 217 | 2.3364597 | 250 | 2.3979400 | 283 | 2.4517864 |
| 218 | 2.3384565 | 251 | 2.3996737 | 284 | 2.4533183 |
| 219 | 2.3404441 | 252 | 2.4014005 | 285 | 2.4548449 |
| 220 | 2.3424227 | 253 | 2.4031205 | 286 | 2.4563660 |
| 221 | 2.3443923 | 254 | 2.4048337 | 287 | 2.4578819 |
| 222 | 2.3463530 | 255 | 2.4065402 | 288 | 2.4593925 |
| 223 | 2.3483049 | 256 | 2.4082400 | 289 | 2.4608978 |
| 224 | 2.3502480 | 257 | 2.4099331 | 290 | 2.4623980 |
| 225 | 2.3521825 | 258 | 2.4116197 | 291 | 2.4638930 |
| 226 | 2.3541084 | 259 | 2.4132998 | 292 | 2.4653828 |
| 227 | 2.3560259 | 260 | 2.4149733 | 293 | 2.4668676 |
| 228 | 2.3579348 | 261 | 2.4166405 | 294 | 2.4683473 |
| 229 | 2.3598355 | 262 | 2.4183013 | 295 | 2.4698220 |
| 230 | 2.3617278 | 263 | 2.4199557 | 296 | 2.4712917 |
| 231 | 2.3636120 | 264 | 2.4216039 | 297 | 2.4727564 |
| 232 | 2.3654880 | 265 | 2.4232459 | 298 | 2.4742163 |
| 233 | 2.3673559 | 266 | 2.4248816 | 299 | 2.4756712 |
| 234 | 2.3692159 | 267 | 2.4265113 | 300 | 2.4771213 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 301 | 2.4785665 | 334 | 2.5237465 | 367 | 2.5646661 |
| 302 | 2.4800069 | 335 | 2.5250448 | 368 | 2.5658478 |
| 303 | 2.4814426 | 336 | 2.5263393 | 369 | 2.5670264 |
| 304 | 2.4828736 | 337 | 2.5276299 | 370 | 2.5682017 |
| 305 | 2.4842998 | 338 | 2.5289167 | 371 | 2.5693739 |
| 306 | 2.4857214 | 339 | 2.5301997 | 372 | 2.5705429 |
| 307 | 2.4871384 | 340 | 2.5314789 | 373 | 2.5717088 |
| 308 | 2.4885507 | 341 | 2.5327544 | 374 | 2.5728716 |
| 309 | 2.4899585 | 342 | 2.5340261 | 375 | 2.5740313 |
| 310 | 2.4913617 | 343 | 2.5352941 | 376 | 2.5751878 |
| 311 | 2.4927604 | 344 | 2.5365584 | 377 | 2.5763413 |
| 312 | 2.4941546 | 345 | 2.5378191 | 378 | 2.5774918 |
| 313 | 2.4955443 | 346 | 2.5390761 | 379 | 2.5786392 |
| 314 | 2.4969296 | 347 | 2.5403295 | 380 | 2.5797836 |
| 315 | 2.4983106 | 348 | 2.5415792 | 381 | 2.5809250 |
| 316 | 2.4996871 | 349 | 2.5428254 | 382 | 2.5820634 |
| 317 | 2.5010593 | 350 | 2.5440680 | 383 | 2.5831988 |
| 318 | 2.5024271 | 351 | 2.5453071 | 384 | 2.5843312 |
| 319 | 2.5037907 | 352 | 2.5465427 | 385 | 2.5854607 |
| 320 | 2.5051500 | 353 | 2.5477747 | 386 | 2.5865873 |
| 321 | 2.5065050 | 354 | 2.5490033 | 387 | 2.5877110 |
| 322 | 2.5078559 | 355 | 2.5502284 | 388 | 2.5888317 |
| 323 | 2.5092025 | 356 | 2.5514500 | 389 | 2.5899496 |
| 324 | 2.5105450 | 357 | 2.5526682 | 390 | 2.5910646 |
| 325 | 2.5118834 | 358 | 2.5538830 | 391 | 2.5921768 |
| 326 | 2.5132176 | 359 | 2.5550944 | 392 | 2.5932861 |
| 327 | 2.5145477 | 360 | 2.5563025 | 393 | 2.5943925 |
| 328 | 2.5158738 | 361 | 2.5575072 | 394 | 2.5954962 |
| 329 | 2.5171959 | 362 | 2.5587086 | 395 | 2.5965971 |
| 330 | 2.5185139 | 363 | 2.5599066 | 396 | 2.5976952 |
| 331 | 2.5198280 | 364 | 2.5611014 | 397 | 2.5987905 |
| 332 | 2.5211381 | 365 | 2.5622929 | 398 | 2.5998831 |
| 333 | 2.5224442 | 366 | 2.5634811 | 399 | 2.6009729 |
| 334 | 2.5237465 | 367 | 2.5646661 | 400 | 2.6020600 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 401 | 2.6031444 | 434 | 2.6374897 | 467 | 2.6693169 |
| 402 | 2.6042261 | 435 | 2.6384893 | 468 | 2.6702459 |
| 403 | 2.6053050 | 436 | 2.6394865 | 469 | 2.6711718 |
| 404 | 2.6063814 | 437 | 2.6404814 | 470 | 2.6720979 |
| 405 | 2.6074550 | 438 | 2.6414741 | 471 | 2.6730209 |
| 406 | 2.6085260 | 439 | 2.6424645 | 472 | 2.6739420 |
| 407 | 2.6095944 | 440 | 2.6434527 | 473 | 2.6748611 |
| 408 | 2.6106602 | 441 | 2.6444386 | 474 | 2.6757783 |
| 409 | 2.6117233 | 442 | 2.6454223 | 475 | 2.6766936 |
| 410 | 2.6127839 | 443 | 2.6464037 | 476 | 2.6776069 |
| 411 | 2.6138418 | 444 | 2.6473830 | 477 | 2.6785184 |
| 412 | 2.6148972 | 445 | 2.6483600 | 478 | 2.6794279 |
| 413 | 2.6159500 | 446 | 2.6493349 | 479 | 2.6803355 |
| 414 | 2.6170003 | 447 | 2.6503075 | 480 | 2.6812412 |
| 415 | 2.6180481 | 448 | 2.6512780 | 481 | 2.6821451 |
| 416 | 2.6190933 | 449 | 2.6522463 | 482 | 2.6830470 |
| 417 | 2.6201361 | 450 | 2.6532125 | 483 | 2.6839471 |
| 418 | 2.6211763 | 451 | 2.6541765 | 484 | 2.6848454 |
| 419 | 2.6222140 | 452 | 2.6551384 | 485 | 2.6857417 |
| 420 | 2.6232493 | 453 | 2.6560982 | 486 | 2.6866363 |
| 421 | 2.6242821 | 454 | 2.6570558 | 487 | 2.6875290 |
| 422 | 2.6253124 | 455 | 2.6580114 | 488 | 2.6884198 |
| 423 | 2.6263404 | 456 | 2.6589648 | 489 | 2.6893089 |
| 424 | 2.6273659 | 457 | 2.6599162 | 490 | 2.6901961 |
| 425 | 2.6283889 | 458 | 2.6608655 | 491 | 2.6910815 |
| 426 | 2.6294096 | 459 | 2.6618127 | 492 | 2.6919651 |
| 427 | 2.6304379 | 460 | 2.6627578 | 493 | 2.6928469 |
| 428 | 2.6314438 | 461 | 2.6637009 | 494 | 2.6937269 |
| 429 | 2.6324573 | 462 | 2.6646420 | 495 | 2.6946052 |
| 430 | 2.6334685 | 463 | 2.6655810 | 496 | 2.6954817 |
| 431 | 2.6344773 | 464 | 2.6665180 | 497 | 2.6963564 |
| 432 | 2.6354837 | 465 | 2.6674529 | 498 | 2.6972293 |
| 433 | 2.6364879 | 466 | 2.6683859 | 499 | 2.6981005 |
| 434 | 2.6374897 | 467 | 2.6693169 | 500 | 2.6989700 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 501 | 2.6998377 | 534 | 2.7275413 | 567 | 2.7535831 |
| 502 | 2.7007037 | 535 | 2.7283538 | 568 | 2.7543483 |
| 503 | 2.7015680 | 536 | 2.7291648 | 569 | 2.7551123 |
| 504 | 2.7024305 | 537 | 2.7299743 | 570 | 2.7558749 |
| 505 | 2.7032914 | 538 | 2.7307823 | 571 | 2.7566361 |
| 506 | 2.7041505 | 539 | 2.7315888 | 572 | 2.7573960 |
| 507 | 2.7050080 | 540 | 2.7323938 | 573 | 2.7581546 |
| 508 | 2.7058637 | 541 | 2.7331973 | 574 | 2.7589119 |
| 509 | 2.7067178 | 542 | 2.7339993 | 575 | 2.7596678 |
| 510 | 2.7075702 | 543 | 2.7347998 | 576 | 2.7604225 |
| 511 | 2.7084209 | 544 | 2.7355989 | 577 | 2.7611758 |
| 512 | 2.7092700 | 545 | 2.7363965 | 578 | 2.7619278 |
| 513 | 2.7101174 | 546 | 2.7371926 | 579 | 2.7626786 |
| 514 | 2.7109631 | 547 | 2.7379873 | 580 | 2.7634280 |
| 515 | 2.7118072 | 548 | 2.7387806 | 581 | 2.7641761 |
| 516 | 2.7126497 | 549 | 2.7395723 | 582 | 2.7649230 |
| 517 | 2.7134905 | 550 | 2.7403627 | 583 | 2.7656686 |
| 518 | 2.7143298 | 551 | 2.7411516 | 584 | 2.7664128 |
| 519 | 2.7151674 | 552 | 2.7419391 | 585 | 2.7671559 |
| 520 | 2.7160033 | 553 | 2.7427251 | 586 | 2.7678976 |
| 521 | 2.7168377 | 554 | 2.7435098 | 587 | 2.7686381 |
| 522 | 2.7176705 | 555 | 2.7442930 | 588 | 2.7693773 |
| 523 | 2.7185017 | 556 | 2.7450748 | 589 | 2.7701153 |
| 524 | 2.7193313 | 557 | 2.7458552 | 590 | 2.7708520 |
| 525 | 2.7201593 | 558 | 2.7466342 | 591 | 2.7715875 |
| 526 | 2.7209857 | 559 | 2.7474118 | 592 | 2.7723217 |
| 527 | 2.7218106 | 560 | 2.7481880 | 593 | 2.7730547 |
| 528 | 2.7226339 | 561 | 2.7489629 | 594 | 2.7737864 |
| 529 | 2.7234557 | 562 | 2.7497363 | 595 | 2.7745170 |
| 530 | 2.7242759 | 563 | 2.7505084 | 596 | 2.7752463 |
| 531 | 2.7250945 | 564 | 2.7512791 | 597 | 2.7759743 |
| 532 | 2.7259116 | 565 | 2.7520484 | 598 | 2.7767012 |
| 533 | 2.7267272 | 566 | 2.7528164 | 599 | 2.7774268 |
| 534 | 2.7275413 | 567 | 2.7535831 | 600 | 2.7781512 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 601 | 2.7788745 | 634 | 2.8020893 | 667 | 2.8241258 |
| 602 | 2.7795965 | 635 | 2.8027737 | 668 | 2.8247765 |
| 603 | 2.7803173 | 636 | 2.8034571 | 669 | 2.8254261 |
| 604 | 2.7810369 | 637 | 2.8041394 | 670 | 2.8260748 |
| 605 | 2.7817554 | 638 | 2.8048207 | 671 | 2.8267225 |
| 606 | 2.7824726 | 639 | 2.8055009 | 672 | 2.8273693 |
| 607 | 2.7831887 | 640 | 2.8061800 | 673 | 2.8280151 |
| 608 | 2.7839036 | 641 | 2.8068580 | 674 | 2.8286599 |
| 609 | 2.7846173 | 642 | 2.8075350 | 675 | 2.8293038 |
| 610 | 2.7853298 | 643 | 2.8082110 | 676 | 2.8299467 |
| 611 | 2.7860412 | 644 | 2.8088859 | 677 | 2.8305887 |
| 612 | 2.7867514 | 645 | 2.8095597 | 678 | 2.8312297 |
| 613 | 2.7874605 | 646 | 2.8102325 | 679 | 2.8318698 |
| 614 | 2.7881684 | 647 | 2.8109043 | 680 | 2.8325089 |
| 615 | 2.7888751 | 648 | 2.8115750 | 681 | 2.8331471 |
| 616 | 2.7895807 | 649 | 2.8122447 | 682 | 2.8337844 |
| 617 | 2.7902852 | 650 | 2.8129134 | 683 | 2.8344207 |
| 618 | 2.7909885 | 651 | 2.8135810 | 684 | 2.8350561 |
| 619 | 2.7916906 | 652 | 2.8142476 | 685 | 2.8356906 |
| 620 | 2.7923917 | 653 | 2.8149132 | 686 | 2.8363241 |
| 621 | 2.7930916 | 654 | 2.8155777 | 687 | 2.8369567 |
| 622 | 2.7937904 | 655 | 2.8162413 | 688 | 2.8375884 |
| 623 | 2.7944880 | 656 | 2.8169038 | 689 | 2.8382192 |
| 624 | 2.7951846 | 657 | 2.8175654 | 690 | 2.8388491 |
| 625 | 2.7958800 | 658 | 2.8182259 | 691 | 2.8394780 |
| 626 | 2.7965743 | 659 | 2.8188854 | 692 | 2.8401061 |
| 627 | 2.7972675 | 660 | 2.8195439 | 693 | 2.8407332 |
| 628 | 2.7979596 | 661 | 2.8202025 | 694 | 2.8413595 |
| 629 | 2.7986506 | 662 | 2.8208580 | 695 | 2.8419848 |
| 630 | 2.7993405 | 663 | 2.8215135 | 696 | 2.8426092 |
| 631 | 2.8000294 | 664 | 2.8221681 | 697 | 2.8432328 |
| 632 | 2.8007171 | 665 | 2.8228216 | 698 | 2.8438554 |
| 633 | 2.8014037 | 666 | 2.8234742 | 699 | 2.8444772 |
| 634 | 2.8020893 | 667 | 2.8241258 | 700 | 2.8450980 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 701 | 2.8457180 | 734 | 2.8656961 | 767 | 2.8857954 |
| 702 | 2.8463371 | 735 | 2.8662873 | 768 | 2.8853612 |
| 703 | 2.8469553 | 736 | 2.8668778 | 769 | 2.8859263 |
| 704 | 2.8475727 | 737 | 2.8674675 | 770 | 2.8864907 |
| 705 | 2.8481891 | 738 | 2.8680564 | 771 | 2.8870544 |
| 706 | 2.8488047 | 739 | 2.8686444 | 772 | 2.8876173 |
| 707 | 2.8494194 | 740 | 2.8692317 | 773 | 2.8881795 |
| 708 | 2.8500333 | 741 | 2.8698182 | 774 | 2.8887410 |
| 709 | 2.8506462 | 742 | 2.8704039 | 775 | 2.8893017 |
| 710 | 2.8512583 | 743 | 2.8709888 | 776 | 2.8898617 |
| 711 | 2.8518996 | 744 | 2.8715729 | 777 | 2.8904210 |
| 712 | 2.8524800 | 745 | 2.8721563 | 778 | 2.8909796 |
| 713 | 2.8530895 | 746 | 2.8727388 | 779 | 2.8915379 |
| 714 | 2.8536982 | 747 | 2.8733206 | 780 | 2.8920946 |
| 715 | 2.8543060 | 748 | 2.8739016 | 781 | 2.8926510 |
| 716 | 2.8549130 | 749 | 2.8744818 | 782 | 2.8932068 |
| 717 | 2.8555192 | 750 | 2.8750613 | 783 | 2.8937618 |
| 718 | 2.8561244 | 751 | 2.8756399 | 784 | 2.8943161 |
| 719 | 2.8567289 | 752 | 2.8762178 | 785 | 2.8948697 |
| 720 | 2.8573325 | 753 | 2.8767950 | 786 | 2.8954225 |
| 721 | 2.8579353 | 754 | 2.8773712 | 787 | 2.8959747 |
| 722 | 2.8585372 | 755 | 2.8779469 | 788 | 2.8965262 |
| 723 | 2.8591383 | 756 | 2.8785218 | 789 | 2.8970770 |
| 724 | 2.8597386 | 757 | 2.8790959 | 790 | 2.8976271 |
| 725 | 2.8603380 | 758 | 2.8796692 | 791 | 2.8981765 |
| 726 | 2.8609366 | 759 | 2.8802418 | 792 | 2.8987252 |
| 727 | 2.8615344 | 760 | 2.8808136 | 793 | 2.8992732 |
| 728 | 2.8621314 | 761 | 2.8813847 | 794 | 2.8998205 |
| 729 | 2.8627275 | 762 | 2.8819550 | 795 | 2.9003571 |
| 730 | 2.8633229 | 763 | 2.8825245 | 796 | 2.9009131 |
| 731 | 2.8639174 | 764 | 2.8830934 | 797 | 2.9014583 |
| 732 | 2.8645111 | 765 | 2.8836614 | 798 | 2.9020029 |
| 733 | 2.8651040 | 766 | 2.8842288 | 799 | 2.9025468 |
| 734 | 2.8656961 | 767 | 2.8847954 | 800 | 2.9030900 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 801 | 2.9036325 | 834 | 2.9211660 | 867 | 2.9380191 |
| 802 | 2.9041744 | 835 | 2.9216865 | 868 | 2.9385197 |
| 803 | 2.9047155 | 836 | 2.9222063 | 869 | 2.9390198 |
| 804 | 2.9052560 | 837 | 2.9227255 | 870 | 2.9395192 |
| 805 | 2.9057959 | 838 | 2.9232440 | 871 | 2.9400181 |
| 806 | 2.9063350 | 839 | 2.9237620 | 872 | 2.9405165 |
| 807 | 2.9068735 | 840 | 2.9242793 | 873 | 2.9410142 |
| 808 | 2.9074114 | 841 | 2.9247960 | 874 | 2.9415114 |
| 809 | 2.9079485 | 842 | 2.9253121 | 875 | 2.9420080 |
| 810 | 2.9084850 | 843 | 2.9258276 | 876 | 2.9425041 |
| 811 | 2.9090209 | 844 | 2.9263424 | 877 | 2.9429996 |
| 812 | 2.9095560 | 845 | 2.9268567 | 878 | 2.9434945 |
| 813 | 2.9100905 | 846 | 2.9273704 | 879 | 2.9439889 |
| 814 | 2.9106244 | 847 | 2.9278834 | 880 | 2.9444827 |
| 815 | 2.9111576 | 848 | 2.9283958 | 881 | 2.9449759 |
| 816 | 2.9116902 | 849 | 2.9289077 | 882 | 2.9454680 |
| 817 | 2.9122221 | 850 | 2.9294189 | 883 | 2.9459607 |
| 818 | 2.9127533 | 851 | 2.9299296 | 884 | 2.9464523 |
| 819 | 2.9132839 | 852 | 2.9304396 | 885 | 2.9469433 |
| 820 | 2.9138138 | 853 | 2.9309490 | 886 | 2.9474337 |
| 821 | 2.9143432 | 854 | 2.9314579 | 887 | 2.9479236 |
| 822 | 2.9148718 | 855 | 2.9319661 | 888 | 2.9484130 |
| 823 | 2.9153998 | 856 | 2.9324738 | 889 | 2.9489018 |
| 824 | 2.9159272 | 857 | 2.9329808 | 890 | 2.9493900 |
| 825 | 2.9164539 | 858 | 2.9334873 | 891 | 2.9498777 |
| 826 | 2.9169800 | 859 | 2.9339932 | 892 | 2.9503648 |
| 827 | 2.9175055 | 860 | 2.9344984 | 893 | 2.9508514 |
| 828 | 2.9180303 | 861 | 2.9350031 | 894 | 2.9513375 |
| 829 | 2.9185545 | 862 | 2.9355073 | 895 | 2.9518230 |
| 830 | 2.9190781 | 863 | 2.9360108 | 896 | 2.9523080 |
| 831 | 2.9196010 | 864 | 2.9365137 | 897 | 2.9527924 |
| 832 | 2.9201233 | 865 | 2.9270161 | 898 | 2.9532763 |
| 833 | 2.9206450 | 866 | 2.9375179 | 899 | 2.9537597 |
| 834 | 2.9211660 | 867 | 2.9380191 | 900 | 2.9542425 |

NUMERORUM LOGARITHMI.

| N. | Logarith. | N. | Logarith. | N. | Logarith. |
|-----|-----------|-----|-----------|------|-----------|
| 901 | 2.9547248 | 934 | 2.9703469 | 967 | 2.9854265 |
| 902 | 2.9551065 | 935 | 2.9708116 | 968 | 2.9858754 |
| 903 | 2.9556677 | 936 | 2.9712758 | 969 | 2.9863238 |
| 904 | 2.9561684 | 937 | 2.9717396 | 970 | 2.9867717 |
| 905 | 2.9566486 | 938 | 2.9722028 | 971 | 2.9872192 |
| 906 | 2.9571282 | 939 | 2.9726656 | 972 | 2.9876663 |
| 907 | 2.9576073 | 940 | 2.9731279 | 973 | 2.9881128 |
| 908 | 2.9580858 | 941 | 2.9735896 | 974 | 2.9885590 |
| 909 | 2.9585639 | 942 | 2.9740509 | 975 | 2.9890046 |
| 910 | 2.9590414 | 943 | 2.9745117 | 976 | 2.9894498 |
| 911 | 2.9595184 | 944 | 2.9749720 | 977 | 2.9898946 |
| 912 | 2.9599948 | 945 | 2.9754318 | 978 | 2.9903389 |
| 913 | 2.9604708 | 946 | 2.9758911 | 979 | 2.9907827 |
| 914 | 2.9609462 | 947 | 2.9763500 | 980 | 2.9912261 |
| 915 | 2.9614211 | 948 | 2.9768083 | 981 | 2.9916696 |
| 916 | 2.9618955 | 949 | 2.9772662 | 982 | 2.9921115 |
| 917 | 2.9623653 | 950 | 2.9777236 | 983 | 2.9925535 |
| 918 | 2.9628427 | 951 | 2.9781805 | 984 | 2.9929951 |
| 919 | 2.9633155 | 952 | 2.9786369 | 985 | 2.9934362 |
| 920 | 2.9637878 | 953 | 2.9790929 | 986 | 2.9938769 |
| 921 | 2.9642596 | 954 | 2.9795484 | 987 | 2.9943171 |
| 922 | 2.9647309 | 955 | 2.9800034 | 988 | 2.9947569 |
| 923 | 2.9652017 | 956 | 2.9804579 | 989 | 2.9951963 |
| 924 | 2.9656720 | 957 | 2.9809119 | 990 | 2.9956352 |
| 925 | 2.9661417 | 958 | 2.9813655 | 991 | 2.9960737 |
| 926 | 2.9666110 | 959 | 2.9818186 | 992 | 2.9965117 |
| 927 | 2.9670797 | 960 | 2.9822712 | 993 | 2.9969492 |
| 928 | 2.9675480 | 961 | 2.9827234 | 994 | 2.9973864 |
| 929 | 2.9680157 | 962 | 2.9831751 | 995 | 2.9978231 |
| 930 | 2.9684829 | 963 | 2.9836263 | 996 | 2.9982593 |
| 931 | 2.9689497 | 964 | 2.9840770 | 997 | 2.9986952 |
| 932 | 2.9694159 | 965 | 2.9845273 | 998 | 2.9991305 |
| 933 | 2.9698816 | 966 | 2.9849771 | 999 | 2.9995655 |
| 934 | 2.9703469 | 967 | 2.9854265 | 1000 | 3.0000000 |

APPENDIX.



ADDEMUS hic nonnulla, quæ ad Geometriæ planæ potissimum, & Arithmetice tractatus vel prorsus necessaria ceruimus, vel maxime utilia. Tractatus eosdem jam olim conscripseramus in priuatum auditorum usum, qui ab Editor latinè redditæ, & cæteris nunc a nobis conscriptis ve auctis præmissi sunt. Porro in Geometria plana seriem quandam theorematum jam tum ordinauimus, ex quibus fere omnia, quæ apud Euclidem, & cæteros Elementorum constructores occurrunt, vel sponte fluere vel facile, Præceptore indicante, deduci possent, folia viva voce Tyronibus indicare deductiones ipsas, eosque ea ratione exercere in demonstratōne theorematum, & problematum solutione. In Arithmetica verò demonstrationes pariter viva voce exponere soliti, eas plerumque ibidem omisimus cum obui soleat Tyronis animus, si dum in operationibus Arithmeticis exercetur, & præcepta ad usum deducit, demonstrationum, quæ scripto admodum difficulter satis dilucidè exponi possunt, longiore ambitu interrumpatur.

Hic igitur ea, quæ Præceptor Tyroni insinuare potest, & quæ nos nostris Auditoribus insinuabimus, indicata potius, quam explicata adjiciemus. Erunt in iis & adnotationes quædam, & problemata exercendo Tyroni apta. Poterit autem hæc Tyroni ipsi Præceptor vel omnia, vel aliqua tantum selectiora pro ejus captu, & otio proponere, vel dum primum elementa percurrit, vel dum, absolutis semel sine hac appendice elementis, ea iterum relegit. Si Tyro sine ullo Præceptore Geometriam addiscit, hæc ubi elementa illa absoluerit, videre poterit, sed nonnunquam consulendus erit aliquis Geometriæ peritior, ubi in deductione theorematum, vel solutione problematum vires suas incassum exercuerit: quod tamen multo rarius continget, si schemata, quæ hic præcipimus, dili-

ligenter delineare curet. Omittimus autem delineationem ipsam, ut eo acrius addiscentis industria exerceatur, & ex veritatibus, tanquam suis quodammodo compertis, iundiciorem capiat voluptatem. Censemus autem nihil vilius ad Geometriam penitus cognoscendam haberi posse, quam huiusmodi contentio Tyronis in deducendis theorematibus, vel solvendis problematibus; qua fit, ut Geometria ipsa ejus animo multo altius insideat, & investigationis fontes aperiantur.

§. I.

De iis, quæ pertinent ad Geometriam Planam.

1. **A**xioma 5 converti posse notet in lineis rectis, & angulis æqualibus, quæ si æqualia sunt, debent congruere, & inde pendet demonstratio prop. 2, & 3.

2. Lineæ rectæ, vel curvæ, ut & superficiæ planæ, vel curvæ definitionem omisimus, quod nota sint æquæ, & quid sit majus, æquale, minus. At illud notandum, eam esse rectitudinis naturam, ut si binæ puncta rectæ congruant cum binis alterius, debeant totæ ipsæ rectæ congruere, licet in infinitum productæ. Inde eruantur hæc binæ Euclidis axiomata. Rectæ lineæ spatium non claudunt: Rectæ lineæ segmentum commune non habent nimirum in communem caudam non desinunt.

3. In schol. post def. 4 pag. 2. lin. 35. notentur illa verba: *posita corporum continuitate*: nam si corpora consistant punctis indivisibilibus, & a se invicem remotis, licet connexis ratione quadam exposita in dissertatione de lumine habita in Collegio Röm. an. 1748, puncta quidem realia sunt, & punctum quodvis potest solum etiam existere: corpora continuam extensionem, quam in iis Physici communiter admittunt nullam habent, ac in ea sententia alia est lineæ, superficiæ, solidi idea. Linea est spatium per cursum motu puncti, superficies concipitur generari motu lineæ, solidum motu superficie.

4. Post def. 6. addi potest segmentum circumferentię circuli dici *arcum*, rectam, quę ipsum subtendit, *chordam*, figuram interceptam arcu & chorda, *segmentum*, interceptam binis radiis *sectorem*.

5. In schol. post def. 6. assumitur pag. 3 lin. 22. binas rectas ductas ex communi centro binorum circulorum, intercipere tot gradus in minori, quot in majori. Id ipsum accuratę demonstrari potest. Si majoris circuli circumferentia concipiatur divisa in quocumque partes æquales, ut in gradus, & ad singulas divisiones ducantur rectę: eę secabunt in partes pariter æquales etiam peripheriam circuli minoris: Nam si quis sector majoris circuli concipiatur revolvı circa alterum radium; arcus circuli majoris debbit congruere arcui sibi proximo, cum omnia eorum puncta æque distent a centro, & ipsi æquales sint. Inde autem facile eruitur, debere simul & arcum minoris circuli arcui sibi proximo congruere, adeoque æqualem esse. Inde autem cętera sponte fluunt.

7. Eadem conversione demonstratur etiam circulum a diametro secari in binos æquales semicirculos, quod in defin. 5. assumitur.

8. Ope postulati 3. ad datum punctum poni potest recta æqualis rectę datę, quod Euclidi est prop. 21. 1. Id ipse operosiore methodo solvit; cum non assumat inter postulata translationem intervalli ex uno in alium locum, quod nos, ut evidenter possibile, & factu facile assumpsimus cum aliis multis.

9. Potest jam hinc insinuare Tyroni Præceptor discrimen inter problemata determinata, quę vel unicam solutionem admittunt, ut ubi a recta majore abscindenda est recta datę minori æqualis incipiendo a dato extremo, vel earum numerum determinatum, cujusmodi plura infra occurrent, & indeterminata, quę infinitas solutiones admittunt, ut hic, ubi circa datum punctum descripto circulo cum intervallo rectę datę, quęvis recta ad ejus peripheriam terminata solvit problema.

10. Hinc Tyro loci geometrici ideam habebit, qui
nimi-

nimirum omnes indeterminati problematis solutiones continet. Circuli descripti peripheria respectu hujus problematis est locus geometricus.

11. In scholio post def. 7 assumuntur arcus circuli pro mensura angulorum. Notet Tyro, id rite præstari, ubi vertex anguli sit in centro. Facile enim demonstratur ope superpositionis, angulos ad centrum æquales subtendi arcibus æqualibus, & viceversa. Quare duplo, triplo, centuplo angulo respondet duplex, triplus, centuplus arcus.

12. In Coroll. sequenti assumitur arcum PQ abscissum centro P intervallo BE esse æqualem arcui BE. Id accuratè demonstrari potest ex prop. 4, quæ hinc non pender. Ductis enim rectis BE, PQ, habebuntur bina triangula BCE, PMQ, in quibus latera unius erunt æqualia lateribus alterius, adeoque & angulus ad centrum C æqualis; unde patet, quo pacto in dato circulo applicari possit chorda æqualis datæ cuivis rectæ, quam tamen non posse diametro majorem esse patebit infra n. 50.

13. Porro hinc deducitur hoc theorema. In æqualibus circulis chordæ æquales subtendunt arcus æquales ita nimirum, ut cum quævis chorda subtendat hinc inde binos arcus; bini minores æquantur inter se, & bini majores inter se.

14. Ad defin. 8. exponi potest norma, cujus ope recta, datæ rectæ perpendicularis duci potest per datum punctum, & ejus examen, quod fit producto altero anguli recti latere, videndo an ea congruat novo angulo recto, qui sit ejusmodi productione. A norma ipsa perpendicularis appellatur normalis.

15. Corollarium 2, & 4. defin. 10. converti possunt. Si fuerint (Fig. 2.) anguli HCF, HCL simul æquales duobus rectis, rectæ, CF, CL jacebunt in directum, quia FC producta debet efficere cum HC angulum, qui sit complementum ad duos rectos anguli HCF, adeoque æqualis ipsi HCL, & si binæ rectæ CH, CK efficient cum recta FL angulos FCK, LCH ad verticem oppositos æquales, jacebunt pariter in directum.

Utriusque hujus inversi theorematis usus est frequen-
simus, primum Euclides demonstravit, secundum omisit.

16. Potest Tyroni præceptor proponere, ut ope ho-
rum corollariorum ostendat, quo pacto extrorsum me-
tiri liceat angulum, quem binæ exteriæ facies arcis
vel cujvis alterius ædificii continent in plano hori-
zontali. Præstabitur ope corol. 2. si producto altero an-
guli latere, mensutetur is, quem ea linea continet cum
latere altero, & capiatur complementum ad gr. 180, ope
corol. 3, si ducatur quævis recta ab ipso anguli vertice,
& a gradibus 360. demantur bini anguli, quos ea cum
binis iis lateribus continet; ope cor. 4, si producto u-
troque latere mensuretur angulus ad verticem oppositus.

17. Quod si eo pacto omnes arcis anguli determinen-
tur, & angulorum latera mensurentur passibus; substi-
tuendo passibus ipsis particulas æquales quascunque, po-
terit arcis ambitus delineari.

18. In parallelarum doctrina assumpsimus in schol.
post defn. 17. æqualem inclinationem ad quamvis rectam,
quæ nihilo minus evidens est, quam quidquid alii as-
sumunt. At addi potest illud, rectas, quæ convergunt,
si satis producantur, debere demum concurrere, licet in-
finita sint genera curvarum, quæ in infinitum productæ
ad rectam, vel ad se invicem accedunt ultra quoscunque
limites; quin usquam concurrant, adeoque rectam, quæ
parallelarum alteram secet, debere secare & alteram.

19. Hinc inferitur theorema, quod Euclides pro axio-
mate assumpsit. Si recta incidens in binas rectas fecerit
angulos internos ad eandem partem minores duobus re-
ctis, eæ rectæ satis productæ concurrent. Parallelæ enim
continent angulos æquales binis rectis. Quare si per
concursum alterius ducatur recta alteri parallela; illa
prior hanc novam parallelam secabit, adeoque & illam
alteram rectam.

20. Post hic proponi demonstrandum theorema,
quod summo usui esse solet, Binæ rectæ binis aliis pa-
rallæ, si uspiam concurrunt, continent angulos ad eas-
dem partes æquales angulis, qui ab iis continentur. Fa-

cile

esse demonstrabitur producendo earum alteram, si opus sit, donec occurrat harum alteri. Statim enim apparebit in ipso concursu haberi angulum æqualem utriusque e præcedentibus.

21. Post def. 18. addi potest, inter figuras quadrilatas *Trapezium* esse id, quod habet latera & angulos utcumque inæquales, *Rhombum*, qui omnia latera æqualia habet *Rhomboidem*, quæ bina quævis opposita æqualia. *Multilateras*, *multangulas*, vel *polygonas* dici figuras plurium laterum, & angulorum, *pentagonum* quinque, *hexagonum* sex, *decagonum* decem habere latera, & ita porro. *Polygonum regulare* & latera omnia habere æqualia, & omnes angulos æquales.

22. Post prop. 1. proponi potest querendum, quam summam conficiant omnes anguli interni cuiusvis polygoni, quam omnes externi. Si a singulis angulis ad quodvis punctum assumptum intra ipsum ducantur rectæ, fient tot triangula, quot sunt latera; & omnes eorum anguli simul æquantur omnibus angulis internis polygoni, una cum angulis, qui sunt in eo puncto, & æquantur 4. rectis. Hinc omnes anguli interni æquantur tot rectis, quot exprimit duplus numerus laterum demptis 4. Cumque quivis externus cum suo interno æquetur duobus rectis; omnes simul externi æquabuntur illis 4. rectis, qui a duplo laterum numero dempti sunt ad habendos omnes internos.

23. Inde eruetur quot graduum debeat esse angulus internus cuiusvis polygoni regularis, dividendo summam per numerum laterum. In pentagono summa æquatur 6. rectis sive gradibus 540, quæ divisa per 5. exhibet angulum graduum 108.

24. Post coroll. 3. proponi potest hoc probl. A puncto dato extra rectam datam ducere aliam rectam, quæ cum ipsa contineat angulum æqualem dato. Solvetur, e quovis puncto rectæ datæ ducendo rectam, quæ cum data contineat angulum æqualem dato, tum aliam huic parallelam e puncto dato vel ducendo e puncto dato rectam parallelam rectæ datæ tum aliam, quæ cum ea
con-

contineat angulum æqualem dato. Facta constructione statim patebit hanc rectam postremam cum data continere angulum æqualem dato.

25. In propr. 2. notandum, quodvis latus pro basi assumi posse; sed in triangulis rectangulis basis nomine, nisi quid aliud exprimatur, intelligi hypotenusam, siue latus recto angulo oppositum.

26. Indicari hic potest, quopacto distantiam aliquam metiri liceat ope hujus propositionis, ducendo ab extremis ejus punctis ad punctum quodvis binas rectas, mensurando eas, & angulum ibidem contentum, construendo alibi angulum ejusmodi, cum lateribus æqualibus, & mensurando basim novi trianguli obventuram æqualem quæsitæ distantie.

27. Ex eadem deducitur chordas æqualium arcuum in æqualibus circulis æquales esse; cum nimirum si utrobique ducantur ab eorum extremis radii ad centrum anguli in centris æquales fiant, & latera circa ipsos æqualia.

28. E coroll. 2. eruitur, in triang. isoscelio productis lateribus, etiam angulos infra basim æquales esse inter se; nam cum iis, qui supra basim sunt singuli binos rectos complent.

29. Post coroll. 4. potest proponi construendum super data recta triangulum vel æquilaterum; vel isosceles datorum laterum; cumque id solvatur, facto centro in utroque extremo datæ rectæ, intervallo ipsius in primo casu, dati lateris in secundo, ductis binis circulis, & ad eorum intersectiones binis rectis: notari potest solutionem ejusmodi haberi per intersectionem binorum locorum geometricorum, de quibus n. 9, & in primo casu semper haberi duas solutiones hinc inde a recta data, in secundo vel duas, vel nullam, lateribus nimirum dimidiam basim non excedentibus; ubi problematis impossibilis casus primo occurrer.

30. Aliquanto difficilius, sed varietate casuum multo utilius problema erit hujusmodi. Dato puncto in altero latere dati anguli rectilinei, construere triangulum æquilaterum,

terum; cujus basis sit in eo latere, & incipiat a dato puncto, vertex vero sit in latere altero. Solvetur, assumendo in illo primo latere segmentum quodvis a puncto dato, construendo supra ipsum hinc inde bina triangula æquilatera, producendo utriusque latus illud, quod ad datum punctum terminatur, donec alteri lateri occurrat, ac ex hoc occurſu ducendo rectam parallelam alteri lateri ejusdem trianguli æquilateri. Admodum facile demonstrabitur haberi intentum ob angulorum æqualitatem in parallelis, ex quibus deducetur angulos triangulorum prodeuntium inter se omnes æquari. Patet verò solutiones fore semper binas, præter casum, in quo angulus datus sit graduum 60, vel 120, quo casu alterius trianguli vertex in infinitum recedet, nec uspiam jam erit.

31. In Coroll. 1. pr. 3. notetur, latera æqualia debere opponi angulis æqualibus. Possunt enim bini anguli cum uno latere æquari sine triangulorum æqualitate, si nimirum in altero latus illud iis angulis interjaceat in altero opponatur, vel non opponatur angulis æqualibus.

32. Post Coroll. 4. addendum illud. Si per quodvis diametri punctum ducantur binæ rectæ lateribus parallelæ; eæ parallelogrammum dividunt in 4 parallelogramma, quorum bina, per quæ diameter transit, dicuntur circa diametrum, reliqua bina dicuntur complementa. Porro complementa ipsa semper æqualia erunt. Nam integrum parallelogrammum secatur a diametro in bina triangula æqualia, a quibus singulis demendo bina triangula, quæ pariter sunt dimidia parallelogrammorum circa diametrum, relinquentur complementa quoque æqualia.

33. Tum proponi possunt demonstranda hæc theoremata, quorum usus sæpiſsimè occurrit. In quovis parallelogrammo binæ diametri se mutuo bifariam secant: si rectangulum sit, æquales sunt, & in ipsarum intersectione factò centro, circulus ipsi circumscribi potest. Demonstrabitur primum, considerando bina triangula, ad verticem

tem opposita, in quibus inveniuntur latera parallelogrammi opposita æqualia, & anguli hinc inde ab ipsis alteri in parallelis æquales. Demonstrabitur secundum, considerando triangula, quæ utraque diameter continet cum binis rectanguli lateribus continentibus rectum angulum quæ habebunt latera æqualia, adeoque & bases. Tertium a primo, & secundo conjunctis sponte fluit.

34. In demonstratione Prop. 4. superpositis basibus non est ostensum verticem unius trianguli non posse cadere in latus alterius, vel intra triangulum ipsum. At non posse cadere in latus, satis patet ob ipsam laterum æqualitatem: non posse cadere intra alterum triangulum, demonstrabitur, si conjunctis verticibus, ut in ipsa demonstratione, considerentur bina triangula isoscelia; nam ad absurdum devenietur eodem modo, si productis alterius lateribus consideretur in eo æqualitas angulorum ultra basim, in altero verò citra, ac illorum alter erit pars alterius ex his, alter veto totum respectu alterius.

35. Atque hic quidem exemplum habet Tyro demonstrationis indirectæ per reductionem ad absurdum. Directa, & expeditior demonstratio habebitur; si bases ita jungantur, ut vertices cadant ad partes oppositas. Conjunctis enim verticibus, orientur bina triangula isoscelia, ex quorum angulis ad basim communem æqualibus, sponte fluet æqualitas angulorum oppositorum basi in dictis triangulis, & inde eorum æqualitas per prop. 2.

36. Ex eadem Prop. demonstrari potest Rhombum, ac Rhomboidem esse parallelogramma. Ducta enim diametro habebuntur bina triangula per hanc propositionem æqualia, in quibus anguli ipsius diametri cum lateribus exhibebunt æqualitatem angulorum alternorum, pro demonstrando parallelismo laterum. Porro hinc, & ex corollariis Prop. 2., & 3, eruitur in quadrilineo, si ex hisce tribus, 1. quod utrumque par oppositorum laterum servet parallelismum, 2. utrumque servet æqualitatem, 3. alterum & parallelismum, & æqualitatem servet, ha-

beatum

beatum unum, haberi semper reliqua duo. Bina ex his Euclides demonstravit: tertium, quod hic demonstravimus, licet æque necessarium, omisit.

37. Notandum hic in solis triangulis ab æqualitate laterum deduci æqualitatem angulorum, & arearum.

38. Opè prop. 5. facile solvitur hoc problema. Cuivis polygono regulari circulum circumscribere. Solvetur, secando bifariam binos angulos proximos. Bissecantium concursus exhibebit centrum quæsi circuli. Nam ob angulorum æqualitatem ex rectæ cum latere polygoni constituent triangulum isoscele. Ex ipso concursu ducta recta ad angulum proximum, fiet novum triangulum æquale priori; habebit enim mediam e tribus rectis bissecantibus angulos communem, latus ipsi proximum æquale latcri prioris, & angulum interceptum æqualem. Quare hæc tertia recta a suo angulo abscondet quantum & prima, nimirum ejus dimidium. Erit igitur & hoc isoscele, ac ita porro.

39. Ex Coroll. 3. ipsius pr. 5. facile deducitur, quo pacto super data recta quadratum construï possit, vel rectangulum datorum laterum, & concipiendo superposita latera binorum quadratorum, patebit lateris majoris quadratum majus esse, & viceversa.

40. Licebit hic eruere alium locum geometricum, qui contineat vertices omnes omnium triangulorum isoscelium habentium datam rectam pro basi, five centra omnium circulorum transeuntium per data duo puncta. Is erit recta indefinita secans bifariam, & ad angulos rectos rectam datam, seu jungentem data puncta:

41. Eruetur etiam hoc theorema summo sæpe futurum usui. In triangulo isoscelio ducta ab angulo basi opposito recta quadam, si ex hisce tribus, 1. quod angulus secetur bifariam, 2. quod basis secetur bifariam, 3. quod eadem secetur ad angulos rectos, habeatur unum, habebuntur & reliqua duo, & si in quodam triangulo habeantur duo ex iis, id triangulum erit isoscele. Demonstratio ex propositionis demonstratione sponte fuit.

42. Problema Tyroni exercendo aptum esse potest huiusmodi. In data recta invenire punctum a binis datis punctis æquè distans. Solvetur jungendo recta puncta data, & ex ipsa bifariam secta ducendo rectam perpendicularem indefinitam, cuius occurfus cum data recta solvet problema, qui concursus abibit in infinitum, nec usquam jam erit; si bina puncta jacuerint in recta datæ rectæ perpendiculari.

43. Omitti autem non debet hoc aliud; datis tribus punctis invenire centrum circuli per ea transeuntis. Solvetur conjungendo unum cum reliquis, secando bifariam rectas jungentes, & ducendo per sectionum puncta rectas perpendiculares iis, quarum concursus determinabit quæsitum centrum; quod tamen in infinitum recedet, nec usquam jam erit, si tria data puncta in directum jaceant, recta illa quodammodo æquivalente arcui circuli infiniti.

44. Id autem coincidit cum solutione hujus problematis: dato triangulo circumscribere circulum. Et quoniam datis tribus punctis, unicum invenitur centrum circuli per ea transeuntis, eruitur hoc theorema: Si binorum circulorum tria peripheriæ puncta congruant, congruunt reliqua omnia. Inde autem fluie solutio hujus problematis: dato circuli arcu invenire centrum, & ipsum complere. Satis erit assumptis in eo tribus punctis ad arbitrium invenire centrum circuli per ea transeuntis.

45. Potest exercitationis gratia proponi & hoc: In data recta invenire punctum, ad quod a binis datis punctis ductæ binæ rectæ contineant cum recta ipsa angulos æquales. Solvetur ducendo ex altero rectam perpendicularem rectæ datæ, & eam producendo tantundem; tum ex altero dato puncto ad punctum extremum rectæ productæ ducendo rectam; & erit idem casus, quem solvimus in scholio, pertinetis ad reflexionis punctum.

46. Post Coroll. 4. hujus prop. 5. proponendum hoc problema. Datum circuli arcum bifariam secare. Solvetur ducendo e centro rectam perpendicularem chordæ datæ

dati arcus. Deducenda autem sequentia theorematum summo usui futura. Diameter, quæ chordam non per centrum transeuntem bifariam secat, vel quæ chordam quavis secat ad angulos rectos, secat bifariam & arcum. Si arcum secat bifariam, secat bifariam, & ad angulos rectos chordam. Chorda, quæ aliam chordam, & ejus arcum bifariam secat, vel arcum bifariam, & ejus chordam ad angulos rectos, est diameter. Hæc faciliè demonstrantur. Inde fuit hoc aliud: Binæ chordæ, quæ diametri non sint, non possunt se mutuo secare bifariam; recta enim e centro ad intersectionem ducta esset utrique perpendicularis. Demum habetur solutio hujus problematis: Dati circuli centrum invenire: solvitur, si ducta chorda quavis, & secta bifariam, per sectionem ducatur recta ipsi perpendicularis utrinque terminata ad circumferentiam, quæ erit diameter, & secta bifariam exhibebit centrum quesitum.

47. In prop. 6. si punctum E cadat inter puncta C, & B, vel in B, demonstratio habebitur addendo binis triangulis æqualibus trapezium commune in primo casu, triangulum in secundo.

48. Ipsa prop. ac ejus corollaria convertenda sunt. Maximos enim conversa usus habent. Nimirum parallelogramma, vel triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem partes, vel parallelogrammum duplum trianguli, sunt inter easdem parallèles: Facile demonstrantur, cum ob bases æquales debeant (per schol. sequens) habere altitudines æquales. Quare recta per vertices ducta, & recta ducta per bases claudunt bina perpendicularia æqualia, & proinde parallèles sunt.

49. Ex rectangulorum mensura, quæ habetur in scholio facile deducitur rectangulum contentum sub binis rectis, quæ nimirum angulum rectum contineant, æquari simul rectangulis omnibus contentis sub illa, & paribus omnibus hujus. Nam idem est unum numerum multiplicare per alium simul, ac multiplicare partes, si ve idem est aliquid accipere decies, ac accipere prius bis, tum ter, tum quinquies: Inde vero eruitur etiam qua-

quadratum linearum æquari rectangulis omnibus, quæ ipsæ continent cum omnibus suis partibus, ac rectangulum, quod una pars linearum continet cum tota æquari illi, quod continet secum, & cum altera parte, sive quadrato sui, & rectangulo binarum partium, qui sunt casus particulares prioris theorematis. In fine autem scholii, ubi de circuli dimensionibus agitur, notandum, contemptum quantitatum infinitesimarum adhiberi posse sine ullo erroris periculo ut in solidis demonstratur. Sed de infinitesimis multo uberius agetur post sectiones conicas tomo 2.

50. Ex prop. 7, quæ fecundissima est, plurima theoremata, ac solutiones problematum derivari possunt. Derivetur in primis hoc theoremata. In triangulo rectangulo basis est major utrovis latere, & si in binis triangulis rectangulis bases æquales habentibus unum latus uni lateri æquale erit, erit & alterum alteri æquale, ac tota triangula æqualia; si autem unum latus primi sit majus uno latere secundi, erit alterum minus altero. Patet ex eo, quod summa quadratorum laterum est æqualis quadrato basis.

51. Inde sponte fluet hoc aliud. In circulo chordæ quæ a centro æque distant, æquales sunt: omnium chordarum maxima est diameter, reliquæ eo minores, quo magis a centro distant. Ducto enim a centro perpendiculari in chordam quamvis, quod ipsam secabit bifariam, fiet triangulum rectangulum, quod habebit pro basi radium, pro lateribus semichordam, & distantiam a centro, ex quo omnia facile deducuntur.

52. Proponenda hæc duo problemata: Datis quocunque rectis, aliam invenire, cujus quadratum sit æquale simul quadratis omnibus earum omnium: Datis binis rectis invenire aliam, cujus quadratum æquetur differentię quadratorum earundem. Primum solvetur, conjungendo ope anguli recti quadrata binarum in quadrato novæ rectæ, tum quadratum tertiæ cum quadrato hujus novæ in alia, & ita porro. Secundum, abscindendo ex latere altero anguli recti segmentum æquale rectæ minori, tum ex extremo ejus puncto applicando in ipso angulo recto

basim æqualem majori; latus enim alterum problema solvet.

53. Tum hoc theorema inferatur, quod rursus facundissimum erit. Rectarum omnium, quæ a dato puncto duci possunt ad datam rectam indefinitam brevissima est perpendicularis, reliquæ eo majores; quo magis a perpendiculari distant; & quæ hinc inde æque distant æquales; nec nisi binæ hinc inde æquales duci possunt. Ea omnia ex ipsa propositione sponte fluunt, si consideretur, quamvis rectam esse basim trianguli rectanguli, cujus alterum latus constans est perpendicularis illa, alterum distantia ab eadem assumpta in ipsa recta indefinita.

54. Inde hæc theoremata consequuntur. Quævis recta indefinitè producta vel circulum secat in duobus punctis, vel contingit in unico, vel illi nusquam occurrit: & in primo casu omnia puncta segmenti binis sectionibus intercepti, sive chordæ, jacent intra circulum, puncta reliqua omnia ejusdem rectæ jacent extra: in secundo casu præter unicum punctum contactus reliqua omnia jacent extra circulum. Si enim recta transit per centrum; in ea pars prima est manifesta: si per id non transit; demisso in eam perpendiculo e centro, si id perpendiculum fuerit minus radio circuli, cadet intra circulum, & recedendo ab ipso hinc inde, distantia a centro semper magis crescet, donec deveniatur ad distantiam æqualem radio, quæ deinde semper major evadet. Si id perpendiculum erit æquale radio, extremum ejus punctum cadet in peripheriam, tum hinc inde distantia omnes radio majores erunt. Si perpendiculum fuerit majus radio, multo majores erunt reliquæ omnes distantia.

55. Quædam, quæ ad tangentem circuli pertinent, demonstravimus alia methodo in corollariis prop. 8. At vel hic, vel ibi potest deduci hoc theorema maximi usus. Si per quoddam peripheriæ punctum transeant binæ rectæ, & ex hisce tribus, 1. quod altera sit circuli tangens, 2. quod altera sit circuli diameter, 3. quod angulum rectum constituent, habeantur duo simul, habebitur & tertium.

56. Tum hoc illud: Si in circulo adsit chorda, & alia recta per quoddam peripheriæ punctum transeat, ac ex hisce tribus, 1. quod arcus a chorda subtensus in eo puncto secetur bifariam: 2. quod ea recta circum ibi tangat, 3. quod ipsi chordæ parallela sit, quotiescunque habebuntur duo, habebitur & tertium. Facile autem demonstrabitur, ducta ex illo puncto arcus diametro circuli, qui se ipsum arcum bifariam secat, & illa recta sit ipsi chordæ parallela, secabit ad angulos rectos chordam, adeoque erit perpendicularis illi rectæ, quæ proinde erit tangens. Si ea fuerit tangens, illa diameter erit perpendicularis ipsi, ut chordæ adeoque ipsa tangens parallela chordæ. Si autem illa recta fuerit tangens, & parallela chordæ, diameter erit perpendicularis illi, adeoque & chordæ, quam proinde secabit bifariam.

57. Potest proponi hoc problema satis utile: Circulum describere, qui rectam datam contingat in puncto dato, & transeat per punctum datum extra ipsam. Solventur per intersectionem binorum locorum Geometricorum. Alter erit recta datæ rectæ perpendicularis in puncto dato, in qua jacent omnia centra circulorum ibi tangentium ipsam rectam datam, alter recta secans bifariam, & ad angulos rectos rectam jungentem punctum contactus cum altero puncto dato in qua nimirum sunt omnia centra circulorum transeuntium per ea puncta.

58. Demum hic jam solvi potest hoc problema: Dato polygono regulari circulum inscribere. Solvetur autem secando bifariam binos angulos proximos, ac ex concursu, quod erit centrum, ducendo ad latus interceptum rectam perpendicularem, quæ erit radius. Nam rectæ ex eo centro ad omnes angulos ductæ eos bifariam secant juxta num. 38. Quare si ex ipso concursu in bina quævis latera proxima demittantur perpendiculara; ea constituent bina triangula rectangula habentia pro basi communi rectam angulum interceptum bifariam secantem pro altero latere dimidia latera polyg-

ni,

hi, quæ semper æqualia erunt; ac proinde perpendicularum quodvis sibi proximo æquale erit, & uno assumpto pro radio, circulus per omnium extrema transibit, ac latera omnia continget.

59. Facile eruetur ex ipsa demonstratione, in ipsis contactibus latera singula polygoni bisariam secari.

60. Patebit autem eadem demonstratione etiam in quovis triangulo concutsum binarum rectarum binos angulos secantium bisariam, præbere centrum circuli inscribendi. Exhibent enim eæ binæ rectæ bissecantes tria perpendiculara æqualia.

61. In quovis triangulo bina latera simul tertio majora esse, videtur satis manifestum, ex ipsa rectitudinis natura. At id quidem acuratissime demonstrari potest ope corol. 1. prop. 8. Si enim (Fig. 35.) binorum laterum BD, DC primum concipiatur productum in A ita, ut sit DA æqualis DC, ducta CA, erit ob isoscelismum angulus DCA æqualis DAC. Quare totus BCA major BAC, & BA, sive BD, DC simul superabunt BC.

62. Inde consequetur hoc aliud theorema. Si bina triangula basim communem habeant, vertex autem alterius intra alterum cadat, hujus bina latera simul minora erunt binis lateribus illius, angulus vero ab iis contentus major illius angulo. Facile demonstrabitur producto inclusi latere altero, donec occurrat lateri includentis. Fiet enim super eadem basi tertium triangulum, cujus latera simul facile demonstrabuntur majora lateribus inclusi, minora lateribus includentis, ut angulus contra illius angulo minor, hujus major.

63. Ad Corol. 2. notari potest, si binorum triangulorum superponantur ponius latera majora, fieri posse, ut punctum C cadat extra triangulum ABD, in ipsam basim AD, vel intra triangulum. In primo casu demonstratio facta locum habet, in secundores est manifesta, in tertio demonstratur ope numeri præcedentis. Nam eo casu cadente C intra triangulum, rectæ AC, CB simul erunt minores rectis AD, DB, & demptis BC, BD æqualibus, recta AD erit major, quam AC.

64. Ex ipso Corol. 2. sponte fluunt sequentia theoremata. Rectarum omnium, quæ ex puncto dato extra centrum circuli terminantur ad omnia puncta peripheriæ, maxima erit ea, quæ ad centrum ducta, ac producta peripheriæ occurrit ultra ipsum centrum, reliquæ eo minores, quo per majores arcus distant ab eo occurfu puncta, ad quæ terminantur, ac binæ tantummodo quæ hinc inde per æquales arcus distant ab occurfu eodem, æquales inter se sunt: minima vero erit nulla, si punctum detur in ipsa peripheria, ac si detur extra, erit ea, quæ terminatur ad punctum priori e diametro oppositum. Satis erit ad hæc omnia demonstranda ducere radium e centro ad id punctum peripheriæ, ad quod terminatur recta ipsa, & considerare variationes omnes, quas subit angulus contentus in centro ab hoc radio, & a recta jungente centrum cum puncto dato, cujus bina latera semper eadem erunt, basis vero recta illa a puncto dato ad punctum peripheriæ terminata augebitur, vel minuetur cum angulo.

65. Inde verò facile admodum deducitur: chordam arcus magis a semicirculo recedentis esse minorem: circulum ab alio circulo vel secari in binis punctis ita; ut alter ex ejus arcubus binis intersectionibus interceptus sit totus intra ipsum, alter totus extra, & recta, quæ conjungit bina eorum circulorum centra, bifariam secet tum arcus ipsos, tum chordam per intersectiones ductam, ac faciet chordam eandem ad angulos rectos: vel contingi in unico puncto, quod quidem semper jacebit in eadem recta cum binis centris ita, ut si inter ipsa centra jaceat, alter circulus extra alterum cadat, & convexitatem sibi obvertant; si verò utrumque centrum jaceat ad eandem ejus plagam, totus minor circulus in majori includatur: vel demum sibi nusquam occurrere, sive alter ad alterum non pertingat sive eum complexus ultra ipsum transcurrat. Hæc autem patebunt omnia, si pro puncto dato superioris numeri assumatur ipsum alterius circuli centrum.

66. In Corol. 1. post prop. 9, cum dicitur arcum esse

esse mensuram anguli, non intelligitur mensura in eo sensu, in quo sumitur in schol. post prop. 7, ut sit id, quod aliquoties sumptum adæquat totum, sed pro quantitate æquali, qua mensurata habeatur magnitudo ejus quantitatis, cujus mensura dicitur, atque in hoc sensu fere semper etiam inferius accipietur.

67. In ipsa Prop. 9. notandum, si arcus circuli sit semicirculo major, non posse in communi angulorum consideratione angulum ipsi insistere ad centrum, licet possit ad circumferentiam. Nam ex binis ejus extremis rectæ ad centrum ductæ angulum constituent versus ipsum. Ac si ipse arcus semicirculo æqualis sit, bini ejusmodi radii in directum jacebunt, nec angulum constituent. Hinc ut in hoc communi modo concipiendi angulos demonstretur Corol. 1. recurrendum est iterum ad demonstrationem propositionis, & in hoc casu semper centrum necessariò cadet intra angulum, ut in fig. 40, eritque semper dimidijs arcus AE mensura anguli ADE, dimidijs BE mensura anguli BDE, adeoque dimidium totius AEB erit mensura totius anguli ADB.

68. Cæterum anguli, sive rectarum inclinationes considerari possunt etiam ex parte opposita cuspidis, nimirum externa, vel convexa, qui ab aliquibus dicuntur anguli gibbi. Quoniam id summo usui esse potest, & ad Geometriæ vim, & analogiam quandam intelligendam plurimum conducit, capiat circinus, ac sensum aperiatur: cuspidē utraque, & hiatu spectante Cælum, donec binæ ejus crura in directum jaceant, tum motu in contrariam partem inflectantur. Initio quidem angulus communi modo consideratus Cælum spectabit; tum is perpetuo crescens abibit in rectum, deinde in obtusum. Jacentibus in directum cruribus, angulus non evadet nullus, sed æqualis binis rectis, sive graduum 180. Deinde vero angulus communi modo consideratus jam spectabit deorsum; at ille, qui

Cœlum spectabat, adhuc magis auctus evadet major bis rectis, & fiet is, quem diximus angulum gibbum. Et si eo quidem pacto anguli considerentur, propositio erit generaliter vera, & cuicumque arcui insistat ad circumferentiam angulus; habebit alium insistentem ad centrum suum duplum.

69. Quin immo concipi potest angulus rectæ lineæ cum aliâ recta, ut major etiam 4. rectis, & graduum quorumcumque, concipiendo alteram circa alteram absolute integras conversiones quorumcumque.

70. E Corol. 1. sponte fuit hoc theorema. Anguli omnes, qui in eodem, vel in æqualibus circulis insunt arcibus æqualibus, ac ad peripheriam terminantur, sunt inter se æquales. Inde vero hoc aliud ejus inversum. Locus, qui continet ad easdem partes vertices omnes angulorum æqualium, quorum crura discedunt à datis binis punctis, est arcus circuli transeuntis per illa bina puncta, & verticem unius cujuslibet ex ipsis. Nam omnes ad eum arcum terminati æquales sunt; facile autem demonstratur omnes terminatos intra majores esse, extra minores, efficiendo angulum terminatum ad eum arcum, cujus anguli latus transeat per verticem terminati intra, vel extra; Erit enim is angulus respectu terminati intra internus & oppositus, respectu terminati extra externus.

71. Ex eodem Corol. 1. deducitur hoc aliud theorema; Circulus triangulo rectangulo circumscriptus, habet pro diametro basim; inde vero fuit hoc aliud; Vertex anguli recti distat a media basi per dimidiam basim. Primum patet ex eo, quod angulus rectus debeat esse in semicirculo, secundum ex eo, quod centrum debeat esse in media basi.

72. Tum inde haud difficulter derivatur hoc aliud. Si divisa circuli peripheria in partes æquales quorumcumque, singule sectiones jungantur cum sibi proximis, orietur polygonum regulare inscriptum, si per singulas sectiones ducantur tangentēs, orietur circumscriptum.

Primum patet; quia latera erunt chordæ arcuum æqualium, adeoque æqualia; anguli autem insisterint arcubus æqualibus, nimirum excessui totius circuli supra binos arcus subtensos a binis eorum lateribus. Secundum demonstrabitur ductis a centro ad omnes contactus; & proximarum tangentium concursus rectis, quæ cum segmentis tangentium interceptis inter binas quasque proximas constituunt triangula rectangula, & omnia protius æqualia; unde & angulorum, & laterum æqualitas sponte fluat.

73. Ad exercendum Tyronem possunt proponi hujusmodi problemata. Per datum punctum rectam ducere ita, ut ejus segmentum dato circulo interceptum æquetur rectæ datæ. Dati circuli tangentem ducere ita, ut ejus segmentum interceptum inter contactum, & rectam datam indefinitam, æquetur rectæ datæ. Rectam ducere, quæ binos circulos datos simul tangat.

74. Primum solvetur ducta e quovis puncto chorda æquali datæ rectæ, tum e centro ducto perpendicularo in ipsam, & hoc radio, ac eodem centro, descripto circulo novo, ad quem si è dato centro ducantur tangentes; problema solvetur; exhibebunt enim chordas æque a centro distantes, ac distat chorda primo applicata. Erunt autem binæ solutiones, vel unica, vel nulla; prout data recta fuerit minor, æqualis, vel major diametro.

75. Secundum solvetur, ducta ex quovis puncto peripheriæ tangente circuli æquali rectæ datæ, tum eodem centro per ejus extremum punctum ducto circulo, qui si bis secet rectam datam, solutiones erunt quoties, ductis binis tangentibus e singulis intersectionibus, si in unico puncto contingat, binæ tantum tangentes inde duci poterunt; si ad eam non pertingat, problema erit impossibile. Demonstratio patebit, si producaturs tangentibus ipsæ, quæ sunt chordæ circuli majoris æque distantes a centro, & in ipsis contactibus bifariam secantur.

76. Tercium solvetur, ducendo radium quemvis ma-

joris circuli, ac in eo tam versus centrum, quam producto ad partes centro oppositas abscindendo segmentum æquale radio minoris circuli: Si enim centro majoris circuli, & hoc novo intervallo summæ, vel differentiæ radiorum describatur circulus: ad eum ducantur tangentes ex centro minoris circuli, per contactum quemvis e centro majoris circuli ducatur radius, & per ejus extremum punctum tangens circuli majoris eadem & minorem continget. Id autem demonstrabitur, ducendo ex centro circuli minoris perpendicularum in ipsam, quod invenietur æquale distantiae binarum tangentium circuli majoris, & novi, adeoque radio circuli minoris. Porro si circulus alter extra alterum jaceat totus, invenientur quatuor tangentes ita ut binæ, quæ determinabuntur per summam radiorum, se inter ipsos circulos interserant, reliquarum utralibet ad eandem utriusque partem jaceat; si se contingant exterius, binæ illæ priores in unam coalescent; si se secant, binæ priores impossibiles fient; si se contingant interius, etiam posteriores binæ in unam coalescent; si alter intra alterum jaceat; omnes erunt impossibiles; ut adedò haberi possint solutiones 4, 3, 2, 1, nulla.

77. Poterit autem moneri Tyro, hoc postremum problema exhibere umbram, & penumbram Eclipsium, consideratis quatuor communibus tangentibus globorum Solis, & Lunæ, vel Solis, & Terræ, quarum priores duæ penumbram, posteriores umbram determinant.

78. Corol. 3. hujus prop. 9. converti poterit: describendo nimirum circulum per tres vertices angulorum quadrilinei habentis angulos oppositos simul duobus rectis æquales; qui transibit etiam per quartum. Nam si quattus vertex intra circulum eaderet, contineret angulum majorem complemento oppositi ad duos rectos, si extra minorem, ut num. 70.

79. Corol. 5. converti potest ita: Si binæ chordæ se intra circulum non secantes intercipient arcus æquales, para-

parallelæ sunt. Si enim concurrerent extra; continerent angulum cujus mensura esset semidifferentia arcuum interceptorum.

80. E Corol. 6. inferitur hoc theor. Anguli, quos chorda ex contactu ducta, continet cum tangente, æquantur iis, qui insunt ipsi chordæ in alternis segmentis: nimirum angulus ABE æquatur cuivis angulo descripto in segmento ADB, & angulus ABF cuivis descripto in segmento, quem chorda AB continet cum suo arcu versus E. Nam habent mensuram eandem, illi dimidium arcum AB, hi dimidium ADB.

81. Hinc facile solvuntur hæc problemata: A dato circulo abscindere segmentum, quod contineat angulum æqualem dato, & incipiat in puncto peripheriæ dato: Supra datam rectam construere segmentum circuli continens angulum æqualem dato. Primum solvitur, ducta circuli tangente per datum peripheriæ punctum, & ex eodem chorda, quæ cum tangente contineat angulum æqualem dato: secundum solvitur, ducendo per alterum extremum rectæ datæ aliam rectam, quæ cum ea contineat angulum æqualem dato, tum per nu. 57. describendo circum, qui hanc rectam tangat in eo chordæ extremo, & transeat per alterum extremum.

82. Pariter hoc aliud: Dato circulo inscribere triangulum, quod habeat angulos æquales angulis dati trianguli, & cujusvis anguli verticem in puncto dato. Solvetur ducendo per id punctum tangentem, tum ducendo binas chordas, quæ contineant cum tangente hinc inde binos angulos æquales reliquis angulis trianguli dati. Coniunctis enim extremis chordarum, facile patebit haberi intentum (per n. 80.)

83. In scholio ante prop. 10. delibantur tantummodo quædam, quæ pertinent ad algebraica signa, & Arithmetica notiones, quæ & captu facilia sunt, & ad reliqua, quæ hic pertractamus, sufficiunt. Arithmeticam plenius hic post Geometriam planam tractavimus, Algebra finitam hujus tomi pars secunda complectitur. Interea si quam notionem numeri integri, fracti, multipli

tiplicationis, divisionis &c. ignoret Tyro nondum Arithmeticam aggressus, eam facile a Præceptore addiscet.

84. Ubi pag. 45. lin. 9. dicitur: *Quoties tertius terminus continet quartum, aut similem ejus partem*; notet in primis nomine *partis* non hic intelligi partem, quæ aliquoties sumpta adæquet totum, & dicitur aliquota, sed quæ cum alia parte totum adæquat, & dicitur aliquanta. Deinde nomine *similis* intelligi eodem expressam numero, ut nimirum si primus terminus contineat secundi partem quartam, quintam, decimam, etiam tertius contineat partem quartam, quintam, decimam quarti, & ita porro; nimirum numerus ille, qui exprimit, quo pacto primus terminus secundum contineat, debet esse idem, ac is, qui exprimat idem in tertio respectu quarti. Sine hac explicatione nomen *similis*, quod potest sonare idem ac proportionalis, illud assumeret, quod deberet explicare.

85. Progre ille numerus m potest esse integer, vel fractus, vel continere seriem fractionum decrecentium in infinitum. Si primus rationis terminus est commensurabilis cum secundo, semper numerus m erit finitus utcumque fractiones involvat. Si primus terminus sit linea palmorum 12, secundus 4, erit $m = 3$, si ille 4 hic 12 erit $m = \frac{1}{3}$, si ille contineat palmos 17, hic 5 erit

$m = \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$. At si incommensurabiles sint, non poterit haberi m sine serie infinita. Sic si primus terminus sit diameter quadrati, & secundus ejusdem latus, erit $m = 1.4142$ &c. (per schol. prop. 7.)

86. Posita hac defin. patet ex axioma tertio, quantitates æquales ad alias æquales habere rationem eandem, & viceversa; ac patet etiam illud, quod Arithm. cap. 2. assumpsimus pro fundamento totius doctrinæ de proportionibus si uterque rationis terminus per eandem quantitatem multiplicetur, vel dividatur, manere rationem.

87. In proportionibus monendus Tyro terminos ho-

mo-

omologos dici antecedentes inter se, & consequentes inter se, sive primum ac tertium, secundum ac quartum. Rationem autem reciprocam, seu inversam eam, quam habet terminus consequens ad antecedentem. Ratio directa 6 ad 3 est dupla, ratio reciproca ejusdem non est dupla, sed subdupla.

88. In demonstratione prop. 10. notandum, quantitates etiam heterogeneas posse inter se multiplicari, si assumpta in quavis quantitarum specie una aliqua ad arbitrium, quæ dicatur unitas, reliquæ exprimentur numeris finitis, vel serie fractionum infinita, prout fuerint commensurabiles cum ea, vel incommensurabiles.

89. Ut vim habeat demonstratio prop. 10, necessarium est hoc theorema. Quotiescunque tres numeri multiplicantur ita, ut binorum productum multiplicetur per tertium, semper omnium productum evadit idem. Si multiplicandi sint 2, 5, 7 erit $2 \times 5 = 10$, & $7 \times 10 = 70$, tum $2 \times 7 = 14$, & $5 \times 14 = 70$, ac $5 \times 7 = 35$, & $2 \times 35 = 70$.

90. Id in quocunque numeris verum est, & in Arithmetica demonstrandum. Eo posito vis argumenti sita est in eo, quod sum sit $a = mb$, & $c = md$, erit $ad = mbd$, & $bc = bmd$; nimirum in utroque casu idem productum numerorum m, b, d , licet ordine diverso multiplicatorum. Hinc $ad = bc$ productum extremorum æquale producto mediorum.

91. In Coroll. 1. notetur regulam trium non habere locum, si tres termini dati cum quarto quæsito proportionales non sint. Si navis inæquali vento impellatur, & scias horis tribus confecisse milliaria 7, non potes invenire, quot milliaria conficere debeat horis 9.

92. In Coroll. 2. notetur, alternationem propriè haberi non posse, nisi in quantitatibus homogeneis, & solum ope numerorum quantitates exprimentium transferri ad heterogeneas. In motu æquabili spatium factum uno tempore ad factum alio, est ut primum tempus ad secundum. Alternando est primum spatium ad primum tempus, ut secundum spatium ad secundum tempus.

Propriè

Propriè spatium ad tempus nullam rationem geometricam habet, cum se continere non possint, sed ratio habebitur in numeris ea experimentibus.

93. In prop. 11. idem dicendum de multiplicatione antecedentium, & consequentium. Et quidem Euclides, ut evitaret multiplicationem in quantitibus heterogeneis, & series infinitas in incommensurabilibus, alio modo rationem compositam definivit, ut videbimus suo loco. Sed hæc nostra methodus est multo contrarior.

94. Euclides alios duos arguendi modos demonstravit *ex aequalitate ordinata, & perturbata*. Cum nobis hic usui futuri non essent, eos omisimus. Habentur Arithm. cap. 2. n. 21, & hic etiam admodum facile demonstrari possent. Pariter alium demonstrat arguendi modum *per conversionem rationis*, cum sumitur primus terminus ad excessum primi supra secundum, ut tertius ad excessum tertii supra quartum, qui includitur in iis, quæ diximus in fine Coroll. 2. prop. 10, & quem demonstravimus Arithm. cap. 2. num. 12.

95. In demonstratione prop. 12, ubi pag. 50. lin. 18. dicitur: *Sed triangula &c.*, ex hoc theoremate, quod triangula æquè alta si habent bases æquales æqualia sunt infertur statim triangula CEB, DEB æquè alta se eodem modo continere, quod bases suas. Id deducitur hoc pacto. Si utraque basis dividatur in particulas æquales quascunque, & ad communem verticem e singulis sectionibus ducantur rectæ; dividantur triangulorum areæ in particulas æquales vi ejus theoremat, quæ erunt totidem numero, quor basium particulae. Quare areæ se eodem modo continent, quo bases.

96. Verum & hæc prop., & aliæ multæ, quæ pertinent ad comparationes superficierum inferuntur e scholio prop. 6. & doctrina proportionum: Hæc omnino non ignoranda: Quadratum mediæ proportionalis inter binas rectas æquantur earundem rectangulo. Omnia parallelogramma comparata inter se, & omnia triangula inter se sunt in ratione composita basium, & altitudinum

num (per prop. 10.) cum æquentur productis ex basibus, & altitudinibus. Si bases fuerint æquales, illa sunt ut altitudines, & si altitudines fuerint æquales, erunt, ut bases, per nu. 86. Si bases fuerint in ratione reciproca altitudinum, nimirum basis unius ad basim alterius, ut huius altitudo ad illius altitudinem, areæ æquales erunt, & viceversa, (per prop. 9.)

97. Ope tertii ex his theorematibus statim patet in eadem demonstratione prop. 12. triangulum CBB ad DEB esse ut basim CB ad DB, & ADB ad idem EDB ut AB ad EB, unde consequitur CB. DB :: AB. EB.

98. Ex prop. 12. plurima theoremata profluunt, plurimæ problematum solutiones, & multa quidem ex iis usu sæpissime occurrunt, alia sunt Tyroni exercendo arduissima. Potiora delibabimus. In triangulis habentibus aliquem angulum æqualem areæ sunt in ratione composita laterum cum angulum continentium. Si enim in alterum ex iis assumptum pro basi e vertice opposito demittatur perpendicularum sive altitudo; facile ope trianguli rectanguli, qui oritur ad partem anguli æqualis eruetur, illa perpendiculara esse ut latera non assumpta pro basi. Quare cum sint areæ in ratione composita ex ratione basium, & altitudinum; erunt in ratione composita eorum laterum. Hinc in ejusmodi triangulis si ea latera sint in ratione reciproca; areæ æquales erunt, & viceversa.

99. Atque hinc etiam statim consequitur theorema demonstratum in Corol. 1. Triangulorum similium areas esse in ratione duplicata laterum homologorum: cum latera circa æquales angulos sint proportionalia.

100. In quovis triangulo recta basi parallela secat latera in eadem ratione; & si ita secat est parallela. Deducitur facile ex ipsius propositionis demonstratione. Cum enim sit CB. BD :: AB. BE; erit dividendo CD. DB :: AE. EB, & huic quidem theoremati innituntur corollaria 4., & 5. Si autem ita sit, erit ED parallela AE; nam si ea non esset, esset alia ducta ex E, quæ in alio puncto secaret latus BC, & tamen secaret in eadem ratione.

ratione. Quare ipsius rectæ BC, pars minor altera e partibus BD, DC haberet ad maiorem altera eandem rationem, quam ipsæ habent, quod est absurdum, cum quod primus terminus rationis est minor, & secundus maior debeat decreſcere numerus, qui exprimat, quomodo se contineant.

101. Notetur etiam in triangulis æquiangulis esse eam AB. BC:: FG. GH, quam AB. FG:: BC. GH. & hanc eam CD. DB:: AE. EB, quam CD. AE:: DB. EB, cum nimirum ex altera proportionem eruatür altera, ut aliæ plures componendo, dividendo, invertendo, alternando.

102. Eruitur etiam hoc theorema futurum sæpe summo usui. Si per quoddam punctum tranſeant plures rectæ utrinque indefinite productæ, & incidant in rectas parallelas quotcumque, segmenta parallelarum intercepta binis ex illis rectis ad segmenta intercepta aliis binis quibuscumque erunt in omnibus parallelis in eadem ratione. Nam segmentum unius parallelæ ad segmentum alterius inclusum binis quibuscumque iisdem rectis, facile invenietur esse, ut distantia primæ parallelæ a vertice ad distantiam secundæ assumptam in quavis ex iis rectis, quæ rationes omnes facile detegentur æquales.

103. Problemata exercendo Tyroni apta possunt esse huiusmodi: Datis in data recta binis punctis invenire tertium ita, ut ejus distantia a binis punctis datis ſint in ratione data. Solvetur facile, erigendo ex primo puncto dato in quovis angulo rectam indefinitam, abſcindendo in ea ab eodem puncto primam e rectis exprimentibus rationem datam, tum ab huius extremo secundam, vel ad partes oppositas recte datæ, vel versus ipsam, ducendo ab extremo puncto huius secundæ rectam ad secundum punctum datum, tum ab extremo primæ rectam huic parallelam. Hæc determinabit in recta data quæſitum punctum, quod facile in utroque caſu demonstrabitur ope triangulorum ſimilium; dividendo præterea vel componendo. Ac prima quidem solutio exhibebit ſemper unum punctum inter data duo puncta,

et, & coincidit cum secunda parte Corol. 6. secunda extra eadem unum ad partes secundi puncti dati, vel nullum, vel unum ad partes primi, prout secunda recta data fuerit minor, æqualis, vel major respectu primæ. Ac plurimum proderit considerare excursum puncti inventi utriuslibet per rectam datam, & transitum ab una parte ad oppositam, pro varia mutatione magnitudinis vel directionis in secunda recta data.

104. Vel hoc aliud. A dato puncto rectam ducere, quæ ita secet latera dati anguli, ut binæ distantie puncti dati à binis laterum sectionibus sint in ratione data, vel ut binæ latera dati anguli ab ejus vertice ad ejusmodi rectam sint in ratione data. Solvetur problema utrunque ducendo a puncto dato rectam parallelam primo lateri dato, donec occurrat secundo: tum pro solutione problematis primi capiende ab anguli vertice in secundo latere segmentum, quod sit ad segmentum ipsius interceptum inter parallelam ductam, & verticem anguli in ratione secundæ quantitatis exprimentis rationem datam ad primam: pro secundo capiende ab intersectione lateris secundi cum parallela ducta segmentum, quod ad ipsam parallelam sit in eadem ratione, ac ad ejus extremum ducendo rectam, quæ problema solvet, ut statim ac delineata fuerit figura, prodet similitudo triangulorum, & in utroque casu binæ solutiones habebuntur, segmento illo assumpto hinc inde ab anguli vertice, vel ab illo concursu, & lateribus anguli dati, si opus fuerit, productis etiam ultra verticem.

105. Potest etiam proponi hoc aliud. Datæ binis punctis in binis rectis parallelis, & tertio extra utranque, ducere ab hoc rectam, quæ illas ita secet, ut segmenta intercepta inter ipsam, & illa puncta data sint in ratione data. Solvetur facile conjungendo binæ illa puncta data, in recta jungente inveniando punctum, cujus binæ distantie ab ipsis sint in ratione data (per num. 99.) & a puncto dato per hoc punctum ducendo rectam, quæ exhibebit, quod queritur, ac si punctum

ctum tertium non jaceat in directum cum reliquis binis semper habebuntur binæ solutiones præter casum, in quo ratio data sit ratio æqualitatis, qui casus unicam solutionem admittet. Si autem tria puncta data in directum jaceant; casus erit impossibilis nisi ratio data fuerit eadem; ac ratio binarum distantiarum puncti tertii a prioribus binis, & tunc erunt infinitæ solutiones; quævis enim recta ducta a puncto dato satisfaciet problemati.

106. Et hæc quidem exercendo Tyroni, & alia magis necessaria ad Geometriæ complementum proponi possunt, ut hoc. Super data recta construere parallelogrammum, cujus area æquetur areae dati parallelogrammi. Solveretur facile ducendo in dato parallelogrammo perpendiculum, quod erit ejus altitudo, tum inveniendò quartam proportionalem post rectam datam, basim parallelogrammi dati, & ejus altitudinem. Inventa enim quantitas erit altitudo parallelogrammi quæsitæ; ac proinde si in distantia æquali huic novæ altitudini ab illa recta data ducatur recta ipsi parallela, & in quovis angulo ab extremis punctis rectæ datæ ducantur usque ad eam binæ rectæ parallele; solveretur problema, quod inde constat esse indeterminatum, & habere infinitas solutiones. Quod si præterea requiratur, ut novum parallelogrammum habeat angulum æqualem dato; factis erit in eo angulo ducere illas duas rectas parallelas, & jam problema determinatum evadet.

107. Eodem pacto triangulum constitui poterit, quod habeat basim æqualem datæ rectæ, aream æqualem areæ dati trianguli, & angulum æqualem dato angulo, inveniendò nimirum novi trianguli altitudinem eodem prorsus modo, & ducendo rectam datæ parallelam in distantia æquali inventæ altitudini.

108. Quin immo facile fiet parallelogrammum æquale dato triangulo, vel triangulum æquale dato parallelogrammo cum iisdem conditionibus. Satis erit in primo casu dimidiare, in secundo duplicare inventam altitudi-

itudinem, cum parallelogrammum esse debeat duplum trianguli habentis eandem basim, & altitudinem.

109. Inde data quavis figura rectilinea poterit cum iisdem conditionibus describi parallelogrammum habens aream ipsi æqualem. Si enim illa figura rectilinea resolvatur in totidem triangula, invenientur altitudines pro totidem parallelogrammis habentibus basim æqualem rectæ datæ, & aream æqualem singulis triangulis: tum si assumatur altitudo æqualis summæ omnium illarum altitudinum; parallelogrammum cum hac altitudine descriptum habebit aream æqualem areæ datæ figuræ, quod facile eruitur e num. 48.

110. Divisio circuli in gradus, quam apposuimus in schol. post prop. 12. obtineri non potest geometricè, cum nec arcus 30. gr. geometricè dividi possit in partes 3, nec arcus 5. graduum in 5. Et quidem, si pro 360 alii numeri adhibiti fuissent in divisione circuli in gradus, posset. Circulus enim potest dividi Geometricè in partes 2 ope diametri, in 6. adeoque & in 3 ope cor. 4. prop. 2, in 4 ope binarum diametrorum sibi invicem perpendicularium. Præterea potest in 5, sed ad id requiritur hoc Euclidis probl. Datam rectam ita secare, ut quadratum unius partis æquetur rectangulo sub reliqua parte & tota, quod quidem nos reservamus applicationi algebrae ad Geometriam, ut & alia quædam theoremata libri 2, quæ minus frequentèr occurrunt. Rursus potest in 15, si enim e binis partibus quintis, dematur pars tertia, e sex partibus quintisdecimis dementur quinque; ac proinde relinquetur una. Denum hæ divisiones possunt continuari per bisectionem in infinitum. Atque inde patet, quæ polygonia regularia circulo geometricè inscribi possint, & circumscribi.

111. Prop. 13. corol. 2, 3, 4. pertinent ad secundum Euclidis librum, & in numeris quoque possunt ostendi. Sit in cor. 2. $AC = 10$, $FB = 3$, erit $FC = 5$, $AB = 8$, $BC = 2$. Habetur autem $2 \times 8 + 3 \times 3 = 5 \times 5$ cum sit utrumque $= 25$; ac eodem modo numeri in reliquis substitui possunt.

112. Ex prima parte Corol. 5. deducitur, binas tangentes, quæ ex eodem puncto ad eundem circulum ducantur, esse æquales inter se; nam utriusque quadratum æquatur eidem rectangulo $BE \times BD$.

113. Potest hic proponi solvendum hoc problema, quod summum habet usum, & ad quod in Geometria reducuntur omnia illa problemata, quæ in algebra sunt secundi gradus, ut videbimus in applicatione Algebrae ad Geometriam. Data summa, vel differentia binarum rectarum, & earum rectangulo, ipsas invenire. Describatur circulus, qui habeat pro diametro datam summam, vel differentiam; ex extremo diametri puncto ducatur recta ipsi perpendicularis, cujus quadratum æquetur rectangulo dato, quod fiet inveniendo mediam proportionalem intra latera ipsius rectanguli dati. Ex extremo hujus puncto ducatur recta parallela diametro ubi datur summa, per centrum circuli ubi datur differentia, & hujus intersectiones cum peripheria circuli solvent problema. Nam bina intervalla ejus rectæ inter illud extremum, & singulas intersectiones, erunt binæ quæsita rectæ. Patet enim illud perpendicularum fore tangentem circuli, & proinde rectangulum sub iis binis rectis æquabitur ejus quadrato, sive rectangulo dato. In secundo autem casu patet, diametrum circuli fore differentiam rectarum inventarum, in primo vero ostendetur facile earum summam eidem æuari, ducendo aliud perpendicularum ab altero extremo, donec occurrat parallelæ illi productæ. Bina enim ejus segmenta intercepta arcu circuli, & binis perpendicularis æqualia esse facile perspicitur.

114. Porro in secundo casu patet, semper in circulo inveniri duo puncta; in primo vero invenientur duo, recta illa parallela secante circulum bis, vel unicum, ea ipsum tangente in vertice, vel nullum, ea cadente ultra circulum, prout illud quadrati latus fuerit minus, æquale, vel majus radio circuli, sive semisumma quantitarum quæsitarum. Quare in secundo casu semper habebuntur binæ quantitates quæsita; in primo eæ inven-

nien-

hæntur inæquales, æquales vel impossibiles, prout quadratum semisummarum datæ fuerit minus, æquale, vel majus rectangulo dato.

115. Idem problema potest proponi sic. Invenire binas rectas reciprocas datis, quarum detur summa, vel differentia. Si enim sunt reciprocarum iis datis, eorum rectangulum æquatur illarum rectangulo.

116. Potest & sic. In data recta datis binis punctis invenire aliud ita, ut rectangulum sub distantis hujus a punctis datis æquetur dato rectangulo. Si enim id punctum inveniatur inter data puncta, distantiarum summa erit æqualis intervallo punctorum; si extra, differentia. Porro patet semper debere inveniri bina ejusmodi puncta extra, singula ad partes singulorum, & intra ipsa vel bina hinc inde a medio, vel unicum, vel nullum. Sed ea elegantius inveniuntur sic. Secetur bifariam recta interjacens punctis datis, erigaturque inde perpendicularum cujus quadratum æquetur rectangulo dato. Tum primum facto centro in illo puncto bissecante, & intervallo distantiarum verticis perpendiculari ab altero e punctis datis, inveniuntur bina puncta extra. Deinde facto centro in vertice perpendiculari, intervallo dimidiæ distantiarum datorum punctorum inveniuntur bina puncta intra hinc inde a medio, vel unicum in medio, vel nullum, ut supra, & facile est demonstrare hanc solutionem congruere cum præcedenti.

117. Exercendo Tyroni proponi potest hoc problema. A dato puncto rectam ducere quæ datum circumlocet ita, ut binæ ejus distantiarum ab intersectionibus sint in ratione data. Si a dato puncto ducatur tangens circuli, vel recta perpendicularis diametro per datum punctum ductæ, prout ipsum fuerit extra, vel intra circumlocum, ea erit media proportionalis inter binas distantias. Quare cum detur harum ratio, datur ratio etiam alterius ex his ad illam tangentem. Solvitur igitur hoc pacto. Inter binas rectas inveniatur media proportionalis. Fiat ut hæc ad alteram e rectis datis, ita tangens ducta ad quartam lineam. Facto centro in pun-

cto dato, intervallo hujus novæ rectæ ducatur circulus, qui si datum circumulum secuerit, vel contigerit, recta ad sectionem vel contactum ducta solvet problema: sed ubi punctum datur extra circumulum, nisi novus circulus secuerit, vel contigerit circumulum datum citra tangentem, vel ultra prout in proportionē assumpta fuerit minor & datis rectis, vel major; problema erit impossibile.

118. In scholio hujus prop. notandum, rationem circuli ad circumferentiam multo ultra protractam esse nuper ab Eulero ope seriei cujusdam maxime convergentis, usque ad notas arithmeticas 137 in *Introductione in Analysism infinitorum*.

119. Ad prop. 14 notetur figuras similes dici eas, quarum anguli omnes æquales sunt, ac latera circa angulos æquales proportionalia. Est earum insignis proprietas hæc: si in binis figuris similibus e binis punctis perimetri correspondentibus ducantur in iisdem angulis ad latera homologa rectæ proportionales ipsis lateribus, tum ab harum extremis rectæ quævis in iisdem angulis cum iis ipsis; eæ terminabuntur ad puncta pariter correspondentia laterum homologorum, & erunt, ut ipsa latera homologa, quod facile demonstratur ope similitudinis triangulorum.

120. Hinc si e dato puncto ad perimetrum figuræ cujusvis ducatur recta, & in ea producta utrinque assumatur utralibet ex parte puncti ipsius segmentum, quod ad eam sit in data ratione quavis, excurrente ipsa recta per perimetrum figuræ, extremum segmenti punctum describet figuram similem. Demum notetur illud. In parallelogrammo diviso in 4. parallelogramma juxta num. 32. ea bina quæ circa diametrum sunt, sunt & inter se similia, & toti, ac e converso: Si bina parallelogramma similia angulum habeant communem, vel ad verticem oppositum, ac laterum homologorum directiones congruant, vertices oppositi jacebunt in eadem recta cum qua diametrorum directiones congruent. Id autem pariter e similitudine triangulorum facile deducitur.

§. II.

De iis, quæ pertinent ad Arithmeticam.

121. **C**ommunium notarum proprietas, quibus in Arithmetica decadica utimur, in qua nimirum regredimur ad caput numerationis post decades, decadum decades, seu centurias, centuriarum decades, seu millia &c. est, quod quævis nota seorsim legi possit renunciando speciem, quam exprimit, ultima unitates, penultima decades, præcedens illam centurias, tum alia præcedens millia, deinde millium decades, millium centurias, millions, & ita porro, vel conjungendo quocunque notas libeat, & omnia denominando a specie notæ postremæ, idque tam in integris, quam in fractis decimalibus. Numerus 34756 legi potest sic: Tercentum quadraginta septem centuriæ, quinque decades, sex unitates. Numerus 347.56. sic: Triginta quatuor unitates, septuaginta quinque partes decimæ, sex centesimæ, & ita porro.

122. Ejus rei ratio patet ex eo, quod semper nota existens in sede præcedenti significat decuplum ejus, quod significat in sequenti; adeoque si binis sedibus præcedat exprimit ejus centuplum, si ternis milluplum, & ita porro.

123. Additionis, & subtractionis demonstratio satis patet ex iis, quæ innuimus post regulas. Notandum autem, ex ipsa multiplicationis notione idem esse, numerum totum simul multiplicare per alium numerum, ac ejus partes ita multiplicare alias post alias, ut monuimus in hac appendice num. 49.

124. Pro multiplicatione numerorum inter 5, & 10 proposuimus num. 16. usitatam methodum per digitos. Quoniam adeo exiguus habetur casuum numerus, potest Tyro methodi demonstrationem sibi conficere per inductionem. Ope notarum algebraicarum res hoc

passo demonstraretur, Quoniam eriguntur tot digiti, quot unitatibus numerus propositus excedit quinarium; tot deprimentur, quot unitatibus idem deficit a denario. Deprimantur in altera manu digiti numero a , in altera b . Erit primus numerus $10 - a$ secundus $10 - b$. Multiplicentur per partes, & habebitur $10 \times 10 - 10a - 10b + ab$. Nam, ut in Algebra demonstrabitur, signa conformia, si multiplicentur, reddunt signum positivum, difformia negativum, prorsus ut si affirmes, aliquid existere, vel neges deesse, habebis positivam existentiam, si affirmes deesse, vel neges existere, habebis carentiam. Porro est $10 \times 10 - 10a - 10b + ab = 10(10 - a - b)$, & $10 - a - b = 5 - a + 5 - b$, sive = summæ digitorum erectorum. Igitur si ea summa ducatur in 10, & addatur productum ab digitorum depressorum habebitur intentum.

125. Tabulæ Pithagoricæ usus per se evidenter patet ex constructione. Numero autem 18. proponitur insignis proprietas numerorum, quæ demonstrari potest incipiendo a casibus simplicioribus, & pergendo ad magis compositos. Sint bini numeri a , b , ut 6, & 8, multiplicandi per se invicem. Concipe cohortem militum, in qua sint ordines numero a , sive 6, quorum singuli contineant numerum militum b , sive 8. Accipiendo numerum 8 vicibus 6 habetur numerus militum. Ibidem autem erunt 6 primi, quivis in suo ordine, 6 secundi, & ita porro usque ad 6 octavos. Quare etiam sumendo numerum 6 vicibus 8 habetur idem militum numerus. Igitur in binis numeris a , b productum ab , & ba est idem.

126. Si numeri sint tres a , b , c ; concipe legionem, in qua cohortes numero a , in quavis cohorte ordines b , in quavis ordine milites c . Erit bc numerus militum in cohorte, & $bc \times a$ numerus militum in legione. Si autem assumantur in quovis ordine soli primi; eorum numerus in cohorte erit idem, ac numerus ordinum b . Quare in universa legione erit ab , & cum sint totidem secundi, tertii &c., habebuntur tot hujusmodi numeri ab , quot milites sunt in quovis ordine;

ordine, nimirum c ; adeoque & $abXc$ exhibet eundem numerum. Demum si sumantur primi ordines tantum singularum cohortium, habebuntur milites ac , qui per numerum ordinum multiplicati exhibebunt $acXb$ numerum pariter omnium militum.

127. Considerando exercitum compositum ex numero legionum d , res extendetur ad quatuor numeros: vires regnis habentis exercitus e , ad quinque, & ita porro. Sed in pluribus numeris combinationes infinitum excrefcunt. Proderit autem Tyroni accipere 4, vel 5 numeros, & se in eorum multiplicatione exercere, ut videat eodem redire. $aXbXcXdXe$, $abXcXde$, $abdXce$, $acXbde$ &c.

128. Multiplicationis demonstrationem facile intelliget, qui exemplum aliquod consideret, & ea, quæ num. 21. innuimus: ac iisdem principiis innuitur methodum multiplicandi per tabellas Neperianas exposita num. 23.

129. In divisione ubi ea conficitur sine scala, & tabellis Neperianis, operatio procedit ordine sequenti.

130. Sumantur in primis in dividendo tot notæ prioribus, quot sufficiunt ad exprimendum numerum divisore non minorem. Eæ autem erunt totidem, quot in divisore continentur, vel una præterea. Nam numerus, qui unica nota alterum excedit semper illo major erit, ut 1000. est major quam 999.

131. Quærat quòties hic numerus continet divisorem; id autem præstabitur, quærendo quòties primam notam divisoris continet prima partis assumptæ, vel primæ duæ, prout assumptæ fuerint totidem notæ, vel una præterea, sed ita, ut quod ibi relinquitur conjunctum cum nota sequenti, & habitum pro decadibus sufficiat, ut toties saltem contineatur in ea secunda divisoris nota; si enim non suffecerit minuendus est unitate numerus vicium inventus, donec sufficiat. Is numerus vicium scribitur primo loco in quoto.

132. In exemplo exposito in quo 10105 dividitur per

Q 4

43,

43, cum priores binæ dividendi notæ 10 exhibeant numerum minorem quam 43, assumendæ tres 101. Querendum porro, quoties 4 contineatur in 10. Invenitur 2, & relinquitur 2, cui si addatur assumpti numeri sequens nota 1, fit 21, quod sufficit, ut sequens divisoris nota 3 binis contineatur. Quare in quoto scribitur 2. At si quæreretur, quoties 37 contineatur in 132, quærendo quoties 3 contineatur in 13 inveniretur 4; sed quia superest tantum 1, qui numerus conjunctus cum sequenti 2 exhibet 12, in quo numerus 7 quater contineri non potest: efficiendum ut 3 contineatur in 13 solum vicibus 3, ut relictis 4 possit 7 in 42 contineri pariter vicibus 3; adeoque prima nota quoti esset 3.

133. Per numerum inventum multiplicetur divisor; & productum scribatur sub illa parte divisoris assumpta, subtrahaturque inde, ac post residuum addatur sequens dividendi nota, & iteretur eadem operatio, quærendo eodem modo, quoties divisor contineatur in hoc residuo aucto, scribendo hanc novam notam, post notam quoti jam inventam, multiplicando, ac subtrahendo, ut prius, & ita porro.

134. Demonstratio methodi hinc petitur. Quoniam idem est dividere numerum per numerum, ac videre, si tot res quælibet, quot exprimit dividendus, distribui debeant in tot capita, quot exprimit divisor, quot ex iis dari singulis possint: quæritur primum, quæ sit altissima species numerorum a dividendo expressorum, e qua aliquid dari possit: ut in exemplo allato si e dividendo 10105 solum 10 millia assumuntur, ex his nullum singulis illis 43 dari potest; at si assumantur 101 centuriæ, quæ iis pauciores non sunt, poterunt singulis dari tot ex ipsis centuriis, quoties 43 contineatur in 101. Quare ille numerus inventus vicium debet esse prima quoti nota, & in eo exprimere debet illam eandem speciem, quam exprimit postrema nota partis assumptæ dividendi, ut hic centurias. Porro eas exprimet, cum tot aliæ post eam scribi debeant, quot
notæ

notæ in dividendo supersunt pro calculo toties restituendo, ut hîc aliæ duæ.

135. Multiplicando autem divisorem per notam quoti inventam determinatur, quid ex ea specie impendatur in ea distributione, ut hîc multiplicando 43 per 2 invenitur 86 centurias impendi. Subtractione invenitur, quid inde supersit, ut hîc supersunt 15. Hæ centuriæ sunt, ac conjunctæ cum decadibus 0, efficiunt decades 150, ac quaritur eodem pacto, quot singulis decades dari possint; atque ita semper a speciebus altioribus gradatim ad inferiores descenditur.

136. Porro ubi quaritur, quoties divisor contineatur in parte quoti assumpta, non sufficit videre, quoties prima ejus nota contineatur in prima vel prioribus binis hujus; sed relinqui debet, id, quod cum sequenti sufficiat secundæ; cum distribui non debeat numerus dividendus in tot capita, quot exprimit sola nota prima divisoris, sed in omnia a reliquis etiam ejus notis expressa. Atque idcirco si divisor contineat plures notas, videndum esset primo an quod superest primæ notæ divisoris conjunctum cum sequenti nota dividendi sufficiat pro secunda nota divisoris, tum an quod ipsi superest, conjunctum cum alia sequenti nota dividendi sufficiat pro tertia divisoris, & ita porro usque ad postremam. Sed ejusmodi inquisitio admodum molesta esset, & plerumque, ubi superest pro secunda, superesse solet etiam pro inferioribus, cum notæ in tertia sede centies minus, in quarta millies minus exprimant, quàm in prima. Hinc satis erit semper videre solum, an superest pro secunda, & si forte residuum deinde non suffecerit pro reliquis, id calculus ipse indicabit. Nam multiplicato divisore per notam quoti inventam, proveniet numerus major eo, a quo subtrahi deberet, quo casu nota inventa minuenda esset unitate, productum illud delendum, & scribendum aliud productum divisoris multiplicari per notam quoti correctam: ac satius erit raro admodum restituere calculum, quam semper illam adeo molestant investigationem instituere.

137. Ubi, divisione peracta, aliquid remanet, præscribitur n. 29, ut addatur fractio, cujus numerator sit postremum illud residuum, denominator sit ipse divisor. Ejus demonstratio hinc oritur, quod cum ex illo residuo singulis integræ unitates dari non possint, concipitur quævis unitas divisa in tot particulas, quot sunt ii, in quos divisio facienda, & quos divisor exprimit, & cum singuli singulas singularum unitatum particulas accipere debeant, singuli accipient tot particulas, quot erant unitates residuæ, quarum magnitudinem determinabit denominator divisoni æqualis. In casu ibi exposito singuli accipient particulas 182, qualium singulæ unitates continent 385.

138. Atque ex his quidem, & ex iis, quæ in Arithmetica diximus, habet Tyro, unde vim omnem divisionis percipiat, institutæ etiam sine lamellarum, aut scalæ præsidio, in qua Tyronem Præceptor debet exercere, ut minus difficilis illi deinde evadat radicum extractio.

139. In fractionibus, de quibus agitur a n. 33, binæ præcipuæ proprietates notandæ sunt. Primo si numerator demonstratorem excedit, fractio spuria est, & integras unitates continet, quarum numerus habetur dividendo numeratorem per denominatorem. Nam ubi numerator denominatori æquatur, fractio unitatem complet, quod ex ipsa fractionis notione constat. Cum enim pars quinta sit ea, quarum quinque in unitate continentur; patet quinque quintas partes unitatem complecti. Hinc tot unitates habentur, quot vicibus e numerator denominator potest detrahi, sive quot vicibus hic in illo continetur.

140. Secundò si in quavis fractione numerator, & denominator dividantur per eundem numerum quemcumque, valor illius manet idem, cum æque crescat numerus particularum, ac earum magnitudo minuat in multiplicatione, ac prorsus oppositum in divisione contingat. Sit fractio $\frac{3}{4}$, & utroque numero ducto in 5 fiet $\frac{15}{20}$ cujus idem est valor. Si enim unitas divisa erat in partes

A P P E N D I X. 251

res 4, quarum 3 accipiebantur, subdivisis singulis in alias 5, jam unitas continebit partes $4 \times 5 = 20$, & illæ tres assumptæ continebunt $3 \times 5 = 15$, ac idem patet de quovis alio numero.

141. Ex prima proprietate constat ratio ejus, quod præscribitur num. 34, & 35, pro colligendis integris unitatibus, ubi numerator denominatorem excedit.

142. Ex secunda proprietate constat id, quod num. 37. præscribitur pro reductione fractionum ad eundem denominatorem. Notandum autem in fine ejus numeri, plures fractiones simul etiam redigi ad eundem denominatorem multiplicando numeratorem, & denominatorem cujuslibet per omnes reliquorum denominatores.

Fractiones $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{3}{7}, \frac{5}{8}$ reduci possunt ad eundem

$$\text{denominatorem sic } \frac{2 \times 5 \times 7 \times 8}{3 \times 5 \times 7 \times 8}, \frac{4 \times 3 \times 7 \times 8}{5 \times 3 \times 7 \times 8}, \\ \frac{3 \times 3 \times 5 \times 7}{7 \times 3 \times 5 \times 8}, \frac{5 \times 3 \times 5 \times 7}{8 \times 3 \times 5 \times 7}$$

143. Reductio illa facilior, de qua num. 38, fieri potest in binis casibus. Primus est, cum in fractione aliqua numerator, ac denominator communem aliquem divisorem habeant, per quem dividi possint, & ad simpliciores terminos reduci, ut reducitur $\frac{6}{18}$ ad $\frac{1}{3}$ divi-

dendo per 6 tam numeratorem, quam denominatorem juxta num. 140. Secundus est cum bini, vel plures denominatores aliquem divisorem communem habent, tunc enim is in communi illo novo denominatore frustrarepereretur, & ubi is adest, multiplicatio per ipsum omit-tenda, ubi deest, semel tantum adhiberi debet in multi-plicatione conjunctus cum divisoribus reliquis non com-munibus. Sint $\frac{5}{6}, \frac{7}{15}, \frac{4}{7}$ sive $\frac{5}{2 \times 3}, \frac{7}{3 \times 5}, \frac{4}{7}$,

$$\text{Reducuntur ad eundem denominatorem sic } \frac{5 \times 5 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 7}, \\ \frac{7 \times 2 \times 7}{3 \times 5 \times 2 \times 7}, \frac{4 \times 2 \times 3 \times 5}{7 \times 2 \times 3 \times 5}, \text{ adhibendo communemq}$$

divi-

divisorem 3 denominatoris primi, & secundi solum in tertia fractione.

144. Hinc patet pro reductione fractionum necessariam esse methodum inveniendi maximum communem divisorem binorum numerorum. Ea autem est huiusmodi. Dividatur major per minorem, & notetur residuum: tum divisor per hoc residuum, & notetur residuum novum, atque ita porro, donec deveniatur ad aliquam divisionem, quæ accuratè fiat sine ullo residuo. Ultimus divisor ille, per quem divisio accurata successit est maximus communis divisor.

145. Sint numeri 1896, 120, quorum queratur maximus communis divisor. Diviso 1896 per 120, quotus est 15, residuum 96. Diviso 120 per 96, quotus est 1 residuum 24. Diviso 96 per 24, quotus est 4 sine residuo. Igitur 24 est communis maximus divisor. Et quidem diviso 1896 per 24, habetur 19, ac diviso 120 per 24 habetur 5.

146. Demonstratio innititur hisce theorematibus satis per se notis. Quod mensurat aliquem numerum (sumendo mensuram pro parte aliquota) mensurat, & quodvis ejus multipulum, nimirum ipsum quotcunque vicibus repetitum, & quod mensurat binos numeros, mensurat & eorum summam ac differentiam.

147. Porro si quis numerus mensurat 1896, & 120, mensurabit & 120 ductum in primum quotum 15, cumque id productum cum primo residuo 96 æquetur 1896, ille numerus mensurabit etiam id residuum sive differentiam. Eodem argumento cum mensuret 120, & 96, divisum, & divisorem novæ divisionis, mensurabit etiam novum residuum, & ita porro usque ad residuum penultimæ divisionis, quod cum metiatur se & postremum divisorem debet continere divisorem communem quemcumque propositorum numerorum. Totum autem ipsum esse divisorem communem constabit demonstratione retrograda. Cum enim mensuret se, mensurabit etiam divisum postremæ divisionis nimirum se multiplicatam per postremum quotum. Porro ipse erat residuum penultimæ divi-

divisionis, & postremus divisus erat ejusdem divisor? metiebatur autem ille eum divisorem, adeoque & ipsum ductum in penultimum quotum; cumque id productum cum residuo adæquet divisum ejusdem penultimæ divisionis, mensurabit etiam hunc divisum; ac eodem argumento, cum mensuret divisorem & divisum cujusvis divisionis posterioris, mensurabit etiam divisum & divisorem cujusvis præcedentis usque ad primam, nimirum binos numeros datos.

148. At si omnes divisores dati numeri invenire libeat, inventis divisoribus primis, de quibus §. 7; illud notandum, fore divisores ejusdem numeri omnia producta ex binis, ex ternis, ex quaternis, ex quotcunque simul sumptis, ac productum omnium simul fore ipsum numerum. Si enim sint quotcunque numeri primi, quotcunque ordine multiplicentur inter se, utcunque sumantur bini, terni, quaterni &c. ac per reliquos multiplicentur, semper productum idem efficient ut notavimus hic num 125, 126, 127. Quare ad inventionem omnium divisorum satis est invenire omnes primorum combinationes.

149. Erit aptius, quam in eo §. exemplum numeri 210, cujus divisores

| | | | | |
|--|-----|---|----|-----|
| omnes invenientur hoc pacto. Dividendo 210 per 2 | 210 | 2 | 6 | 30 |
| habetur 105, qui per 2 dividi non potest, dividitur | 105 | 3 | 10 | 42 |
| autem per 3, & habetur 35, | 35 | 5 | 14 | 70 |
| qui nec per 3 dividi potest, | 7 | 7 | 15 | 105 |
| potest autem per 5, & habetur 7, qui dividi solum potest per se, ac habetur 1. | 1 | 1 | 21 | |
| | | | 35 | |

Prima columna exhibet quotus, secunda divisores primos 2, 3, 5, 7. Combinando 2 cum 3, cum 5, cum 7, tum 3, cum 5, cum 7, demum 5 cum 7 habentur in tertia columna omnium binariorum combinationes. Combinando singula binaria cum posterioribus, qui ea binaria non ingrediuntur, aliis post alios, habentur omnia ternaria in columna quarta, tum combinando pariter

riter ternaria singula cum reliquis posterioribus habentur omnia quaternaria, & ita porro; sed hic quaternarium est unicum exhibens ipsum numerum propositum. Ac si iis columnis addatur ipse numerus 310 & 1, habentur omnes communes divisores sexdecim.

150. Fractionum multiplicatio exposita §. 9. demonstratur ex ipsa definitione multiplicationis. Habeat primum utraq; fractio numeratorem 1; ut si sit $\frac{1}{7}$ multiplicandum per $\frac{1}{5}$. Quoniam multiplicare per fractionem est accipere illam ejus partem, quam ea exprimit, sumenda erit partis septimæ pars quinta; & habebitur particula, quatum 5 continebit quævis e prioribus septem unitatis partibus, adeoque unitas tota continebit 7 X 5, nimirum habebitur pars $\frac{1}{7 \times 5}$, $\frac{1}{35}$.

151. Quod si non unius septimæ, sed plurium, ut quatuor septimarum partium sumenda sit pars quinta, patet sumendam fore in singulis unam ex iis particulis, adeoque $\frac{4}{7} \times \frac{1}{5}$ fore $\frac{4}{7 \times 5}$.

152. Demum si non una quinta ejus fractionis pars assumenda sit, sed plures, patet totidem vicibus plures particulas assumi, quot plures partes assumendæ sunt. Adeoque $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$ fore $\frac{4 \times 3}{7 \times 5}$. Nimirum oportere & numeratores inter se multiplicare, & denominatores inter se.

153. Divisio earumdem demonstratur ex eo, quod multiplicatio & divisio debeant se invicem destruire ita, ut quotus per divisorem multiplicatus debeat reddere divisum, ut constet ex ipsa multiplicationis, & divisionis notione. Porro sit $\frac{a}{b}$ dividendum per $\frac{c}{d}$ invertendo divisorem prodibit $\frac{ad}{bc}$; quia hunc quorum multiplicando per divisorem $\frac{c}{d}$ habebitur $\frac{ad c}{bc d}$, sive ob dc communem divisoni, & diviso habebitur (per num. 140) $\frac{a}{b}$, nimirum divisus ille.

161. Si

162. Si quis numerus integer consideretur, ut fractio quædam, quæ pro denominatore habeat unitatem; facile ex dictis eruentur hæc theoremata. Fractio multiplicatur per numerum integrum multiplicando per eum ejus numeratorem; Integer multiplicatur per fractionem multiplicando ipsum per ejus numeratorem, & relinquendo in utroque casu denominatorem pristinum. Fractio dividitur per integrum multiplicando per ipsum ejus denominatorem: Integer dividitur per fractionem multiplicando ipsum per ejus denominatorem, & ponendo pro denominatore numeratorem ipsius fractionis.

163. Notandum demum in quavis multiplicatione esse unitatem ad alterum factorem, ut alter ad productum, cum hoc ductum in unitatem maneat idem, nimirum sit æquale producto factorum: In quavis autem divisione esse divisorem ad divisum, ut est unitas ad quorum, cum quotus ductus in divisorem reddat divisum, adeoque divisum ipsum per unitatem multiplicatum; ac proinde in utroque casu habeantur æqualia producta mediorum, & extremorum.

164. Quæ §. 9 dicuntur de additione, & subtractione decimalium, patent ex iisdem principiis, ex quibus eadem deducuntur in integris. Quod pertinet ad eorum multiplicationem; facile demonstrabitur, si apponatur denominator, & notetur illud, quod diximus hic numero 121. Si enim sublato puncto scribatur sub eodem numero pro denominatore unitas cum tot cyphris, quot notæ decimalium habentur post punctum, habebitur fractio idem prorsus exprimens, quod ope puncti exprimitur, integris etiam, si qui sunt, simul ad eum denominatorem reductis. Multiplicatis iis fractionibus binis denominatores multiplicandi erunt, in quibus habebitur unitas cum tot cyphris, quot habebantur in utroque denominatore. Quare si, sublato ipso denominatore, productum ope puncti scribendum est, post punctum totidem in eo notæ haberi debent, quot in utroque factore simul habebatur.

165. Cum autem quotus per divisorem multiplicatus

debeat divisum reddere, tot in illis decimales notæ haberi debent, quot habentur in ipso diviso.

166. Porro ubi numerus notarum deest ad implendas hæcæ regulas, debet suppleri ope cyphrarum præmissarum, quæ in fractionibus decimalibus valorem non mutant post ipsas notas, mutant autem ante ipsas, ut e contrario in integris præmittendo eas cyphras non mutatur valor, mutatur vero plurimum ponendo eas post ipsas notas. Distantia enim a puncto dirimente integros numeros a fractionibus determinat valoris speciem.

167. Extractionem radices expositam §. 10., demonstrabimus in algebra. Pariter quæ de numeris surdis dicuntur §. 11. multo commodius & extendentur, & demonstrabuntur ibidem.

168. Ad caput 2. Arithmeticæ illud unum notabimus ad num. 9: multo melius, quam in prop. 10. Geometricæ, demonstrari hic ex principiis idcirco præmissis in proportionem geometricam productum extremorum æquari producto mediorum, & viceversa, ac eadem methodo, quæ in proportionem arithmetica adhibita est pro summa. Demonstratio autem hic omissa est hujusmodi.

169. Sit $a.b::c.d$, ducendo priores terminos in c , posteriores in a manebunt ædem rationes (per num. 6. cap. 2. Arith.) eritque $ac.bc::ac.ad$. Quare (per num. 7.) $bc \equiv ad$. Rursus si fuerit $bc \equiv ad$ erit (per num. 7.) $ac.bc::ac.ad$. Quare (per num. 6.) $a.b::c.d$. Q.E.D.

EXPLICIT TOMI I. PARS I.

